

1. Meßzeitpunkt: Geburt (Mai 1970 - Mai 1971)

Die Ursprungsdaten der Rostocker Längsschnittstudie stammen aus dem staatlichen Medizinischen Forschungsprojekt "Perinatalogie", das an 6 Universitäten der DDR umfangreiche Erhebungen an Neugeborenen realisierte (vgl. Eggers, Plath und Issel, 1975; Issel, Eggers und Plath, 1975). Die beteiligten Kliniken erfaßten im Zeitraum Mai 1970 bis Mai 1971 jedes Risikokind und jedes vierte unauffällige Neugeborene und sicherten damit ein ausgewogenes Verhältnis von perinatologisch belasteten und unbelasteten Kindern ab. Die Klassifizierung übernahmen die Geburtshelfer und Neonatologen in den Kliniken auf der Grundlage der Empfehlungen der Gesellschaft für Perinatale Medizin der DDR (Schlegel und Weissbach, 1969; Syllm-Rapoport, 1972). Die EDV-gerechte perinatologische Dokumentation wurde gemeinsam von Sozialhygienikern, Geburtshelfern und Pädiatern erarbeitet und umfaßte 58 sozialhygienische, 71 geburtshilfliche und 354 neonatologische Angaben pro Kind (vgl. Ackermann, Eggers, Gülzow und Issel, 1971).

In den beiden Rostocker Entbindungseinrichtungen Universitäts-Frauenklinik und Südstadt-Krankenhaus wurden im angegebenen Zeitraum rund 1000 Geburten dementsprechend dokumentiert. Der sozialmedizinische Teil basiert auf Angaben der Mütter, und die Befunde zum Geburtsverlauf stammen von den betreuenden Ärzten. In der Regel begrüßten die Mütter die angebotene gesundheitliche Entwicklungskontrolle ihrer Kinder und wandten sich bei Beratungs- und Hilfebedarf gerne an die Untersucher.

□ Während das groß angelegte Perinatalogieprojekt frühzeitig an seiner Überdimensionierung scheiterte, stützte sich die Abteilung für Kinderneuropsychiatrie der Universitätsnervenklinik und später das Institut für Medizinische Psychologie auf eine Teilstichprobe von n=294 für die fortlaufenden Entwicklungskontrollen, vgl. Codebücher 2, 6, 10, 14, 20, 25 Jahre und Meyer-Probst und Teichmann (1984).

□ Das vorliegende Codebuch beschreibt die Daten von 279 Neugeborenen. Das sind jene Kinder, die auch mit 6 Jahren teilnahmen und für die bis 1976 eine komplette Datei existiert. Die wesentlichen Parameter der n=15 missings sind jedoch im Codebuch 2 Jahre enthalten. Nach Rücksprache mit der Universitäts-Kinderklinik (PD Dr. Plath) wurden einige aus heutiger Sicht irrelevante Eintragungen eliminiert. Die ursprünglichen neonatologischen Adressenhefte und die entsprechenden Magnetbänder aus dem Projekt "Perinatalogie" sind nicht mehr verfügbar.

□ Das vorliegende Codebuch "Geburt" enthält neben den sozialmedizinisch relevanten Angaben, die zu jedem MZP neu erhoben wurden, vor allem die perinatologischen Basisdaten, die den Biologischen Risikoindex konstituieren (vgl. Codebuch 2 Jahre).

□

Variablen (Datei CODEBUCH/GEBURT.SYS)

GEBDAT: Geburtsdatum

SEX0: Geschlecht der Probanden

	Anzahl	valide Prozente
männlich	140	50.2
weiblich	139	49.8

GEW0: Geburtsgewicht in kg

	Mittelwert	St.abweichng	Minimum	Maximum	Anzahl
männlich	3.507	.578	1.40	5.22	140
weiblich	3.318	.573	1.29	5.10	137
gesamt	3.413	.582	1.29	5.22	277

GR0: Geburtslänge in cm

	Mittelwert	St.abweichng	Minimum	Maximum	Anzahl
männlich	51.15	2.47	41	57	139
weiblich	49.92	2.29	40	55	136
gesamt	50.54	2.45	40	57	275

ZWILLING: Einlings-, Mehrlingsschwangerschaft

- 1 - Einling
- 2 - 1. Zwilling
- 3 - 2. Zwilling
- 4 - 1. Drilling
- 5 - 2. Drilling
- 6 - 3. Drilling
- 7 - Vierling
- 8 - und darüber

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	133	95.0	130	96.3	263	95.6
2	4	2.9	2	1.5	6	2.2

3	3	2.1	3	2.2	6	2.2
missing			4		4	

ANLASS: Anlaß der Erhebung

1 - normales Kind

2 - Risikokind

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	69	49.6	74	54.4	143	52.0
2	70	50.4	62	45.6	132	48.0
missing	1		3		4	

ENTBIND: Name der Entbindungseinrichtung

1 - Universitäts-Frauenklinik

2 - Südstadt Krankenhaus

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	52	37.1	58	42.0	110	39.6
2	88	62.9	80	58.0	168	60.4
missing			1		1	

KINDMU0: Wieviele lebende Kinder (einschließlich des jetzt geborenen) haben Sie?

1 - 7 - Codierung entspricht der jeweiligen Anzahl der Kinder

8 - 8 Kinder und mehr

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	69	49.3	68	48.9	137	49.1
2	48	34.3	50	36.0	98	35.1
3	13	9.3	14	10.1	27	9.7
4	7	5.0	7	5.0	14	5.0
5	2	1.4			2	.7
7	1	.7			1	.4

ZAHL18H0: Wieviele Kinder (außer dem jetzt geborenen) sind unter 18 Jahren, die in Ihrem Haushalt leben?

0 - keine Kinder

1 - 7 - Codierung entspricht der jeweiligen Anzahl der Kinder

8 - 8 und mehr Kinder

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	70	50.0	73	52.5	143	51.3
1	47	33.6	45	32.4	92	33.0
2	14	10.0	16	11.5	30	10.8
3	8	5.7	5	3.6	13	4.7
6	1	.7			1	.4

ZAHL10H0: Wieviele Kinder (außer dem jetzt geborenen) sind unter 10 Jahren, die in Ihrem Haushalt leben?

0 - keine Kinder

1 - 7 - Codierung entspricht der jeweiligen Anzahl der Kinder

8 - 8 und mehr Kinder

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	73	52.1	75	54.0	148	53.0
1	51	36.4	47	33.8	98	35.1
2	12	8.6	14	10.1	26	9.3

3	4	2.9	3	2.2	7	2.5
---	---	-----	---	-----	---	-----

ZAHLKRI: Wieviele Kinder besuchen die Krippe oder den Kindergarten?

0 - keine Kinder

1 - 7 - Codierung entspricht der jeweiligen Anzahl der Kinder

8 - 8 und mehr Kinder

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	95	68.3	90	65.7	185	67.0
1	41	29.5	41	29.9	82	29.7
2	3	2.2	6	4.4	9	3.3
missing	1		2		3	

FAMILM0: Familienstand der Mutter

1 - ledig, ohne Heiratsabsicht

2 - ledig, mit Heiratsabsicht

3 - verheiratet, zusammenlebend

4 - verheiratet, getrennt lebend wegen Disharmonie

5 - verheiratet, getrennt lebend wegen äußerer Umstände

6 - geschieden

7 - Lebensgemeinschaft

8 - verwitwet

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	8	5.8	6	4.5	14	5.2
2	7	5.1	10	7.5	17	6.3
3	107	77.5	107	80.5	214	79.0
5	8	5.8	8	6.0	16	5.9
6	7	5.1	2	1.5	9	3.3
8	1	.7			1	.4
missing	2		6		8	

EINWOHN: Wieviele Einwohner hat Ihr Wohnort?

- 1 - bis 500 Einwohner
- 2 - 500 bis 2.000 Einwohner
- 3 - 2.000 bis 10.000 Einwohner
- 4 - 10.000 bis 100.000 Einwohner
- 5 - 100.000 bis 1 Million Einwohner
- 6 - über 1 Million Einwohner

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	2	1.4	2	1.5	4	1.5
2	2	1.4	1	.8	3	1.1
3			1	.8	1	.4
4	2	1.4	3	2.3	5	1.8
5	133	95.7	126	94.7	259	95.2
missing	1		6		7	

WRAEUME: Wieviele Wohnräume bewohnen Sie einschließlich Küche?

- 1 - 8 - Codierung entspricht der jeweiligen Anzahl der Räume
- 9 - 9 und mehr Räume

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	20	14.5	27	20.3	47	17.3
2	21	15.2	17	12.8	38	14.0
3	66	47.8	55	41.4	121	44.6
4	27	19.6	32	24.1	59	21.8
5	3	2.2	2	1.5	5	1.8
6	1	.7			1	.4
missing	2		6		8	

PRAEUME: Wieviele Personen wohnen in diesen Räumen (ohne das Neugeborene)?

1 - 8 - Codierung entspricht der jeweiligen Anzahl der Personen

9 - 9 und mehr Personen

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	5	3.6	4	3.0	9	3.3
2	44	32.1	46	34.6	90	33.3
3	48	35.0	47	35.3	95	35.2
4	23	16.8	20	15.0	43	15.9
5	11	8.0	12	9.0	23	8.5
6	3	2.2	2	1.5	5	1.9
7	1	.7	1	.8	2	.7
8	2	1.5			2	.7
9			1	.8	1	.4
missing	3		6		9	

KOMFORT0: Welche Komfortmerkmale hat Ihre Wohnung?

1 - Wohnung mit Bad (IWC und fließendes Wasser)

2 - Wohnung ohne Bad, aber mit Innen-WC

3 - Wohnung ohne Innen-WC, aber mit fließendem Wasser

4 - Wohnung ohne fließendes Wasser

5 - unter 1 - 4 nicht genannte Kombinationen der Merkmale Bad, IWC, fließendes Wasser

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	76	55.1	81	61.4	157	58.1
2	34	24.6	29	22.0	63	23.3
3	18	13.0	11	8.3	29	10.7
4	8	5.8	3	2.3	11	4.1
5	2	1.4	8	6.1	10	3.7
missing	2		7		9	

KUECHE: Haben Sie eigene Küche und Kühlschrank?

- 1 - eigene Küche mit Kühlschrank
- 2 - eigene Küche ohne Kühlschrank
- 3 - Kühlschrank vorhanden, aber keine eigene Küche
- 4 - keine Küche, kein Kühlschrank

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	81	59.1	81	61.4	162	60.2
2	24	17.5	16	12.1	40	14.9
3	15	10.9	14	10.6	29	10.8
4	17	12.4	21	15.9	38	14.1
missing	3		7		10	

EWOHNUNG: Wie schätzen Sie Ihre Wohnung allgemein ein?

- 1 - sonnig, trocken und warm
- 2 - nicht sonnig, aber trocken und warm
- 3 - feucht
- 4 - kalt
- 5 - feucht und kalt

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	101	73.7	106	79.7	207	76.7
2	10	7.3	9	6.8	19	7.0
3	6	4.4	11	8.3	17	6.3
4	14	10.2	4	3.0	18	6.7
5	6	4.4	3	2.3	9	3.3
missing	3		6		9	

HILFHAU0: Wird der Haushalt ausschließlich von Ihnen geführt, oder gibt es merkliche andere Hilfe?

- 0 - es gibt keinerlei nennenswerte Hilfe
 1 - Ehemann hilft regelmäßig und tatkräftig
 2 - eine Großmutter hilft bzw. beide Großmütter des Kindes helfen
 3 - die größeren Kinder helfen tatkräftig im Haushalt
 4 - es gibt anderseitige nennenswerte Hilfe
 5 - durch bezahlte Haushaltshilfe

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	54	38.6	41	29.5	95	34.1
1	60	42.9	72	51.8	132	47.3
2	20	14.3	23	16.5	43	15.4
3	5	3.6	1	.7	6	2.2
4	1	.7	2	1.4	3	1.1

EHE0: Wie schätzen Sie selbst Ihre Ehe ein?

- 1 - harmonisch
 2 - gut, aber gelegentlich doch ernste Auseinandersetzungen
 3 - in der Ehe gibt es sehr häufig Streitigkeiten
 4 - die Frau würde sich, wenn "es ginge", scheiden lassen
 5 - es besteht eine ernste Scheidungsabsicht
 6 - unverheiratet

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	100	73.0	96	72.7	196	72.9
2	16	11.7	19	14.4	35	13.0
4	1	.7			1	.4
6	20	14.6	17	12.9	37	13.8
missing	3		7		10	

ALTMU0: Alter der Mutter

	Mittelwert	St.abweichng	Minimum	Maximum	Anzahl
männlich	26.26	5.08	17	41	140
weiblich	25.72	5.37	15	40	139
gesamt	25.99	5.23	15	41	279

SCHMU0: Welchen Schulabschluß haben Sie?

Da das Alter der Mütter breit streut (15 - 41 Jahre), gibt es einige, die den 8-Klassen-Abschluß als Regelabschluß machten. Insofern wird die Aussagefähigkeit der Schulabschluß-Variable durch historische Besonderheiten der DDR-Anfangszeit eingeschränkt.

- 1 - ehemalige Sonder- bzw. Hilfsschülerin
- 2 - kein Abschluß der 8. Klasse
- 3 - Abschluß 8. oder 9. Klasse
- 4 - Abschluß 10. oder 11. Klasse
- 5 - Abschluß 12. Klasse

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	1	.7			1	.4
2	8	5.8	11	8.4	19	7.1
3	55	39.9	49	37.4	104	38.7
4	44	31.9	46	35.1	90	33.5
5	30	21.7	25	19.1	55	20.4
missing	2		8		10	

SPORTMU: Welche Sportzensur hatten Sie im letzten Zeugnis einer allgemeinbildenden Schule?

- 1 - 5 - Codierung entspricht der jeweiligen Zensur
- 9 - nicht mehr erinnerlich

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	18	13.6	10	7.6	28	10.6
2	51	38.6	65	49.6	116	44.1
3	46	34.8	39	29.8	85	32.3
4	3	2.3	5	3.8	8	3.0
9	14	10.6	12	9.2	26	9.9

missing	8		8		16	
---------	---	--	---	--	----	--

SPORTVOR: In welchem Umfang haben Sie vor der Schwangerschaft Sport getrieben?

- 1 - keinen Sport
- 2 - Massensport, gelegentlich
- 3 - Massensport, regelmäßig
- 4 - Leistungssport
- 5 - Spitzensport

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	88	64.7	87	65.9	175	65.3
2	20	14.7	22	16.7	42	15.7
3	22	16.2	20	15.2	42	15.7
4	6	4.4	3	2.3	9	3.4
missing	4		7		11	

BMU0: Welchen Beruf haben Sie erlernt bzw. erlernen Sie?

- 1 - nie berufstätig gewesen
- 2 - angelernter Beruf, ohne Facharbeiterbrief
- 3 - Beruf mit Facharbeiterbrief (außer landwirtschaftlicher Facharbeiter)
- 4 - landwirtschaftlicher Facharbeiter
- 5 - Beruf mit Fachschulabschluß
- 6 - Beruf mit Hochschulabschluß

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	1	.7			1	.4
2	19	14.2	22	16.5	41	15.4
3	80	59.7	74	55.6	154	57.7
5	17	12.7	23	17.3	40	15.0
6	17	12.7	14	10.5	31	11.6
missing	6		6		12	

BERUFM0: Wie groß ist der Umfang Ihrer beruflichen Tätigkeit?

- 1 - keine berufliche Tätigkeit der Mutter
- 2 - "ganztägig" außer Haus
- 3 - halbtags außer Haus (auch teilbeschäftigt)
- 4 - Gelegenheitsbeschäftigung außer Haus
- 5 - ganztägig als Heimarbeiterin
- 6 - halbtags als Heimarbeiterin
- 7 - als Heimarbeiterin mit weniger als täglich durchschnittlich 4 Stunden bezahlter Arbeit

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	8	5.8	6	4.6	14	5.2
2	110	79.7	108	82.4	218	81.0
3	18	13.0	17	13.0	35	13.0
4	1	.7			1	.4
6	1	.7			1	.4
missing	2		8		10	

TMU0: Welchen Beruf üben Sie gegenwärtig aus (bis Antritt des Schwangerschaftsurlaubs)?

- 1 - Hausfrau, nicht im Arbeitsrechtsverhältnis
- 2 - Beruf als Angestellte, ohne Intelligenzberufe
- 3 - Beruf als Arbeiterin, ohne landwirtschaftliche Berufe
- 4 - landwirtschaftliche Arbeiterin
- 5 - selbständige Gewerbetreibende
- 6 - im Intelligenzberuf tätig
- 7 - zur Zeit in der Ausbildung

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	8	5.8	6	4.5	14	5.2
2	83	60.1	76	57.1	159	58.7
3	20	14.5	22	16.5	42	15.5
6	21	15.2	22	16.5	43	15.9
7	6	4.3	7	5.3	13	4.8
missing	2		6		8	

QUALMU0: Nehmen Sie gegenwärtig an einer Qualifizierung im Beruf teil?

- 1 - Antwort entfällt, da keine Qualifizierung
- 2 - die Frau führt ein Fernstudium durch
- 3 - es findet eine systematische, permanente Qualifizierung im Beruf durch Besuch von Lehrveranstaltungen statt
- 4 - die Frau besucht regelmäßig die Volkshochschule, jedoch nicht mit dem Ziel der Vervollkommnung im Beruf (dient der permanente VHS - Besuch der beruflichen Qualifizierung, ist dies unter "2" zu verschlüsseln)
- 5 - die Frau besucht gelegentlich Fortbildungsveranstaltungen (beruflich und außerberuflich)
- 6 - die Frau befindet sich neben ihrer Berufstätigkeit in einem Qualifizierungsprozeß, der unter "1" bis "4" im einzelnen nicht umschrieben wird
- 7 - Absolvierung eines Direktstudiums

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	102	76.1	104	78.2	206	77.2
2	8	6.0	11	8.3	19	7.1
3	15	11.2	12	9.0	27	10.1
4	2	1.5	2	1.5	4	1.5
5	1	.7	1	.8	2	.7
6	6	4.5	3	2.3	9	3.4
missing	6		6		12	

ARB: Wie schätzen Sie Ihre Arbeit ein?

- 1 - entfällt, Hausfrau
- 2 - ausgeprägt körperlich anstrengend
- 3 - etwas körperlich anstrengend
- 4 - gar nicht körperlich anstrengend

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	8	5.8	6	4.5	14	5.2
2	14	10.1	17	12.8	31	11.4
3	56	40.6	51	38.3	107	39.5
4	60	43.5	59	44.4	119	43.9
missing	2		6		8	

ARBG: Wie schätzen Sie die geistigen Strapazen bei Ihrer Arbeit ein?

- 1 - entfällt, Hausfrau
- 2 - ausgeprägt geistig anstrengend
- 3 - etwas geistig anstrengend
- 4 - gar nicht geistig anstrengend

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	8	5.8	6	4.5	14	5.2
2	46	33.6	44	33.1	90	33.3
3	62	45.3	61	45.9	123	45.6
4	21	15.3	22	16.5	43	15.9
missing	3		6		9	

BERVER0: Wünschen Sie Veränderungen in Ihrem Beruf oder an Ihrem Arbeitsplatz?

- 1 - entfällt, nicht berufstätig
- 2 - ist völlig zufrieden mit Beruf und Arbeitsplatz (Kollektiv)
- 3 - wünscht Berufsänderung, der Tätigkeit wegen
- 4 - wünscht anderen Arbeitsplatz, des Kollektivs wegen
- 5 - wünscht Veränderung in jeder Hinsicht, möchte jedoch berufstätig bleiben
- 6 - würde nicht wieder berufstätig werden, wenn nicht finanzielle Beweggründe o.a. bestünden
- 7 - Hausfrau, die gern berufstätig wäre

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	8	6.1	6	4.8	14	5.4
2	85	64.9	90	71.4	175	68.1
3	28	21.4	23	18.3	51	19.8
4	3	2.3	2	1.6	5	1.9
5	7	5.3	5	4.0	12	4.7
missing	9		13		22	

ZEITWEG: Wieviel Zeit benötigen Sie für den täglichen Gesamtweg von und zur Arbeit (Hin- und Rückweg zusammengezählt)?

Codierung entspricht der absoluten Zahl in Stunden mit einer Dezimale nach dem Komma
z.B.: 1 - 0,1 Stunde (= 6 Minuten)

2 - 0,2 Stunden

3 - 0,3 Stunden u.s.w.

99 - entfällt, nicht berufstätig oder Heimarbeiterin

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	9	6.5	9	6.8	18	6.6
2	11	8.0	8	6.0	19	7.0
3	2	1.4	12	9.0	14	5.2
4	5	3.6	6	4.5	11	4.1
5	10	7.2	18	13.5	28	10.3
6	12	8.7	5	3.8	17	6.3
7	5	3.6	2	1.5	7	2.6
8	4	2.9	4	3.0	8	3.0
9			2	1.5	2	.7
10	25	18.1	26	19.5	51	18.8
12	1	.7	2	1.5	3	1.1
13	2	1.4	2	1.5	4	1.5
15	16	11.6	9	6.8	25	9.2
16	3	2.2	4	3.0	7	2.6
18	3	2.2	1	.8	4	1.5
19	2	1.4			2	.7
20	17	12.3	15	11.3	32	11.8
24	1	.7	1	.8	2	.7
30	1	.7	1	.8	2	.7
40	1	.7			1	.4
99	8	5.8	6	4.5	14	5.2
missing	2		6		8	

**URLAUB: Haben Sie die Absicht, nach dem gesetzlichen
Wöchnerinnenurlaub noch für längere Zeit unbezahlten Urlaub
zu nehmen? - (bei Aufrechterhaltung des Arbeitsrechtsver-
hältnisses).**

- 1 - Antwort entfällt, da die Frau z.Z. kein Arbeitsrechtsverhältnis hat
2 - ja
3 - nein
4 - die Frau ist sich darüber unentschieden, bzw. ihr diesbezügliches Verhalten hängt davon ab,
wie die bisher noch nicht geklärte Unterbringung des Kindes und andere Probleme geregelt
werden können

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	8	5.8	6	4.6	14	5.2
2	26	19.0	35	26.9	61	22.8
3	83	60.6	70	53.8	153	57.3
4	20	14.6	19	14.6	39	14.6
missing	3		9		12	

WUKIE0:Wieviele Kinder wollten Sie haben, als Sie heirateten?

Codierung entspricht der jeweiligen Anzahl der Kinder

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	14	10.4	17	12.8	31	11.6
1	20	14.8	24	18.0	44	16.4
2	93	68.9	85	63.9	178	66.4
3	8	5.9	6	4.5	14	5.2
4			1	.8	1	.4
missing	5		6		11	

WUKI0: Wieviele Kinder möchten Sie noch haben?

Codierung entspricht der jeweiligen Anzahl der Kinder

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	102	73.9	94	68.1	196	71.0
1	36	26.1	40	29.0	76	27.5
2			4	2.9	4	1.4

missing	2		1		3	
---------	---	--	---	--	---	--

SCHWPLAN: Wie ist es zu dieser Schwangerschaft gekommen?

- 1 - sie war eingeplant
 2 - die Mutter hat es darauf ankommen lassen
 3 - es ist zur Schwangerschaft gegen den Willen der Mutter gekommen

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	58	42.0	49	36.8	107	39.5
2	44	31.9	45	33.8	89	32.8
3	36	26.1	39	29.3	75	27.7
missing	2		6		8	

BERATUNG: Haben Sie sich schon einmal von einem Arzt oder in einer Ehe- und Sexualberatungsstelle über Empfängnisverhütung beraten lassen?

- 1 - ja
 2 - nein

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	14	10.1	13	9.8	27	10.0
2	124	89.9	120	90.2	244	90.0
missing	2		6		8	

KINPLAN: Sind Sie der Meinung, daß man die Zahl der Kinder in der Familie und den Zeitpunkt ihrer Geburt planen müßte?

- 1 - ja
 2 - nein
 3 - die Frau ist sich darüber unentschieden

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	115	83.3	117	88.0	232	85.6
2	15	10.9	10	7.5	25	9.2
3	8	5.8	6	4.5	14	5.2
missing	2		6		8	

SCHWVER0: Welche Methoden der Schwangerschaftsverhütung haben Sie während der letzten 3 Monate angewandt?

- 1 - keine Verhütungsmethoden
- 2 - Coitus interruptus (Aufpassen, "Rückzieher")
- 3 - Rhythmusmethode (unfruchtbare Tage, Kalendermethode)
- 4 - Basaltemperatur
- 5 - Spülungen
- 6 - Kondom (Gummischutz)
- 7 - Diaphragma oder Portiokappe
- 8 - IUD (Spirale, Schleife in der Gebärmutter)
- 9 - Ovulationshemmer (Pille)
- 10 - Zäpfchen, Creme, Gelee
- 11 - 1 + 3
- 12 - 2 + 3
- 13 - 3 + 5
- 14 - 5 oder 6 + 9 kombiniert
- 15 - weitere Kombinationen

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	81	58.7	71	53.4	152	56.1
2	6	4.3	12	9.0	18	6.6
3	27	19.6	26	19.5	53	19.6
5	1	.7			1	.4
6	12	8.7	12	9.0	24	8.9
7	1	.7			1	.4
9	1	.7	5	3.8	6	2.2
10	1	.7			1	.4
11	1	.7			1	.4
12	2	1.4	1	.8	3	1.1
14	1	.7	1	.8	2	.7
15	4	2.9	5	3.8	9	3.3
missing	2		6		8	

**WOBERAT: Wo und wann wäre Ihnen eine Beratung über
Schwangerschaftsverhütung am liebsten?**

- 1 - in der Entbindungseinrichtung
- 2 - bei der Nachuntersuchung
- 3 - später in einer Ehe- und Sexualberatungsstelle
- 4 - später bei einem Frauenarzt
- 5 - später bei einem praktischen Arzt
- 6 - später beim Betriebsarzt, unabhängig von dessen fachlicher Spezialisierung

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	12	8.9	11	8.3	23	8.6
2	50	37.0	51	38.6	101	37.8
3	28	20.7	18	13.6	46	17.2
4	40	29.6	49	37.1	89	33.3
6	5	3.7	3	2.3	8	3.0
missing	5		7		12	

**RAUCHENM: Wieviele Zigaretten rauchten Sie bis zur Aufnahme in der
Klinik täglich?**

- 1 - keine Zigaretten, Nichtraucherin
- 2 - 1 bis 4 Zigaretten
- 3 - 5 bis 9 Zigaretten
- 4 - 10 bis 14 Zigaretten
- 5 - 15 bis 19 Zigaretten
- 6 - 20 bis 24 Zigaretten
- 7 - 25 bis 29 Zigaretten
- 8 - 30 bis 39 Zigaretten
- 9 - 40 und mehr Zigaretten

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	122	89.7	114	87.0	236	88.4
2	7	5.1	9	6.9	16	6.0
3	5	3.7	2	1.5	7	2.6
4	2	1.5	2	1.5	4	1.5
5			4	3.1	4	1.5
missing	4		8		12	

NIKOTKIN: Wissen Sie, ob das Nikotin in das kindliche Blut übergeht?

- 1 - ja, tritt über
 2 - nein, tritt nicht über
 3 - weiß nicht

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	103	75.2	100	76.9	203	76.0
2	4	2.9	7	5.4	11	4.1
3	30	21.9	23	17.7	53	19.9
missing	3		9		12	

ZEITBER: Im wievielten Monat der Schwangerschaft sind Sie das erste Mal in die Schwangerschaftsberatung gegangen?

Codierung entspricht dem jeweiligen Schwangerschaftsmonat

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	6	4.4	6	4.5	12	4.4
2	26	19.0	31	23.3	57	21.1
3	68	49.6	61	45.9	129	47.8
4	33	24.1	29	21.8	62	23.0
5	4	2.9	5	3.8	9	3.3
7			1	.8	1	.4
missing	3		6		9	

HINWBER: Haben Sie bei Ihrem ersten Besuch Hinweise für ein richtiges Verhalten in der Schwangerschaft erhalten?

- 1 - diesbezügliche Hinweise wurden im Gespräch erteilt
 2 - im Gespräch wurde nicht darauf eingegangen, die Frau wurde jedoch mit einem Merkblatt oder Broschüre ausgestattet
 3 - es wurden keinerlei diesbezügliche Hinweise erteilt
 4 - mehrere Methoden angewandt

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	50	36.5	46	34.6	96	35.6
2	40	29.2	45	33.8	85	31.5
3	34	24.8	31	23.3	65	24.1
4	13	9.5	11	8.3	24	8.9

missing	3		6		9	
---------	---	--	---	--	---	--

KENNTNIS: Wem verdanken Sie die meisten Kenntnisse über Schwangerschaftshygiene und über Pflege von Säugling und Kleinkind?

- 1 - Mutter
- 2 - Großmutter
- 3 - Arzt in der Beratungsstelle
- 4 - Arzt in einer anderen Einrichtung
- 5 - Schwester bzw. Hebamme in der Beratungsstelle
- 6 - Schullehrer
- 7 - leibliche Schwester
- 8 - andere Person
- 9 - keine Person, sondern Bücher und Broschüren

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	48	35.0	32	24.1	80	29.6
2	2	1.5	2	1.5	4	1.5
3	5	3.6	10	7.5	15	5.6
4			2	1.5	2	.7
5	10	7.3	18	13.5	28	10.4
6	3	2.2	5	3.8	8	3.0
7	6	4.4	8	6.0	14	5.2
8	11	8.0	5	3.8	16	5.9
9	52	38.0	51	38.3	103	38.1
missing	3		6		9	

MUKURS: Haben Sie jetzt oder früher an einem Mütterschulungskurs teilgenommen?

- 1 - ja
- 2 - nein

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	40	29.2	39	29.5	79	29.4
2	97	70.8	93	70.5	190	70.6
missing	3		7		10	

GEBURT**MUTTER****PSYKURS: Haben Sie jetzt oder früher an einem psychoprophylaktischen Kurs teilgenommen?**

- 1 - ja
2 - nein

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	59	42.8	56	42.1	115	42.4
2	79	57.2	77	57.9	156	57.6
missing	2		6		8	

MOBERUF: Bis zum wievielten Schwangerschaftsmonat waren Sie berufstätig?

- 0 - nicht berufstätig gewesen
Codierung entspricht dem jeweiligen Schwangerschaftsmonat

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	11	7.9	13	9.4	24	8.7
2			3	2.2	3	1.1
5			1	.7	1	.4
6	1	.7	1	.7	2	.7
7	9	6.5	6	4.3	15	5.4
8	99	71.2	96	69.6	195	70.4
9	19	13.7	18	13.0	37	13.4
missing	1		1		2	

ARBBEFR: Mußte während der letzten Schwangerschaft Arbeitsbefreiung erfolgen?

Codierung entspricht der Gesamtheit der Arbeitsbefreiung in vollen Wochen

99 - es erfolgte keine Arbeitsbefreiung oder sie betrug insgesamt weniger als 6 Tage

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	6	4.3	5	3.8	11	4.1
2	6	4.3	12	9.2	18	6.7
3	9	6.5	7	5.3	16	5.9
4	8	5.8	3	2.3	11	4.1
5	4	2.9	2	1.5	6	2.2
6	6	4.3	3	2.3	9	3.3
7	2	1.4	2	1.5	4	1.5
8	2	1.4	2	1.5	4	1.5
9	1	.7			1	.4
10	3	2.2	1	.8	4	1.5
11	1	.7	1	.8	2	.7
12			3	2.3	3	1.1
14	2	1.4			2	.7
21	1	.7			1	.4
22			1	.8	1	.4
28	1	.7			1	.4
34			1	.8	1	.4
99	86	62.3	88	67.2	174	64.7
missing	2		8		10	

FREUDE: Sind Sie jetzt ohne Einschränkung froh, daß Sie dieses Kind bekommen haben?

1 - die Mutter freut sich jetzt ohne Einschränkung darüber

2 - die Freude der Mutter über das Kind ist "nicht ganz ungeteilt"

3 - die Mutter meint jetzt, daß dieses Kind besser nicht hätte kommen sollen

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	128	92.8	124	93.9	252	93.3
2	9	6.5	5	3.8	14	5.2
3	1	.7	3	2.3	4	1.5
missing	2		7		9	

GEBURT**VATER**

Die schwankenden Häufigkeiten unter der Option "Vater unbekannt" sind vermutlich darauf zurückzuführen, daß die Mütter die Fragen bezüglich der Väter beantworteten, soweit ihnen die entsprechenden Angaben bekannt waren.

ALTVA0: Alter des Vaters

	Mittelwert	St.abweichng	Minimum	Maximum	Anzahl
männlich	28.71	5.84	20	58	136
weiblich	28.39	5.69	17	48	131
gesamt	28.55	5.76	17	58	267

SCHVA0: Welchen Schulabschluß hat der Vater?

Da das Alter der Väter breit streut (17 - 58 Jahre); gibt es einige, die den 8-Klassen-Abschluß als Regelabschluß machten. Insofern wird die Aussagefähigkeit der Schulabschluß-Variable durch historische Besonderheiten der DDR-Anfangszeit eingeschränkt.

- 1 - ehemaliger Sonder- bzw. Hilfsschüler
- 2 - kein Abschluß der 8. Klasse
- 3 - Abschluß 8. oder 9. Klasse
- 4 - Abschluß 10. oder 11. Klasse
- 5 - Abschluß 12. Klasse
- 6 - Vater unbekannt

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1			1	.8	1	.4
2	4	3.0	3	2.3	7	2.6
3	62	46.3	60	45.5	122	45.9
4	34	25.4	39	29.5	73	27.4
5	31	23.1	26	19.7	57	21.4
6	3	2.2	3	2.3	6	2.3
missing	6		7		13	

GEBURT**VATER****BVA0: Erlerner Beruf des Vaters**

- 1 - nie berufstätig gewesen
- 2 - angelernter Beruf, ohne Facharbeiterbrief
- 3 - Beruf mit Facharbeiterbrief (außer landwirtschaftlicher Facharbeiter)
- 4 - landwirtschaftlicher Facharbeiter
- 5 - Beruf mit Fachschulabschluß
- 6 - Beruf mit Hochschulabschluß
- 7 - Vater unbekannt

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	1	.7			1	.4
2	11	8.1	7	5.3	18	6.7
3	86	63.7	89	66.9	175	65.3
4	3	2.2			3	1.1
5	16	11.9	22	16.5	38	14.2
6	16	11.9	13	9.8	29	10.8
7	2	1.5	2	1.5	4	1.5
missing	5		6		11	

TVA0: Welchen Beruf übt der Vater aus?

- 1 - nicht im Arbeitsrechtsverhältnis (ohne Rentner)
- 2 - Beruf als Angestellter, ohne Intelligenzberufe
- 3 - Beruf als Arbeiter, ohne landwirtschaftliche Berufe
- 4 - landwirtschaftlicher Arbeiter
- 5 - selbständiger Gewerbetreibender
- 6 - im Intelligenzberuf tätig
- 7 - zur Zeit in der Ausbildung
- 8 - Mann ist Rentner, hat kein Arbeitsrechtsverhältnis
- 9 - Vater unbekannt

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1			1	.8	1	.4
2	42	30.4	39	29.3	81	29.9
3	60	43.5	60	45.1	120	44.3
4	2	1.4	1	.8	3	1.1
5	1	.7			1	.4
6	22	15.9	19	14.3	41	15.1
7	10	7.2	11	8.3	21	7.7
9	1	.7	2	1.5	3	1.1
missing	2		6		8	

RAUCHENV: Wieviel Zigaretten raucht Ihr Mann durchschnittlich täglich?

- 1 - Mann ist Nichtraucher
- 2 - 1 - 4 Zigaretten
- 3 - 5 - 9 Zigaretten
- 4 - 10 - 19 Zigaretten
- 5 - 20 - 29 Zigaretten
- 6 - 30 Zigaretten und mehr
- 7 - der Mann raucht wenig, doch ausschließlich Zigarren oder Pfeife
- 8 - der Mann ist ein starker Zigarren- oder Pfeifenraucher, er raucht dabei keine oder unwesentliche Mengen Zigaretten
- 9 - Vater unbekannt

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	52	39.1	40	31.0	92	35.1
2	10	7.5	11	8.5	21	8.0
3	17	12.8	19	14.7	36	13.7
4	30	22.6	34	26.4	64	24.4
5	14	10.5	20	15.5	34	13.0
6			2	1.6	2	.8
7	5	3.8	1	.8	6	2.3
9	5	3.8	2	1.6	7	2.7
missing	7		10		17	

FREUDEV: Welche Auffassung hat Ihr Mann gegenwärtig zur Geburt des Kindes?

- 1 - der Ehegatte der Mutter freut sich über das Kind
- 2 - seine Freude ist "nicht ganz ungeteilt"
- 3 - der Ehegatte der Mutter lehnt das Kind ab
- 9 - Vater unbekannt, seine Einstellung unbekannt

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	122	93.1	121	95.3	243	94.2
2	7	5.3	6	4.7	13	5.0
3	1	.8			1	.4
9	1	.8			1	.4
missing	9		12		21	

GEBURT**KRANKHEITSANAMNESE DER MUTTER****DIABEMU0: Diabetes mellitus**

- 1 - nicht bekannt
- 2 - Diabetes-Behandlung mit Antidiabetika
- 3 - Diabetes-Behandlung nur diätetisch
- 4 - Diabetes-Verdacht

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	140	100.0	136	100.0	276	100.0
missing			3		3	

HERZMU0: Herzerkrankungen

- 1 - nicht bekannt
- 2 - rheumatische Herzerkrankungen (Mitral- oder Aortenklappenfehler) ohne kardiale Komplikationen in der Schwangerschaft
- 3 - rheumatische Herzerkrankungen (Mitral- oder Aortenklappenfehler) mit kardialer Komplikation (Herzkreislaufdekomensation, Lungenödem, Rhythmusstörungen)
- 4 - Zustand nach Mitralvalvulotomie
- 5 - angeborene Herz- und / oder Gefäßmißbildung ohne Zyanose (D.Botallo apertus, Vorhof- und Kammerseptumdefekt, angeb. Ausflußbahnstenosen, Aortenisthmusstenose)
- 6 - Zyanotische Herzfehler (Fallot, Eisenmenger)
- 7 - Herzrhythmusstörung ohne organische Herzerkrankung
- 8 - Cor pulmonale

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	136	97.8	129	95.6	265	96.7
2	1	.7	2	1.5	3	1.1
3	1	.7	1	.7	2	.7
4			1	.7	1	.4
5	1	.7	1	.7	2	.7
7			1	.7	1	.4
missing	1		4		5	

GEBURT**KRANKHEITSANAMNESE DER MUTTER****NIEREMU0: Nierenerkrankungen**

1 - nicht bekannt

2 - chron. Nierenleiden (Pyelonephritis, Nephritis, Steinleiden, Zystennieren, nephrot. Syndrom

u.a.) ohne eingeschränkte Nierenfunktion

3 - chron. Nierenleiden mit eingeschränkter Nierenfunktion (Kreatinin-Clearance unter 80 ml, Kreatinin i.S. über 1,2 mg%)

4 - chron. Nierenleiden ohne Angabe über Nierenfunktion

5 - Zustand nach Nephrektomie ohne eingeschränkte Nierenfunktion

6 - Zustand nach Nephrektomie mit eingeschränkter Nierenfunktion

7 - andere seltene Nierenerkrankungen

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	128	91.4	126	93.3	254	92.4
2	12	8.6	6	4.4	18	6.5
5			3	2.2	3	1.1
missing			4		4	

LUNGENMU: Lungenerkrankungen

1 - nicht bekannt

2 - Lungentuberkulose, nicht mehr behandlungsbedürftig

3 - Lungentuberkulose, behandlungsbedürftig

4 - Lungentuberkulose, Zustand nach Thoraxchirurgischen Eingriffen

5 - Sarkoidose (M.Boeck)

6 - Asthma bronchiale

7 - chronische Bronchitis, Emphysem

8 - andere Lungenerkrankungen (seltene)

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	136	97.1	135	99.3	271	98.2
2	3	2.1	1	.7	4	1.4
3	1	.7			1	.4
missing			3		3	

GEBURT**KRANKHEITSANAMNESE DER MUTTER****SCHILMU0: Schilddrüsenerkrankungen**

- 1 - nicht bekannt
- 2 - euthyreote Struma
- 3 - Hyperthyreose
- 4 - Hypothyreose
- 5 - Zustand nach Strumektomie
- 6 - andere seltene Erkrankungen

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	140	100.0	135	99.3	275	99.6
5			1	.7	1	.4
missing			3		3	

ORGANMU0: Andere Organerkrankungen

- 0 - keine
- 1 - chronische Lebererkrankungen
- 2 - Hauterkrankungen
- 3 - Geschlechtskrankheit

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	135	96.4	131	94.2	266	95.3
1	5	3.6	6	4.3	11	3.9
2			2	1.4	2	.7

PSYKRMU0: Psychiatrische Erkrankungen

- 1 - nicht bekannt
- 2 - Krämpfe, Krampfanfälle
- 3 - Geisteskrankheit oder in einer Nervenlinik gewesen
- 4 - Auffällige Persönlichkeit
- 5 - Intelligenzminderung
- 6 - sonstige Erkrankungen

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	138	98.6	139	100.0	277	99.3
2	1	.7			1	.4
6	1	.7			1	.4

GEBURT**KRANKHEITSANAMNESE DER MUTTER****NEUROMU0: Neurologische Erkrankungen**

- 1 - nicht bekannt
- 2 - Migräne oder vasomotorische Kopfschmerzen
- 3 - Neuralgien (Neuritis, Neuropathie)
- 4 - Multiple Sklerose
- 5 - Myopathie
- 6 - Hirn-Tumoren
- 7 - andere seltene Erkrankungen

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	139	99.3	135	99.3	274	99.3
4	1	.7			1	.4
7			1	.7	1	.4
missing			3		3	

GYNAEKOP: Gynäkologische Operationen

- 1 - keine
- 2 - Plastische Operationen der Scheide, des Darmes
- 3 - Operationen am Uterus
- 4 - Operationen an den Adnexen
- 5 - antefixierende Operationen

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	136	97.1	132	97.1	268	97.1
3	2	1.4	1	.7	3	1.1
4	2	1.4	3	2.2	5	1.8
missing			3		3	

MEDIKTH: Medikamentöse Dauertherapie

- 1 - nein
- 2 - ja

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	135	97.8	134	99.3	269	98.5
2	3	2.2	1	.7	4	1.5
missing	2		4		6	

GEBURT**SCHWANGERSCHAFTSANAMNESE****VABORT: Anzahl vorausgegangener Aborte (einschließlich Interruptiones)**

- 1 - keine
- 2 - ein Abort
- 3 - 2 Aborte
- 4 - 3 Aborte
- 5 - 4 Aborte u.s.w.

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	99	86.1	102	85.0	201	85.5
2	16	13.9	12	10.0	28	11.9
3			3	2.5	3	1.3
4			1	.8	1	.4
5			2	1.7	2	.9
missing	25		19		44	

VANZGEB: Anzahl der vorausgegangenen Geburten

- 1 - keine
- 2 - eine Geburt
- 3 - 2 Geburten
- 4 - 3 Geburten
- 5 - 4 Geburten
- 6 - 5 Geburten
- 7 - 6 Geburten
- 8 - 7 Geburten und mehr

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	66	53.2	69	54.3	135	53.8
2	42	33.9	41	32.3	83	33.1
3	9	7.3	14	11.0	23	9.2
4	6	4.8	3	2.4	9	3.6
5	1	.8			1	.4
missing	16		12		28	

VSPAEGES: Spätgestosen nach vorausgegangenen Schwangerschaften

- 1 - nicht bekannt
 2 - einmal
 3 - wiederholt

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	116	97.5	111	99.1	227	98.3
2	2	1.7	1	.9	3	1.3
3	1	.8			1	.4
missing	21		27		48	

VHYPERBI: Hyperbilirubinämie bei Kindern vorausgegangener Schwangerschaften

- 1 - keine
 2 - Ikterus ohne AT
 3 - AT
 4 - Hydrops (bei MHN)
 5 - Totgeburt (bei MHN)

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	119	100.0	110	98.2	229	99.1
3			2	1.8	2	.9
missing	21		27		48	

VBLUTTRA: Bluttransfusionen bei der Mutter während vorausgegangener Schwangerschaften

- 1 - keine
 2 - erhalten, vertragen
 3 - erhalten, nicht vertragen
 4 - erhalten, Verträglichkeit nicht geklärt

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	117	98.3	103	93.6	220	96.1
2	2	1.7	7	6.4	9	3.9
missing	21		29		50	

GEBURT**SCHWANGERSCHAFTSANAMNESE****VANTID: Anti-D Prophylaxe nach vorausgegangenen Schwangerschaften**

- 1 - keine
- 2 - einmal
- 3 - mehrmals

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	118	100.0	111	100.0	229	100.0
missing	22		28		50	

VFRUEHGE: Frühgeburten (2500 g und darunter)

- 1 - keine
- 2 - einmal
- 3 - wiederholt

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	112	94.9	105	94.6	217	94.8
2	6	5.1	6	5.4	12	5.2
missing	22		28		50	

VTOTGEB: Totgeburten

- 1 - keine
- 2 - einmal
- 3 - wiederholt

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	117	98.3	111	100.0	228	99.1
2	2	1.7			2	.9
missing	21		28		49	

VFEHLBIL: Fehlbildungen

- 1 - keine
- 2 - geistige Schäden
- 3 - körperliche Fehlbildungen
- 4 - Kombination von 2 und 3
- 5 - nicht bekannt

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	117	100.0	111	100.0	228	100.0
missing	23		28		51	

GEBURT**SCHWANGERSCHAFTSVERLAUF****VORSORGE: Anzahl der Vorsorgeuntersuchungen in der Schwangerschaft**

- 1 - keine
- 2 - eine Vorsorgeuntersuchung
- 3 - 2 Vorsorgeuntersuchungen
- 4 - 3 Vorsorgeuntersuchungen
- 5 - 4 Vorsorgeuntersuchungen
- 6 - 5 Vorsorgeuntersuchungen
- 7 - 6 Vorsorgeuntersuchungen
- 8 - 7 Vorsorgeuntersuchungen und mehr

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	3	2.2	3	2.2	6	2.2
2			1	.7	1	.4
3	2	1.5	4	3.0	6	2.2
4	7	5.1	5	3.7	12	4.4
5	7	5.1	8	6.0	15	5.5
6	19	13.9	12	9.0	31	11.4
7	9	6.6	8	6.0	17	6.3
8	90	65.7	93	69.4	183	67.5
missing	3		5		8	

FRUEHGES: Frühgestose (Emesis, Hyperemesis grav.)

- 1 - keine
- 2 - leichte Form, unbehandelt
- 3 - schwere Form, behandelt
- 4 - schwerere Form, mit langfristiger oder wiederholter stationärer Behandlung

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	127	91.4	114	85.7	241	88.6
2	9	6.5	15	11.3	24	8.8
3	2	1.4	4	3.0	6	2.2
4	1	.7			1	.4
missing	1		6		7	

GEBURT**SCHWANGERSCHAFTSVERLAUF****SPAETGES: Spätgestose**

- 1 - keine
- 2 - leichte Präeklampsie
- 3 - schwere Präeklampsie
- 4 - Eklampsie
- 5 - Pfropfgestose
- 6 - leichte Hypertonie ohne Pfropfgestose
- 7 - schwere Hypertonie ohne Pfropfgestose
- 8 - Gestoseverdacht

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	122	87.1	118	86.8	240	87.0
2	9	6.4	5	3.7	14	5.1
3	2	1.4	2	1.5	4	1.4
5	1	.7			1	.4
6	4	2.9	4	2.9	8	2.9
7			1	.7	1	.4
8	2	1.4	6	4.4	8	2.9
missing			3		3	

HARNWEG: Harnwegsinfekt in graviditate

- 1 - nicht bekannt
- 2 - febril - stationär behandelt
- 3 - febril - ambulant behandelt
- 4 - afebril - stationär behandelt
- 5 - afebril - ambulant behandelt

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	126	90.0	131	96.3	257	93.1
2	1	.7	1	.7	2	.7
3	1	.7			1	.4
4	7	5.0			7	2.5
5	5	3.6	4	2.9	9	3.3
missing			3		3	

GEBURT**SCHWANGERSCHAFTSVERLAUF****ANAEMIE: Anämie**

- 1 - keine
- 2 - leichte Form (Hb 11-9 g%)
- 3 - schwere Form (Hb unter 9,0 g%)
- 4 - ohne genaue Hb-Angabe

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	127	91,4	122	91,0	249	91,2
2	10	7,2	11	8,2	21	7,7
3	2	1,4	1	.7	3	1,1
missing	1		5		6	

KREISLAU: Kreislaufstörungen

- 1 - keine
- 2 - hypertone Dysregulationen (labile Hypertonie)
- 3 - hypotone Dysregulationen (RR Syst. unter 100 mm Hg, Neigung zu Ohnmachtsanfällen)

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	137	97,9	132	97,1	269	97,5
2	1	.7	1	.7	2	.7
3	2	1,4	3	2,2	5	1,8
missing			3		3	

IKTERUS: Ikterus in der Schwangerschaft

- 1 - keinen
- 2 - Pruritus gravidarum
- 3 - idiopathischer Schwangerschaftsikterus
- 4 - Virushepatitis
- 5 - Verschlußikterus (Cholelithiasis)
- 6 - Drogenikterus
- 7 - Leberkoma
- 8 - sonstige seltene Lebererkrankungen

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	140	100,0	135	99,3	275	99,6
8			1	.7	1	.4
missing			3		3	

INFEKTKR: Infektionskrankheiten in der Schwangerschaft

- 1 - keine
- 2 - Toxoplasmose
- 3 - Listeriose
- 4 - Röteln
- 5 - afebrile grippale Infektion
- 6 - febrile grippale Infektion
- 7 - Lues
- 8 - sonstige Viruserkrankungen
- 9 - sonstige bakterielle Erkrankungen

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	135	96.4	135	99.3	270	97.8
6	5	3.6			5	1.8
9			1	.7	1	.4
missing			3		3	

BLUTUN1H: Blutungen in der 1. Schwangerschaftshälfte

- 1 - keine Blutungen
- 2 - geringe Blutungen, ambulant behandelt
- 3 - geringen Blutungen, stationär behandelt
- 4 - stärkere oder wiederholte Blutungen, ambulant behandelt
- 5 - stärkere oder wiederholte Blutungen, stationär behandelt
- 6 - Blutungen ohne nähere Angaben

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	131	94.2	130	96.3	261	95.3
2	4	2.9	2	1.5	6	2.2
3	3	2.2	3	2.2	6	2.2
5	1	.7			1	.4
missing	1		4		5	

BLUTUN2H: Blutungen in der 2. Schwangerschaftshälfte oder unter der Geburt

- 1 - keine Blutungen
- 2 - Plazenta praevia
- 3 - tiefer Sitz der Plazenta
- 4 - vorzeitige Lösung der richtig sitzenden Plazenta
- 5 - Randsinusblutung
- 6 - Uterusruptur
- 7 - Gefäßruptur bei Insertio velamentosa
- 8 - Ruptur eines Varixknotens der Scheide
- 9 - sonstige Blutungsursachen

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	134	95.7	132	97.8	266	96.7
2	2	1.4			2	.7
4			1	.7	1	.4
9	4	2.9	2	1.5	6	2.2
missing			4		4	

CHIRURG: Chirurgische Eingriffe in der Schwangerschaft

- 1 - keine
- 2 - Laparotomie bis einschließlich 14. Woche p.m. in Lokalanästhesie
- 3 - Laparotomie bis einschließlich 14. Woche p.m. in Barbiturat / Äther-Narkose
- 4 - Laparotomie bis einschließlich 14. Woche p.m. in Intubations-Narkose (N₂O/O₂-Halan o.a.)
- 5 - Laparotomie nach 14. Woche p.m. in Lokalanästhesie
- 6 - Laparotomie nach 14. Woche p.m. in Barbiturat / Äther-Narkose
- 7 - Laparotomie nach 14. Woche p.m. in Intubations-Narkose
- 8 - Ileus in graviditate
- 9 - sonstige größere chirurgische Eingriffe (z.B. Herz, Lunge, Schädel)

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	139	99.3	136	100.0	275	99.6
4	1	.7			1	.4
missing			3		3	

UNFALL: Unfälle in der Schwangerschaft

- 1 - keine
- 2 - leichtere Unfälle z.B. Sturz auf ebener Erde, Sturz von der Treppe ohne ernsthafte Verletzungen
- 3 - Unfälle mit Knochenfraktur oder größeren Weichteilwunden
- 4 - Unfälle mit Bewußtlosigkeit
- 5 - stumpfes Bauchtrauma (Stoß, Schlag)

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	138	98.6	136	100.0	274	99.3
2	2	1.4			2	.7
missing			3		3	

GEBURT**SEROLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN****BLUTMU: Blutgruppe der Mutter**

- 1 - 0
- 2 - A₁
- 3 - A₂
- 4 - B
- 5 - A₁B
- 6 - A₂B
- 7 - nicht bekannt

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	56	40.6	59	43.4	115	42.0
2	46	33.3	51	37.5	97	35.4
3	1	.7	2	1.5	3	1.1
4	29	21.0	19	14.0	48	17.5
5	6	4.3	5	3.7	11	4.0
missing	2		3		5	

RHMU: Rh - Faktor der Mutter

- 1 - Rh-positiv
- 2 - rh-negativ
- 3 - nicht bekannt

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	113	83.1	116	85.3	229	84.2
2	23	16.9	19	14.0	42	15.4
3			1	.7	1	.4
missing	4		3		7	

GEBURT**SEROLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN****BLUTVA: Blutgruppe des (vermutlichen) Vaters**

- 1 - 0
- 2 - A₁
- 3 - A₂
- 4 - B
- 5 - A₁B
- 6 - A₂B
- 7 - nicht bekannt

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	1	.7	3	2.2	4	1.5
2	1	.7	1	.7	2	.7
3	3	2.2			3	1.1
5	1	.7	4	2.9	5	1.8
7	131	95.6	128	94.1	259	94.9
missing	3		3		6	

RHVA: Rh - Faktor des (vermutlichen) Vaters

- 1 - Rh-positiv
- 2 - rh-negativ
- 3 - nicht bekannt

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	6	4.4	3	2.2	9	3.3
2	1	.7	1	.7	2	.7
3	129	94.9	131	96.3	260	95.6
7			1	.7	1	.4
missing	4		3		7	

GEBURT**SEROLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN****ANTI-KOE: Spezifität des Antikörpers**

(bei Vorliegen mehrerer Antikörper werden die entsprechenden Werte nebeneinander eingetragen)

0 - keine bzw. keine weiteren Antikörper

1 - Anti D

2 - Anti C

3 - Anti E

4 - Anti e

5 - Anti c^w

6 - Anti c

7 - sonst. "Immun"-Antikörper (Kell, Lu^b, jK^a, jK^b, Fy^a, Fy^c)

8 - Spontan-Antikörper (Le^a, P, M, N)

9 - nicht identifizierbare Antikörper

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
00	133	96.4	129	96.3	262	96.3
10	2	1.4	2	1.5	4	1.5
12			2	1.5	2	.7
20	1	.7			1	.4
29			1	.7	1	.4
90	2	1.4			2	.7
missing	2		5		7	

AMNIOSKO: Amnioskopie

(nur Befunde, die innerhalb 48 h ante partum erhoben wurden)

1 - keine

2 - Fruchtwasser klar

3 - Fruchtwasser grün

4 - Fruchtwasser braun

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	87	63.5	95	70.9	182	67.2
2	45	32.8	37	27.6	82	30.3
3	5	3.6	2	1.5	7	2.6
missing	3		5		8	

GEBURT**SEROLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN****AMNZANZ: Amniozentese - Anzahl der Befunde**

0 - keine Eintragung

Codierung entspricht der jeweiligen Anzahl der Befunde

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	139	99.3	135	97.1	274	98.2
1			1	.7	1	.4
3	1	.7	3	2.2	4	1.4

AMNZ1WO: Amniozentese - 1. Befund

0 - kein Befund

Codierung entspricht der Schwangerschaftswoche der 1. Befunderhebung

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	139	99.3	135	97.1	274	98.2
12			1	.7	1	.4
26			1	.7	1	.4
29			2	1.4	2	.7
34	1	.7			1	.4

AMNZ1TY: Amniozentese - 1. Befund - Typ

1 - keine

2 - Liley Typ I

3 - Liley Typ II

4 - Liley Typ III

5 - sonstige pathol. Befunde (z.B. nur Blut)

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	135	97.1			274	98.2
2					1	.4
3	3	2.2			3	1.1
5	1	.7			1	.4

GEBURT**SEROLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN****AMNZ2WO: Amniozentese - 2. Befund**

0 - kein Befund

Codierung entspricht der Schwangerschaftswoche der 2. Befunderhebung

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	139	99.3	136	97.8	275	98.6
30			1	.7	1	.4
32			1	.7	1	.4
34			1	.7	1	.4
36	1	.7			1	.4

AMNZ2TY: Amniozentese - 2. Befund - Typ

1 - keine

2 - Liley Typ I

3 - Liley Typ II

4 - Liley Typ III

5 - sonstige pathol. Befunde (z.B. nur Blut)

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	139	99.3	136	97.8	275	98.6
2	1	.7			1	.4
3			3	2.2	3	1.1

AMNZ3WO: Amniozentese - 3. Befund

0 - kein Befund

Codierung entspricht der Schwangerschaftswoche der 3. Befunderhebung

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	139	99.3	136	97.8	275	98.6
31			1	.7	1	.4
36			1	.7	1	.4
38	1	.7	1	.7	2	.7

GEBURT**SEROLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN****AMNZ3TY: Amniozentese - 3. Befund - Typ**

- 1 - keine
- 2 - Liley Typ I
- 3 - Liley Typ II
- 4 - Liley Typ III
- 5 - sonstige pathol. Befunde (z.B. nur Blut)

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	139	99.3	136	97.8	275	98.6
2	1	.7	2	1.4	3	1.1
3			1	.7	1	.4

FRUCHTWA: Fruchtwasserbeurteilung nach Blasensprung

- 1 - klar
- 2 - grün
- 3 - grün und Mekoniumklümpchen
- 4 - braun
- 5 - blutig

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	114	83.8	120	89.6	234	86.7
2	21	15.4	13	9.7	34	12.6
3			1	.7	1	.4
5	1	.7			1	.4
missing	4		5		9	

GEBURT**ANGABEN ZUR GEBURT****BLASSPR: Blasensprung vor der Geburt des Kindes**

- 1 - unter 24 h
- 2 - 24 - 48 h
- 3 - 48 Stunden und darüber

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	132	95.7	128	95.5	260	95.6
2	6	4.3	5	3.7	11	4.0
3			1	.7	1	.4
missing	2		5		7	

INGANGGE: Eingangskommen der Geburt

- 1 - spontan
- 2 - medikamentöse Einleitung ohne Blasensprung
- 3 - Wehenmittel, fraktioniert
- 4 - Wehentropf
- 5 - medikamentöse Einleitung mit Blasensprung (mit oder ohne MM-Dilatation)

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	115	84.6	112	84.8	227	84.7
2			2	1.5	2	.7
3			1	.8	1	.4
4	11	8.1	3	2.3	14	5.2
5	10	7.4	14	10.6	24	9.0
missing	4		7		11	

WEHEN: Wehentätigkeit

- 1 - normal
- 2 - primäre Wehenschwäche
- 3 - sekundäre Wehenschwäche

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	112	84.2	111	84.7	223	84.5
2	8	6.0	6	4.6	14	5.3
3	13	9.8	14	10.7	27	10.2
missing	7		8		15	

GEBURT**ANGABEN ZUR GEBURT****ARTENT: Art der Entbindung**

- 1 - spontan, Schädellage (einschl. Handgriff nach KRISTELLER)
- 2 - primäre Sectio caes. abdom.
- 3 - Wendung und ganze Extraktion
- 4 - Forceps Beckenboden (Beckenausgang)
- 5 - Forceps Beckenmitte
- 6 - Forceps Beckeneingang
- 7 - Vakuumextraktion Beckenboden
- 8 - Vakuumextraktion Beckenmitte
- 9 - Vakuumextraktion Beckeneingang und unvollständigem Muttermund
- 10 - Vakuumextraktion - Versuch mißglückt, anschließend Forceps
- 11 - Vakuumextraktion - Versuch mißglückt, anschließend Sectio
- 13 - andere Manualhilfen ohne Extraktion
- 14 - halbe Extraktion (bei Beckenendlage): mit Armlösung
- 15 - halbe Extraktion (bei Beckenendlage): ohne Armlösung
- 16 - ganze Extraktion
- 17 - sonstige oben nicht einzuordnende Entbindung

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	88	63.3	85	63.0	173	63.1
2	10	7.2	11	8.1	21	7.7
3			1	.7	1	.4
4	11	7.9	6	4.4	17	6.2
5	5	3.6	3	2.2	8	2.9
7	9	6.5	6	4.4	15	5.5
8	9	6.5	7	5.2	16	5.8
10	1	.7			1	.4
11	1	.7	1	.7	2	.7
13	4	2.9	12	8.9	16	5.8
14	1	.7	2	1.5	3	1.1
15			1	.7	1	.4
missing	1		4		5	

GEBURT**ANGABEN ZUR GEBURT****GEBLAGE: Geburtslage des Kindes**

- 1 - vordere HHL (Hinterhauptslage)
- 2 - hintere HHL
- 3 - Gesichts- und Stirnlage
- 4 - sonstige Deflexionslagen
- 5 - tiefer Querstand
- 6 - sonstige Einstellungsanomalien des Schädels
- 7 - Beckenendlage
- 8 - Querlage

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	118	85.5	104	80.0	222	82.8
2	7	5.1	3	2.3	10	3.7
3	2	1.4	1	.8	3	1.1
4	2	1.4			2	.7
5			1	.8	1	.4
6	1	.7	1	.8	2	.7
7	6	4.3	19	14.6	25	9.3
8	2	1.4	1	.8	3	1.1
missing	2		9		11	

GEBURT**ANGABEN ZUR GEBURT****DAUERGEB:Dauer der Geburt**

(Geburtsbeginn = regelmäßige Wehen in 10' Abstand, die zur MM-Eröffnung führen)

Codierung entspricht der jeweiligen Dauer der Geburt in Stunden
98 - Sectio am wehenlosen Uterus

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	2	1.4	3	2.3	5	1.9
2	4	2.9	9	6.8	13	4.8
3	16	11.4	17	12.8	33	12.3
4	20	14.3	13	9.8	33	12.3
5	13	9.3	21	15.8	34	12.6
6	13	9.3	24	18.0	37	13.8
7	18	12.9	12	9.0	30	11.2
8	13	9.3	9	6.8	22	8.2
9	7	5.0	7	5.3	14	5.2
10	7	5.0	6	4.5	13	4.8
11	9	6.4	2	1.5	11	4.1
12	1	.7	1	.8	2	.7
13	4	2.9			4	1.5
14	2	1.4			2	.7
15			4	3.0	4	1.5
16	1	.7	1	.8	2	.7
17	1	.7	1	.8	2	.7
18			2	1.5	2	.7
20	1	.7			1	.4
23	1	.7			1	.4
98	3	2.2	1	.8	4	1.5
missing	4		6		10	

GEBURT**GEBURTSKOMPLIKATIONEN****GHERZ: Alteration der kindlichen Herztöne**

- 1 - keine
- 2 - HT über 160/min
- 3 - HT unter 100/min
- 4 - unregelmäßige Frequenz

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	115	82.1	114	84.4	229	83.3
2	4	2.9	7	5.2	11	4.0
3	11	7.9	5	3.7	16	5.8
4	10	7.1	9	6.7	19	6.9
missing			4		4	

GNABEL: Nabelschnurkomplikationen

- 1 - keine
- 2 - Nabelschnurvorfall
- 3 - Nabelschnurknoten
- 4 - straffe Nabelschnurumschlingung
- 5 - sonstige Komplikationen

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	116	82.9	115	85.2	231	84.0
2			1	.7	1	.4
3	1	.7	2	1.5	3	1.1
4	21	15.0	16	11.9	37	13.5
5	2	1.4	1	.7	3	1.1
missing			4		4	

GEBURT**GEBURTSKOMPLIKATIONEN****GNABINS: Insertion der Nabelschnur**

- 1 - zentral und lateral
- 2 - marginal
- 3 - Insertio velamentosa
- 4 - 1 mit Fehlen einer Nabelschnurarterie
- 5 - 2 mit Fehlen einer Nabelschnurarterie
- 6 - 3 mit Fehlen einer Nabelschnurarterie

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	135	96.4	129	94.9	264	95.7
2	4	2.9	6	4.4	10	3.6
3	1	.7	1	.7	2	.7
missing			3		3	

GPLAZEN: Besonderheiten der Plazenta

- 1 - keine
- 2 - hydropische Plazenta
- 3 - Plazentainfarkte (mehr als ein Drittel der Gesamtfläche)
- 4 - sonstige Auffälligkeiten

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	131	94.9	127	94.8	258	94.9
3	4	2.9	1	.7	5	1.8
4	3	2.2	6	4.5	9	3.3
missing	2		5		7	

GFIEBER: Fieber sub partu

- 1 - kein Fieber
- 2 - 37,1 - 38,0
- 3 - über 38,0° C

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	120	87.6	126	95.5	246	91.4
2	14	10.2	5	3.8	19	7.1
3	3	2.2	1	.8	4	1.5
missing	3		7		10	

GEBURT**SEROLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN SUB PARTU****MIKROBLU: Anzahl der Mikrobiutuntersuchungen sub partu**

- 1 - keine
- 2 - 1 Untersuchung
- 3 - 2 Untersuchungen
- 4 - 3 Untersuchungen
- 5 - 4 Untersuchungen
- 6 - 5 Untersuchungen
- 7 - 6 Untersuchungen
- 8 - 7 Untersuchungen und mehr

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	103	85.8	106	89.1	209	87.4
2	8	6.7	8	6.7	16	6.7
3	5	4.2	4	3.4	9	3.8
4	3	2.5	1	.8	4	1.7
5	1	.8			1	.4
missing	20		20		40	

PHASANZ: Anzahl der Angaben zur Geburtsphase und pH-Wert

Codierung entspricht der jeweiligen Anzahl der Angaben

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	11	55.0	10	66.7	21	60.0
2	6	30.0	3	20.0	9	25.7
3	3	15.0	2	13.3	5	14.3
missing	120		124		244	

PHAS1: Geburtsphase 1. Angabe

- 2 - Eröffnungsperiode, Muttermund unter 5 cm
- 3 - Eröffnungsperiode, Muttermund bis 5 cm
- 4 - Austreibungsperiode

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
2	12	60.0	10	66.7	22	62.9
3	5	25.0	2	13.3	7	20.0
4	3	15.0	3	20.0	6	17.1
missing	120		124		244	

GEBURT**SEROLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN SUB PARTU****PHAS1PH: pH-Wert 1. Angabe**

Codierung entspricht den ersten beiden Dezimalen des pH-Wertes

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
20	1	5.0			1	2.9
25	1	5.0			1	2.9
26	1	5.0			1	2.9
27			1	6.7	1	2.9
31			1	6.7	1	2.9
32	2	10.0			2	5.7
33			1	6.7	1	2.9
34	2	10.0			2	5.7
35	1	5.0			1	2.9
38	1	5.0	1	6.7	2	5.7
41	1	5.0			1	2.9
42	1	5.0			1	2.9
45	1	5.0			1	2.9
61			1	6.7	1	2.9
70	1	5.0			1	2.9
71			1	6.7	1	2.9
72	1	5.0	2	13.3	3	8.6
73	6	30.0	4	26.7	10	28.6
74			3	20.0	3	8.6
missing	120		124		244	

PHAS2: Geburtsphase 2. Angabe

2 - Eröffnungsperiode, Muttermund unter 5 cm

3 - Eröffnungsperiode, Muttermund bis 5 cm

4 - Austreibungsperiode

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
2	4	44.4	1	20.0	5	35.7
3	3	33.3	4	80.0	7	50.0
4	1	11.1			1	7.1
5	1	11.1			1	7.1
missing	131		134		265	

GEBURT**SEROLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN SUB PARTU****PHAS2PH: pH-Wert 2. Angabe**

Codierung entspricht den ersten beiden Dezimalen des pH-Wertes

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
23	1	11.1			1	7.1
29	1	11.1	1	20.0	2	14.3
30	1	11.1			1	7.1
32	1	11.1			1	7.1
33	1	11.1			1	7.1
42	1	11.1			1	7.1
60			1	20.0	1	7.1
72	1	11.1			1	7.1
73	2	22.2	3	60.0	5	35.7
missing	131		134		265	

PHAS3: Geburtsphase 3. Angabe

2 - Eröffnungsperiode, Muttermund unter 5 cm

3 - Eröffnungsperiode, Muttermund bis 5 cm

4 - Austreibungsperiode

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
2	1	33.3			1	20.0
3	1	33.3			1	20.0
4			2	1.4	2	40.0
5	1	33.3			1	20.0
missing	137		137		274	

PHAS3PH: pH-Wert 3. Angabe

Codierung entspricht den ersten beiden Dezimalen des pH-Wertes

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	1	25.0			1	16.7
29	1	25.0			1	16.7
30	1	25.0			1	16.7
46	1	25.0			1	16.7
73			1	50.0	1	16.7
74			1	50.0	1	16.7

missing	136		137		273	
---------	-----	--	-----	--	-----	--

GEBURT**MEDIKAMENTE SUB PARTU****SPASMOLY: Spasmolytika**
(außer Dolcontral)

- 1 - keine
- 2 - einmalige Gabe
- 3 - wiederholte Gabe

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	86	62.8	97	72.4	183	67.5
2	33	24.1	27	20.1	60	22.1
3	18	13.1	10	7.5	28	10.3
missing	3		5		8	

ANALGET: Analgetika, Phenothiazine und Morphinderivate
(bei Kombination zweier Pharmaka sind beide verschlüsselt)

- 1 - keine
- 2 - Dolcontral
- 3 - Phenothiazine
- 4 - Tranquilizer
- 5 - Morphin
- 6 - Dolcontral und Phenothiazine und/oder Tranquilizer
- 7 - Morphin, Phenothiazine und/oder Tranquilizer
- 8 - Phenothiazine und Tranquilizer
- 9 - sonstige Analgetika

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
10	86	61.9	92	68.1	178	65.0
20	44	31.7	37	27.4	81	29.6
24	1	.7	2	1.5	3	1.1
25	2	1.4			2	.7
40	4	2.9	2	1.5	6	2.2
41			1	.7	1	.4
60	2	1.4			2	.7
70			1	.7	1	.4
missing	1		4		5	

GEBURT**MEDIKAMENTE SUB PARTU****ANESTET: Anesthetika**

- 1 - keine
- 2 - Barbiturate
- 3 - Aether
- 4 - Intubationsnarkose (N₂O-Halan)
- 5 - Lokalanästhesie

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	125	90.6	119	88.1	244	89.4
2			3	2.2	3	1.1
4	8	5.8	12	8.9	20	7.3
5	5	3.6	1	.7	6	2.2
missing	2		4		6	

WEHENMI: Wehenmittel sub partu (bis Geburt des Kindes)

- 1 - keine
- 2 - 1 VE (Voegtlin-Einheiten) Oxytocin i.m. mehr als 1 VE oder wiederholt
- 3 - 1 VE Oxytocin i.m.
- 4 - Oxytocin buccal
- 5 - Oxytocin Tropfinfusion bis 6 VE
- 6 - Oxytocin Tropfinfusion über 6 VE
- 7 - Chinin

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	84	60.4	80	59.3	164	59.9
2	7	5.0	4	3.0	11	4.0
3	15	10.8	14	10.4	29	10.6
4	1	.7			1	.4
5	28	20.1	34	25.2	62	22.6
6	4	2.9	3	2.2	7	2.6
missing	1		4		5	

GEBURT**ANGABEN ZUM NEUGEBORENEN**

Im Codebuch werden nur die Daten der Neonatologieerhebung von 1970/71 aufgeführt, die nach kritischer Durchsicht der ursprünglichen Dokumentation durch den Neonatologen Doz. Dr. Plath (Universitätskinderklinik) auch heute noch Aussagewert besitzen.

Außerdem sind die Variablen belassen worden, die in die Berechnung des BRII eingingen.

ENTBIDAU: Verweildauer in der Entbindungseinrichtung

Codierung entspricht dem jeweiligen Kreißsalaufenthalt in Stunden

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	8	5.8	8	5.9	16	5.9
2	94	68.1	87	64.4	181	66.3
3	20	14.5	21	15.6	41	15.0
4	12	8.7	12	8.9	24	8.8
5	1	.7	3	2.2	4	1.5
6	2	1.4			2	.7
7			1	.7	1	.4
8	1	.7	2	1.5	3	1.1
25			1	.7	1	.4
missing	2		4		6	

GEBURT**ANGABEN ZUM NEUGEBORENEN****KINDDAU: Verweildauer in der Kinderstation**

Codierung entspricht dem jeweiligen Aufenthalt in der Kinderstation der Entbindungseinrichtung in Stunden

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
14			1	.9	1	.4
96	3	2.7	1	.9	4	1.8
120	40	36.0	35	31.0	75	33.5
144	19	17.1	24	21.2	43	19.2
168	25	22.5	18	15.9	43	19.2
192	9	8.1	12	10.6	21	9.4
212			1	.9	1	.4
216			6	5.3	6	2.7
240	2	1.8	3	2.7	5	2.2
248	1	.9			1	.4
260			1	.9	1	.4
264	2	1.8	2	1.8	4	1.8
288	3	2.7	1	.9	4	1.8
312	2	1.8	2	1.8	4	1.8
336			2	1.8	2	.9
360	2	1.8	1	.9	3	1.3
408	1	.9			1	.4
432	1	.9	2	1.8	3	1.3
504	1	.9			1	.4
961			1	.9	1	.4
missing	29		26		55	

GEBURT**ANGABEN ZUM NEUGEBORENEN****ENTLASSH: Entlassung des Kindes**

- 1 - Entlassung des Kindes nach Hause
- 2 - Adoption
- 3 - Verlegung in ein Pflege- oder Säuglingsheim
- 4 - Verlegung in eine Kinderklinik
- 5 - Verlegung in eine chirurgische Einrichtung
- 6 - Verstorben in der Entbindungseinrichtung

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	111	94.1	111	89.5	222	91.7
2			1	.8	1	.4
4	7	5.9	12	9.7	19	7.9
missing	22		15		37	

GEW0: Geburtsgewicht in kg

siehe S. 2

GR0: Geburtslänge in cm

siehe S. 2

SCHAED0: Größter Kopfumfang in cm

Codierung entspricht dem jeweiligen größten Kopfumfang in cm

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
30	1	.7			1	.4
31	1	.7	3	2.3	4	1.5
32	1	.7	2	1.5	3	1.1
33	8	5.9	12	9.0	20	7.4
34	15	11.0	39	29.3	54	20.1
35	26	19.1	32	24.1	58	21.6
36	39	28.7	31	23.3	70	26.0
37	36	26.5	9	6.8	45	16.7
38	7	5.1	4	3.0	11	4.1
39	2	1.4	1	.8	3	1.1
missing	4		6		10	

GEBURT**ÄRZTLICHE ERSTUNTERSUCHUNG****REIFEBEU: Reifebeurteilung**

- 1 - Normalkind
- 2 - Hypertrophes Kind
- 3 - Überreifesyndrom (Clifford I)
- 4 - Überreifesyndrom (Clifford II)
- 5 - Überreifesyndrom (Clifford III)
- 6 - Reine Dystrophie, Hypotrophie
- 7 - Dysproportionierter Minderwuchs
- 8 - Partus prämaturos
- 9 - Partus immaturus (unter 32. Gest.Woche)

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	124	89.9	120	90.2	244	90.0
2	3	2.2	1	.8	4	1.5
3	1	.7	1	.8	2	.7
5			1	.8	1	.4
6	2	1.4	5	3.8	7	2.6
8	8	5.8	4	3.0	12	4.4
9			1	.8	1	.4
missing	2		6		8	

APGAR: APGAR - Note (1 min p.n.)

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1			2	1.5	2	.7
2	3	2.2	2	1.5	5	1.9
3	1	.7			1	.4
4	1	.7	8	6.0	9	3.3
5	3	2.2	2	1.5	5	1.9
6	7	5.1	3	2.3	10	3.7
7	3	2.2	3	2.3	6	2.2
8	13	9.5	8	6.0	21	7.8
9	36	26.3	32	24.1	68	25.2
10	70	51.1	73	54.9	143	53.0
missing	3		6		9	

NORAPGAR: Normalisierung einer pathologischen APGAR - Note

1 - schon 1 min p.n. APGAR-Note 8 - 10

2 - Normalisierung bis zur 5. min p.p.

3 - Normalisierung bis zur 10. min p.p.

4 - Normalisierung bis zur 30. min p.p.

5 - keine Normalisierung bis zur 30. min p.p., doch stabile Normalisierung bis zur 60. min

6 - keine Normalisierung bis zur 30. min p.p., doch stabile Normalisierung bis zur 2. Stunde

7 - keine Normalisierung bis zur 30. min p.p., doch stabile Normalisierung bis zur 6. Stunde

8 - keine Normalisierung bis zur 30. min p.p., doch stabile Normalisierung bis zur 12. Stunde

9 - keine stabile Normalisierung am 1. Lebenstag

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	80	81.6	80	80.8	160	81.2
2	10	10.2	8	8.1	18	9.1
3	6	6.1	2	2.0	8	4.1
4	2	2.0	6	6.1	8	4.1
5			3	3.0	3	1.5
missing	42		40		82	

THERAPPN: Therapiebeginn post natal (in min p.n.)

Codierung entspricht dem jeweiligen Therapiebeginn in Minuten p.n.

0 - kein

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	114	81.4	126	90.6	240	86.0
1	21	15.0	12	8.6	33	11.8
2	4	2.9			4	1.4
11	1	.7			1	.4
60			1	.7	1	.4

GEBURT**ÄRZTLICHE ERSTVERSORGUNG**

Alle folgenden Angaben stammen von der pädiatrischen Einrichtung (Kinderstation der Entbindungseinrichtung oder weiterbehandelnde pädiatrische Einrichtung).

REANANZ: Primäre Reanimation während der ersten 2 Lebensstunden - Anzahl der Angaben

Codierung entspricht der jeweiligen Anzahl der Angaben zur primären Reanimation

0 - keine

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	117	83.6	121	87.1	238	85.3
1	23	16.4	17	12.2	40	14.3
2			1	.7	1	.4

PUFFANZ: Puffertherapie - Anzahl der Angaben

Codierung entspricht der jeweiligen Anzahl der Angaben zur Puffertherapie

0 - keine

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	119	85.0	129	92.8	248	88.9
1	20	14.3	10	7.2	30	10.8
2	1	.7			1	.4

PUFF1ART: Puffertherapie 1. Angabe - Art der Puffertherapie

0 - keine

1 - intraumbilicale bzw. i.v. Blindinfusion (Stoßinfusion) von NaHCO_3 (0,3 mol oder 1,0 mol)

2 - -von THAM- Lösung (0,3 mol)

3 - i.u. bzw. i.v. Tropfinfusion mit NaHCO_3 (0,3 mol oder 1,0 mol)

4 - -von THAM- Lösung (0,3 mol)

5 - primäre Stoßinfusion anschließend Tropfinfusion von NaHCO_3 (0,3 mol oder 1,0 mol)

6 - -von THAM- Lösung (0,3 mol)

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	119	85.0	129	92.8	248	88.9
1	1	.7	1	.7	2	.7
2	19	13.6	8	5.8	27	9.7
4	1	.7	1	.7	2	.7

PUFF1ZEI: Puffertherapie 1. Angabe - Zeitpunkt

0 - keine

1 - Infusionsbeginn 5 min p.p.

2 - Infusionsbeginn 10 min p.p.

3 - Infusionsbeginn 15 min p.p.

4 - Infusionsbeginn 20 min p.p.

5 - Infusionsbeginn 30 min p.p.

6 - Infusionsbeginn 45 min p.p.

7 - Infusionsbeginn 60 min p.p.

8 - Infusionsbeginn 90 min p.p.

9 - Infusionsbeginn 120 min und darüber

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	119	85.0	130	93.5	249	89.2
1	16	11.4	9	6.5	25	9.0
2	4	2.9			4	1.4
3	1	.7			1	.4

PUFF1MEN: Puffertherapie 1. Angabe - Infusionsmenge

Codierung entspricht der jeweiligen Infusionsmenge in ml

0 - keine

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	119	85.0	129	92.8	248	88.9
2	1	.7			1	.4
10	3	2.1	1	.7	4	1.4
15	4	2.9	1	.7	5	1.8
20	13	9.3	5	3.6	18	6.5
30			1	.7	1	.4
200			2	1.4	2	.7

PUFF2ART: Puffertherapie 2. Angabe - Art der Puffertherapie

0 - keine

1 - intraumbilicale bzw. i.v. Blindinfusion (Stoßinfusion) von NaHCO₃ (0,3 mol oder 1,0 mol)

2 - -von THAM- Lösung (0,3 mol)

3 - i.u. bzw. i.v. Tropfinfusion mit NaHCO₃ (0,3 mol oder 1,0 mol)

4 - -von THAM- Lösung (0,3 mol)

5 - primäre Stoßinfusion anschließend Tropfinfusion von NaHCO₃ (0,3 mol oder 1,0 mol)

6 - -von THAM- Lösung (0,3 mol)

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	139	99.3	139	100.0	278	99.6
2	1	.7			1	.4

PUFF2ZEI: Puffertherapie 2. Angabe - Zeitpunkt

0 - keine

1 - Infusionsbeginn 5 min p.p.

2 - Infusionsbeginn 10 min p.p.

3 - Infusionsbeginn 15 min p.p.

4 - Infusionsbeginn 20 min p.p.

5 - Infusionsbeginn 30 min p.p.

6 - Infusionsbeginn 45 min p.p.

7 - Infusionsbeginn 60 min p.p.

8 - Infusionsbeginn 90 min p.p.

9 - Infusionsbeginn 120 min und darüber

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	139	99.3	139	100.0	278	99.6
4	1	.7			1	.4

PUFF2MEN: Puffertherapie 2. Angabe - Infusionsmenge

Codierung entspricht der jeweiligen Infusionsmenge in ml

0 - keine

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	139	99.3	139	100.0	278	99.6
10	1	.7			1	.4

GEBURT**ÄRZTLICHE ERSTVERSORGUNG****MEDIANZ: Medikamentöse Soforttherapie - Anzahl der Angaben**

Codierung entspricht der jeweiligen Anzahl der Angaben zur medikamentösen Soforttherapie
0 - keine

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	126	90.0	127	91.4	253	90.7
1	13	9.3	11	7.9	24	8.6
2	1	.7	1	.7	2	.7

MEDI1MED: Medikamentöse Soforttherapie 1. Angabe - Medikament

- 0 - keine
- 31 - Alupent, Aludrin
- 32 - Perphyllon
- 33 - Complamin
- 34 - andere vasodilat. Medikamente
- 35 - Glukose
- 36 - Calcium
- 37 - Vitamin B₆
- 38 - Vitamin K₁
- 39 - Antifibrinolytika (PAMBA, Contrykal)
- 40 - Subst. von Gerinnungsfaktoren (Plasmafraktionen)
- 41 - Erysediment, Vollblut
- 42 - Plasmainfusion
- 43 - Plasmaexpander
- 44 - Novodrin
- 45 - Analeptika
- 46 - Herzglykoside
- 47 - Corticoide

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	126	90.0	127	91.4	253	90.7
35	3	2.1	3	2.2	6	2.2
37			1	.7	1	.4
38	11	7.9	8	5.8	19	6.8

MEDI1ZEI: Medikamentöse Soforttherapie 1. Angabe - Zeitpunkt

0 - keine

1 - Therapiebeginn nach 5 min

2 - Therapiebeginn nach 10 min

3 - Therapiebeginn nach 15 min

4 - Therapiebeginn nach 20 min

5 - Therapiebeginn nach 30 min

6 - Therapiebeginn nach 45 min

7 - Therapiebeginn nach 60 min

8 - Therapiebeginn nach 90 min

9 - Therapiebeginn nach 120 min und darüber

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	126	90.0	127	91.4	253	90.7
1	4	2.9	6	4.3	10	3.6
2	3	2.1	4	2.9	7	2.5
4	5	3.6	2	1.4	7	2.5
5	2	1.4			2	.7

MEDI2MED: Medikamentöse Soforttherapie 2. Angabe - Medikament

- 0 - keine
- 31 - Alupent, Aludrin
- 32 - Perphyllon
- 33 - Complamin
- 34 - andere vasodilat. Medikamente
- 35 - Glukose
- 36 - Calcium
- 37 - Vitamin B₆
- 38 - Vitamin K₁
- 39 - Antifibrinolytika (PAMBA, Contrykal)
- 40 - Subst. von Gerinnungsfaktoren (Plasmafraktionen)
- 41 - Erysediment, Vollblut
- 42 - Plasmainfusion
- 43 - Plasmaexpander
- 44 - Novodrin
- 45 - Analeptika
- 46 - Herzglykoside
- 47 - Corticoide

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	139	99.3	138	99.3	277	99.3
35	1	.7			1	.4
38			1	.7	1	.4

MEDI2ZEI: Medikamentöse Soforttherapie 2. Angabe - Zeitpunkt

- 0 - keine
- 1 - Therapiebeginn nach 5 min
- 2 - Therapiebeginn nach 10 min
- 3 - Therapiebeginn nach 15 min
- 4 - Therapiebeginn nach 20 min
- 5 - Therapiebeginn nach 30 min
- 6 - Therapiebeginn nach 45 min
- 7 - Therapiebeginn nach 60 min
- 8 - Therapiebeginn nach 90 min
- 9 - Therapiebeginn nach 120 min und darüber

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	139	99.3	138	99.3	277	99.3
1			1	.7	1	.4
3	1	.7			1	.4

GEBURT**ÄRZTLICHE BASISUNTERSUCHUNG****HAUTBL: Hautdurchblutung**

- 1 - blaß
- 2 - blaß - rosig
- 3 - rosig
- 4 - krebsrot

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	4	2.9	4	3.0	8	2.9
2	8	5.8	9	6.7	17	6.3
3	125	91.2	122	90.4	247	90.8
missing	3		4		7	

CYANOSE: Cyanose

- 1 - keine
- 2 - perioral
- 3 - Gesichtscyanose
- 4 - Akrocyanose
- 5 - periorale und Akrocyanose
- 6 - Gesichts- und Akrocyanose
- 7 - generalisiert, in Ruhe
- 8 - generalisiert, beim Schreien

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	128	92.1	127	94.1	255	93.1
2	5	3.6	1	.7	6	2.2
3			3	2.2	3	1.1
4	6	4.3	3	2.2	9	3.3
5			1	.7	1	.4
missing	1		4		5	

IKTERNG: Ikterus

- 1 - ja
- 2 - nein

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	7	5.0	6	4.4	13	4.7
2	132	95.0	129	95.6	261	95.3

missing	1		4		5	
---------	---	--	---	--	---	--

GEBURT**ÄRZTLICHE BASISUNTERSUCHUNG****UNTERHAU: Unterhautfettgewebe**

- 1 - nicht vorhanden
- 2 - reduziert
- 3 - normal ausgeprägt

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	2	1.4	3	2.2	5	1.8
2	14	10.1	14	10.4	28	10.3
3	123	88.5	117	87.3	240	87.9
missing	1		5		6	

BLUTUG: Blutungen

- 0 - keine
- 1 - Haematome
- 2 - Petechiale Blutungen
- 3 - Haematome und petechiale Blutungen

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	135	96.4	131	94.2	266	95.3
1	4	2.9	7	5.0	11	3.9
2	1	.7	1	.7	2	.7

ATMUNG: Atmung

- 1 - regelmäßig und stabil
- 2 - apnoische Anfälle
- 3 - periodische Atmung
- 4 - Schnappatmung
- 5 - Apnoe

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	139	100.0	134	99.3	273	99.6
3			1	.7	1	.4
missing	1		4		5	

HERZAKT: Herzaktion

1 - regelmäßig (Embryocardie)

2 - unregelmäßig

3 - Herzstillstand

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	138	99.3	135	100.0	273	99.6
2	1	.7			1	.4
missing	1		4		5	

VERHALT: Verhaltenszustand bei der Untersuchung

- 1 - Augen geschlossen, keine Bewegung
- 2 - Augen geschlossen, keine groben Bewegungen
- 3 - Augen offen, keine Bewegung
- 4 - Augen offen, keine groben Bewegungen
- 5 - Augen offen, grobe Bewegungen

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	1	.7	2	1.5	3	1.1
2	10	7.3	4	3.0	14	5.2
3	1	.7	3	2.2	4	1.5
4	112	81.8	111	82.8	223	82.3
5	13	9.5	14	10.4	27	10.0
missing	3		5		8	

HALTUNG: Körperhaltung in Rückenlage

- 1 - normal und symmetrisch
- 2 - asymmetrisch
- 3 - Froschhaltung
- 4 - Opisthotonus

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	136	99.3	135	100.0	271	99.6
3	1	.7			1	.4
missing	3		4		7	

SPONMOT: Spontane Motorik

- 1 - unauffällig
- 2 - schwach hyperkinetisch
- 3 - ausgeprägt hyperkinetisch
- 4 - schwach hypokinetisch
- 5 - ausgeprägt hypokinetisch

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	135	98.5	132	97.8	267	98.2
4	2	1.5	3	2.2	5	1.8
missing	3		4		7	

MUSKTTON: Muskeltonus (gilt nur für reife Neugeborene)

(die Angaben sind kombiniert verschlüsselt)

- 1 - normal
- 2 - hypertonisch, obere Extremität - links
- 3 - hypertonisch, obere Extremität - rechts
- 4 - hypertonisch, untere Extremität - links
- 5 - hypertonisch, untere Extremität - rechts
- 6 - hypotonisch, obere Extremität - links
- 7 - hypotonisch, obere Extremität - rechts
- 8 - hypotonisch, untere Extremität - links
- 9 - hypotonisch, untere Extremität - rechts

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	135	99.3	133	98.5	268	98.9
67			2	1.5	2	.7
89	1	.7			1	.4
missing	4		4		8	

Für die Bestimmung der Laborwerte gelten die Vorschriften des DAB 7.

BLPHZA: Aktueller Blut pH-Wert - Anzahl der Angaben

0 - keine

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	133	95.0	134	96.4	267	95.7
1	2	1.4	3	2.2	5	1.8
2	2	1.4	2	1.4	4	1.4
3	2	1.4			2	.7
4	1	.7			1	.4

BLPH1ZP: Aktueller Blut pH-Wert - Zeitpunkt: Aufnahme

0 - keine Angaben

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	136	97.1	135	97.1	271	97.1
14	1	.7			1	.4
22	1	.7			1	.4
25			2	1.4	2	.7
32	1	.7			1	.4
33			1	.7	1	.4
34			1	.7	1	.4
44	1	.7			1	.4

BLPH2ZP: Aktueller Blut pH-Wert - Zeitpunkt: bis 12 Stunden

0 - keine Angaben

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	133	95.0	137	98.6	270	96.8
3	1	.7	1	.7	2	.7
23	1	.7			1	.4
25	1	.7			1	.4
26	1	.7			1	.4
30	1	.7	1	.7	2	.7
34	1	.7			1	.4
40	1	.7			1	.4

GEBURT**DIAGNOSTIK****BLPH3ZP: Aktueller Blut pH-Wert - Zeitpunkt: 12 - 24 Stunden**

0 - keine Angaben

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	136	97.1	139	100.0	275	98.6
26	1	.7			1	.4
33	1	.7			1	.4
39	1	.7			1	.4
45	1	.7			1	.4

BLPH4ZP: Aktueller Blut pH-Wert - Zeitpunkt: 2. Behandlungstag

0 - keine Angaben

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	139	99.3	139	100.0	278	99.6
30	1	.7			1	.4

BLPH5ZP: Aktueller Blut pH-Wert - Zeitpunkt: 3. Behandlungstag

0 - keine Angaben

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	140	100.0	138	99.3	278	99.6
36			1	.7	1	.4

BAEXZA: Aktueller Base excess - Anzahl der Angaben

0 - keine Angaben

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	133	95.0	134	96.4	267	95.7
1	2	1.4	2	1.4	4	1.4
2	1	.7	2	1.4	3	1.1
3	3	2.1	1	.7	4	1.4
4	1	.7			1	.4

BAEX1ZP: Aktueller Base excess (in meq/1) - Zeitpunkt: Aufnahme

0 - keine Angaben

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	136	97.1	135	97.1	271	97.1
1	1	.7			1	.4
4			2	1.4	2	.7
6	1	.7	1	.7	2	.7
8			1	.7	1	.4
11	1	.7			1	.4
12	1	.7			1	.4

BAEX2ZP: Aktueller Base excess (in meq/1) - Zeitpunkt: bis 12 Stunden

0 - keine Angaben

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	134	95.7	137	98.6	271	97.1
3	1	.7	1	.7	2	.7
4	1	.7	1	.7	2	.7
5	3	2.1			3	1.1
7	1	.7			1	.4

BAEX3ZP: Aktueller Base excess (in meq/1) - Zeitpunkt: 12 - 24 Stunden

0 - keine Angaben

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	135	96.4	138	99.3	273	97.8
1	3	2.1	1	.7	4	1.4
4	1	.7			1	.4
6	1	.7			1	.4

**BAEX4ZP: Aktueller Base excess (in meq/1) - Zeitpunkt: 2.
Behandlungstag**

0 - keine Angaben

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	138	98.6	138	99.3	276	98.9
1			1	.7	1	.4
2	1	.7			1	.4
5	1	.7			1	.4

**BAEX5ZP: Aktueller Base excess (in meq/1) - Zeitpunkt: 3.
Behandlungstag**

0 - keine Angaben

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	140	100.0	138	99.3	278	99.6
2			1	.7	1	.4

PCO2ZA: PCO₂ - Anzahl der Angaben

0 - keine

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	127	90.7	133	95.7	260	93.2
1	1	.7	2	1.4	3	1.1
2	3	2.1	2	1.4	5	1.8
3	3	2.1	1	.7	4	1.4
4	1	.7			1	.4
8	2	1.4			2	.7
9	3	2.1	1	.7	4	1.4

PCO21ZP:PCO₂ (in mm Hg) - Zeitpunkt: Aufnahme

0 - keine Angaben

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	130	92.9	134	96.4	264	94.6
11	1	.7			1	.4
21	1	.7			1	.4
35	1	.7			1	.4
41			1	.7	1	.4
42			1	.7	1	.4
46			1	.7	1	.4
47	1	.7			1	.4
48			1	.7	1	.4
51	1	.7			1	.4
59	1	.7			1	.4
60	1	.7			1	.4
71	1	.7			1	.4
81	2	1.4	1	.7	3	1.1

PCO22ZP:PCO₂ (in mm Hg) - Zeitpunkt: bis 12 Stunden

0 - keine Angaben

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	128	91.4	136	97.8	264	94.6
5	1	.7			1	.4
12	1	.7			1	.4
18			1	.7	1	.4
25	1	.7			1	.4
26	1	.7			1	.4
32	1	.7			1	.4
39	2	1.4			2	.7
44			1	.7	1	.4
48			1	.7	1	.4
50	1	.7			1	.4
53	1	.7			1	.4
55	1	.7			1	.4
60	1	.7			1	.4
70	1	.7			1	.4

PCO23ZP: PCO₂ (in mm Hg) - Zeitpunkt: 12 - 24 Stunden

0 - keine Angaben

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	130	92.9	137	98.6	267	95.7
11	2	1.4	1	.7	3	1.1
20	1	.7			1	.4
22	1	.7			1	.4
30	1	.7			1	.4
37	1	.7			1	.4
38			1	.7	1	.4
40	2	1.4			2	.7
43	1	.7			1	.4
51	1	.7			1	.4

PCO24ZP: PCO₂ (in mm Hg) - Zeitpunkt: 2. Behandlungstag

0 - keine Angaben

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	134	95.7	137	98.6	271	97.1
1	1	.7			1	.4
11	1	.7	1	.7	2	.7
21	1	.7			1	.4
23	1	.7			1	.4
40	1	.7	1	.7	2	.7
44	1	.7			1	.4

PCO25ZP: PCO₂ (in mm Hg) - Zeitpunkt: 3. Behandlungstag

0 - keine Angaben

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	135	96.4	137	98.6	272	97.5
11	3	2.1	1	.7	4	1.4
21	1	.7			1	.4
31	1	.7			1	.4
45			1	.7	1	.4

PCO26ZP: PCO₂ (in mm Hg) - Zeitpunkt: 4. Behandlungstag

0 - keine Angaben

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	135	96.4	138	99.3	273	97.8
11	1	.7	1	.7	2	.7
14	1	.7			1	.4
21	1	.7			1	.4
25	1	.7			1	.4
31	1	.7			1	.4

PCO27ZP: PCO₂ (in mm Hg) - Zeitpunkt: 5. Behandlungstag

0 - keine Angaben

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	135	96.4	138	99.3	273	97.8
10	1	.7			1	.4
11			1	.7	1	.4
12	1	.7			1	.4
13	2	1.4			2	.7
24	1	.7			1	.4

PCO28ZP: PCO₂ (in mm Hg) - Zeitpunkt: 6. Behandlungstag

0 - keine Angaben

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	135	96.4	138	99.3	273	97.8
11			1	.7	1	.4
22	2	1.4			2	.7
23	1	.7			1	.4
33	1	.7			1	.4
54	1	.7			1	.4

PCO29ZP:PCO₂ (in mm Hg) - Zeitpunkt: ≥ 7. Behandlungstag

0 - keine Angaben

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	135	96.4	138	99.3	273	97.8
10	1	.7			1	.4
11	1	.7	1	.7	2	.7
12	1	.7			1	.4
13	1	.7			1	.4
14	1	.7			1	.4

AUGENHIN: Augenhintergrundbefund

1 - normaler Befund

2 - Netzhautblutung

3 - nicht erhoben

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	82	58.6	69	49.6	151	54.1
2	8	5.7	5	3.6	13	4.7
3	50	35.7	65	46.8	115	41.2

BEATMZA: Art und Dauer der Beatmung - Anzahl der Angaben

0 - keine

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	139	99.3	136	97.8	275	98.6
1	1	.7	3	2.2	4	1.4

BEATM1A: Art und Dauer der Beatmung 1. Angabe - Art

0 - keine

1 - Maskenbeatmung

2 - Intubation und apparative Beatmung

3 - Mund-zu-Mund-Beatmung

4 - sonstiges

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	139	99.3	136	97.8	275	98.6
2	1	.7	3	2.2	4	1.4

BEATM1ZP: Art und Dauer der Beatmung 1. Angabe - Beginn

0 - keine

1 - Aufnahme

2 - bis 12 Stunden

3 - 12 - 24 Stunden

4 - 2. Behandlungstag

5 - 3. Behandlungstag

6 - 4. Behandlungstag

7 - 5. Behandlungstag

8 - 6. Behandlungstag

9 - 7. und jenseits 7. Behandlungstag

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	139	99.3	136	97.8	275	98.6
1	1	.7	3	2.2	4	1.4

GEBURT**THERAPIE****BEATM1D: Art und Dauer der Beatmung 1. Angabe - Dauer**

0 - keine

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	139	99.3	136	97.8	275	98.6
3			1	.7	1	.4
5	1	.7	1	.7	2	.7
10			1	.7	1	.4

SAUERST: Sauerstofftherapie

1 - keine

2 - kontinuierlich < 40% O₂3 - zeitweilig > 40% O₂4 - kontinuierlich > 40% O₂5 - zeitweilig < 40% O₂

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	129	92.1	132	95.0	261	93.5
2	3	2.1	1	.7	4	1.4
3	4	2.9	4	2.9	8	2.9
5	4	2.9	2	1.4	6	2.2

PUFFER: Puffertherapie (jenseits des Kreißsalaufenthaltes)

1 - nein

2 - ja

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	122	87.1	130	93.5	252	90.3
2	18	12.9	9	6.5	27	9.7

PUFFERBE: Beginn der Puffertherapie

(unter Berücksichtigung der unter "Ärztliche Erstversorgung" aufgeführten Pufferangaben)

- 0 - keine
- 1 - 1. Lebensstunde
- 2 - 2. Lebensstunde
- 3 - 3. Lebensstunde
- 4 - 4. Lebensstunde
- 5 - 5. Lebensstunde
- 6 - 6. Lebensstunde
- 7 - 7. - 12. Lebensstunde
- 8 - 13. - 18. Lebensstunde
- 9 - 19. - 24. Lebensstunde und darüber

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	122	88.4	130	94.2	252	91.3
1	15	10.9	6	4.3	21	7.6
2	1	.7	1	.7	2	.7
4			1	.7	1	.4
missing	2		1		3	

PUFFERW: Wiederholung der Puffertherapie

- 0 - keine
- 1 - am 1. Lebenstag
- 2 - am 2. Lebenstag
- 3 - am 3. Lebenstag
- 4 - am 4. Lebenstag
- 5 - am 5. Lebenstag
- 6 - am 6. Lebenstag
- 7 - am 7. Lebenstag und darüber

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	139	99.3	139	100.0	278	99.6
4	1	.7			1	.4

GEBURT**THERAPIE****INF: Infusionstherapie**

0 - nein

1 - ja

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	132	94.3	133	95.7	265	95.0
1	8	5.7	6	4.3	14	5.0

TRANSFZA: Austauschtransfusion - Anzahl der Angaben

0 - keine

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	140	100.0	137	98.6	277	99.3
1			2	1.4	2	.7

TRANSF1A: Austauschtransfusion am 1. Lebenstag - Art

0 - keine

1 - Vollblut (Heparin)

2 - Vollblut (Citrat-)

3 - Erythrocyten und Plasma

4 - gewaschene Erythrocyten und Plasma

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	140	100.0	137	98.6	277	99.3
1			1	.7	1	.4
2			1	.7	1	.4

TRANSF1M: Austauschtransfusion am 1. Lebenstag - Blutvolumen (in ml)

0 - keine

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	140	100.0	137	98.6	277	99.3
540			1	.7	1	.4
630			1	.7	1	.4

GEBURT**THERAPIE****ANTIBIOTHE: Antibiotische Therapie**

1 - nein

2 - ja

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	132	94.3	130	93.5	262	93.9
2	8	5.7	9	6.5	17	6.1

GEBURT**ERNÄHRUNG****FLUESSIG: Beginn der oralen Flüssigkeitszufuhr**

- 1 - 0 - 12 Stunden
- 2 - 13 - 24 Stunden
- 3 - 25 - 36 Stunden
- 4 - 37 - 48 Stunden
- 5 - 49 - 60 Stunden
- 6 - 61 - 72 Stunden
- 7 - 73 - 84 Stunden
- 8 - 85 - 96 Stunden
- 9 - 96 Stunden und darüber

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	130	95.6	133	99.3	263	97.4
2	3	2.2	1	.7	4	1.5
3	2	1.5			2	.7
8	1	.7			1	.4
missing	4		5		9	

NAHRART: Nahrungsart

- 1 - Muttermilch
- 2 - Frauenmilch (einschließlich Anreicherungsform)
- 3 - Fertigmilch
- 4 - 2/3 Milch
- 5 - Kombinationen
- 6 - sonstiges

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	53	38.7	63	48.5	116	43.4
2	9	6.6	6	4.6	15	5.6
3	11	8.0	9	6.9	20	7.5
5	63	46.0	50	38.5	113	42.3
6	1	.7	2	1.5	3	1.1
missing	3		9		12	

APGAR1: Apgar - Index - Zeitpunkt: Aufnahme

0 - nicht erhoben

1 - Apgar 0 und 1

9 - Apgar 9 und 10

Codierung entspricht ansonsten dem jeweiligen Apgar - Index.

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	6	4.3	9	6.5	15	5.4
1			2	1.4	2	.7
2	3	2.1	2	1.4	5	1.8
3	2	1.4			2	.7
4	1	.7	4	2.9	5	1.8
5	2	1.4			2	.7
6	4	2.9	2	1.4	6	2.2
7	3	2.1	3	2.2	6	2.2
8	12	8.6	8	5.8	20	7.2
9	107	76.4	109	78.4	216	77.4

APGAR2: Apgar - Index - Zeitpunkt: bis 12 Stunden

0 - nicht erhoben

1 - Apgar 0 und 1

9 - Apgar 9 und 10

Codierung entspricht ansonsten dem jeweiligen Apgar - Index.

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	38	27.1	49	35.3	87	31.2
8	4	2.9	2	1.4	6	2.2
9	98	70.0	88	63.3	186	66.7

GEBURT**KLINISCHER VERLAUF**

Die Codierung entspricht der jeweiligen Schlüsselzahl der gültigen Internationalen Klassifikation der WHO.

ABDIAGHD: Abschlußdiagnose - Hauptdiagnose

0 - keine

100 0 - Weilsche Krankheit

466 0 - akute Bronchitis

769 4 - Mehrlingsgeburt

775 0 - Hämolytische Erkrankung ohne Angabe eines Kernikterus, Rh-Inkompatibilität

775 9 - Hämolytische Erkrankung ohne Angabe der Ursache, verlängerte Hyperbilirubinämie

776 0 - Anoxische und hypoxische Zustände, massives Aspirationssyndrom

776 2 - Atemnotsyndrom

773 3 - Fetalen Notzustand

777 0 - Unreife; Dys-, Im- und Prä maturität, untergewichtiges Neugeborenes

778 4 - Sonstige Zustände des Neugeborenen

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	131	936	128	921	259	928
100 0			1	7	1	4
466 0			1	7	1	4
769 4	3	21			3	11
775 0	1	7	2	14	3	11
775 9			1	7	1	4
776 0	1	7			1	4
776 2			2	14	2	7
776 3			1	7	1	4
777 0	3	21	3	22	6	22
778 4	1	7			1	4

ABDIAGND: Abschlußdiagnose - Nebendiagnose

0 - keine

460 0 - akute Infektion der Atemwege

686 1 - Pyogenes Granulom

775 7 - zu Hämolytische Erkrankungen

776 2 - Atemnotsyndrom

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	134	957	136	978	270	968
460 0	1	7			1	4
686 1			1	7	1	4
775 7			1	7	1	4

776 2	5	36	1	7	6	22
-------	---	----	---	---	---	----

Literaturangaben zum Meßzeitpunkt Geburt

Ackermann, S., Eggers, H., Gülzow, H.-U., Issel, E. P., et al. (1971). Fragebogen zur Erfassung der soziologischen und klinischen Problemstruktur des Risikokindes. Hrsg. Rektor der Universität Rostock. Rostock.

Eggers, H., Plath, Chr., & Issel, E. P. (1975). Perinatale Risikofaktoren - eine epidemiologische Studie. 1. Mitteilung. Dt. Gesundheitswesen, 30, 966.

Issel, E. P., Eggers, H., Plath, Chr., et al (1975). Perinatale Risikofaktoren - eine epidemiologische Studie. 2. Mitteilung. Dt. Gesundheitswesen, 30, 2065.

Meyer-Probst, B. & Teichmann, H. (1984). Risiken für die Persönlichkeitsentwicklung im Kindesalter. Leipzig: Thieme.

Schlegel, L. & Weissbach, R (1969). Empfehlungen der Gesellschaft für Perinatale Medizin der DDR für die spezielle Betreuung der Risikoschwangerschaft und Geburt. Zur ärztlichen Fortbildung, 63, 1293.

Syllm-Rapoport, I. (1972). Empfehlungen der Gesellschaft für Perinatale Medizin der DDR für die spezielle Betreuung des Neugeborenen bei primären Gefahrzuständen nach der Geburt (erste 2 Lebensstunden). Zur ärztliche Fortbildung, 66, 121.

Inhaltsverzeichnis zum Meßzeitpunkt Geburt

	Seite
ZWISCHENANAMNESE (nach Angaben der Mutter)	
Familie -----	4
Mutter -----	10
Vater-----	24
 GEBURTSHILFE	
Anamnese	
Krankheitsanamnese der Mutter -----	27
Schwangerschaftsanamnese -----	31
Schwangerschaft	
Schwangerschaftsverlauf-----	35
Serologische Untersuchungen -----	41
Geburt	
Angaben zur Geburt -----	47
Geburtskomplikationen -----	51
Serologische Untersuchungen sub partu -----	53
Medikamente sub partu-----	56

Seite

NEONATOLOGISCHE UNTERSUCHUNG

Entbindungseinrichtung

Angaben zum Neugeborenen----- 58

Ärztliche Erstuntersuchung----- 61

Pädiatrische Einrichtung

Ärztliche Erstversorgung----- 63

Ärztliche Basisuntersuchung----- 69

ZNS / Motorik am 3. Lebenstag----- 72

Diagnostik----- 74

Therapie----- 82

Ernährung----- 87

Klinischer Verlauf----- 88

Literaturangaben zum Meßzeitpunkt Geburt----- 90