

## 2. Meßzeitpunkt: 2 Jahre (Mai 1972 - Mai 1973)

Von den 1.000 Rostocker Kindern, die im Perinatalogie - Projekt zum Zeitpunkt der Geburt neonatologisch und sozialhygienisch erfaßt wurden, besuchten im Alter von 2 Jahren 300 eine Krippeneinrichtung der Stadt Rostock. Von diesen konnten  $n = 294$  in insgesamt 52 Krippen aufgefunden werden. Die Nachuntersuchung erfolgte von Mai 1972 bis Mai 1973 vor allem in der Altersspanne 2,0 - 2,3 und wie die Befragung der Mütter in der jeweiligen Krippe. Die psychiatrisch-neurologischen Erhebungen nahm Frau Dr. Heider vor.

Die Daten zur körperlichen Entwicklung (quartalsmäßige Messungen von Körperlänge und -gewicht) stammen aus den Entwicklungsbögen, die obligatorisch in den Krippen geführt wurden.

Der organisatorische und psychologische Arbeitsteil lag in den Händen von Dr. Teichmann. Er leitete die Krippenerzieherinnen bei der Durchführung des Zwiener-Entwicklungstests in der Krippe an und befragte dort auch die Mütter und Krippenerzieherinnen.

### Variablen (Datei CODEBUCH/ZWEI.SYS)

---

#### SEX2: Geschlecht der Probanden

1 - männlich

2 - weiblich

	Anzahl	valide Prozenste
männlich	146	49.7
weiblich	148	50.3

#### ALTER2: Alter zur Zeit der Untersuchung in Monaten

22 - 27 - Codierung entspricht dem jeweiligen Alter in Monaten

	männlich	valide Prozenste	weiblich	valide Prozenste	gesamt	valide Prozenste
22	6	4.1	2	1.4	8	2.7
23	11	7.6	19	12.8	30	10.2
24	77	53.1	99	66.9	176	60.1
25	35	24.1	18	12.2	53	18.1
26	12	8.3	5	3.4	17	5.8
27	4	2.8	5	3.4	9	3.1
missing	1				1	

**KRIP: Krippenkind / Hauskind**

- 1 - Tageskrippenkind, untersucht
- 2 - Tageskrippenkind, nicht untersucht
- 3 - Wochenkrippenkind, untersucht
- 4 - Wochenkrippenkind, nicht untersucht
- 5 - Heimkind, untersucht
- 6 - Heimkind, nicht untersucht
- 7 - Hauskind, untersucht
- 8 - Hauskind, nicht untersucht

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	141	96.6	140	94.6	281	95.6
2	2	1.4	2	1.4	4	1.4
3	3	2.1	4	2.7	7	2.4
5			2	1.4	2	.7

**ANAMANG: Anamnese nach Angaben der/des:**

- 1 - Mutter
- 2 - Vaters
- 3 - Stiefmutter
- 4 - Stiefvaters
- 5 - Großeltern
- 6 - Pflegemutter
- 7 - andere Person

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	133	91.1	135	91.2	268	91.2
2	9	6.2	10	6.8	19	6.5
5	3	2.1	1	.7	4	1.4
6	1	.7			1	.3
7			2	1.4	2	.7

**MUMPS: Mumps**

- 1 - keinen
- 2 - 1. bis 3. Monat, ohne Komplikationen
- 3 - 1. bis 3. Monat, mit Komplikationen
- 4 - 4. bis 12. Monat, ohne Komplikationen
- 5 - 4. bis 12. Monat, mit Komplikationen
- 6 - 13. Monat und später, ohne Komplikationen
- 7 - 13. Monat und später, mit Komplikationen

Anmerkung:

Komplikationen: Cerebrale Beteiligung, gleichzeitiges Auftreten mit anderen Infektionserkrankungen, Fieber über 39°C mehr als 4 Tage anhaltend, stationäre Behandlung wegen Schwere des Krankheitsbildes

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	135	93.8	137	92.6	272	93.2
4	1	.7	2	1.4	3	1.0
6	8	5.6	8	5.4	16	5.5
7			1	.7	1	.3
missing	2				2	

**ROET:Röteln und/oder Windpocken**

- 1 - keine
- 2 - 1. bis 3. Monat, ohne Komplikationen
- 3 - 1. bis 3. Monat, mit Komplikationen
- 4 - 4. bis 12. Monat, ohne Komplikationen
- 5 - 4. bis 12. Monat, mit Komplikationen
- 6 - 13. Monat und später, ohne Komplikationen
- 7 - 13. Monat und später, mit Komplikationen

Anmerkung:

Komplikationen: Cerebrale Beteiligung, gleichzeitiges Auftreten mit anderen Infektionserkrankungen, Fieber über 39°C mehr als 4 Tage anhaltend, stationäre Behandlung wegen Schwere des Krankheitsbildes

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	97	66.9	89	61.4	186	64.1
3	1	.7			1	.3
4	11	7.6	19	13.1	30	10.3
5	1	.7			1	.3

6	35	24.1	37	25.5	72	24.8
missing	1		3		4	

**KEUCH: Keuchhusten**

- 1 - keinen
- 2 - 1. bis 3. Monat, ohne Komplikationen
- 3 - 1. bis 3. Monat, mit Komplikationen
- 4 - 4. bis 12. Monat, ohne Komplikationen
- 5 - 4. bis 12. Monat, mit Komplikationen
- 6 - 13. Monat und später, ohne Komplikationen
- 7 - 13. Monat und später, mit Komplikationen

Anmerkung:

Komplikationen: Cerebrale Beteiligung, gleichzeitiges Auftreten mit anderen Infektionserkrankungen, Fieber über 39°C mehr als 4 Tage anhaltend, stationäre Behandlung wegen Schwere des Krankheitsbildes

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	145	99.3	147	99.3	292	99.3
2			1	.7	1	.3
6	1	.7			1	.3

**SCHARL: Scharlach**

- 1 - keinen
- 2 - 1. bis 3. Monat, ohne Komplikationen
- 3 - 1. bis 3. Monat, mit Komplikationen
- 4 - 4. bis 12. Monat, ohne Komplikationen
- 5 - 4. bis 12. Monat, mit Komplikationen
- 6 - 13. Monat und später, ohne Komplikationen
- 7 - 13. Monat und später, mit Komplikationen
- 8 - mehrfach, ohne Komplikationen
- 9 - mehrfach, mit Komplikationen (mindestens einmal)

Anmerkung:

Komplikationen: Cerebrale Beteiligung, gleichzeitiges Auftreten mit anderen Infektionserkrankungen, Fieber über 39°C mehr als 4 Tage anhaltend, stationäre Behandlung wegen Schwere des Krankheitsbildes

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	142	97.3	147	99.3	289	98.3
6	4	2.7	1	.7	5	1.7

**ERNAEHR: Ernährungsstörungen (infektiöse Darmerkrankungen)**

- 1 - keine
- 2 - 1. bis 3. Monat, ohne Komplikationen
- 3 - 1. bis 3. Monat, mit Komplikationen
- 4 - 4. bis 12. Monat, ohne Komplikationen
- 5 - 4. bis 12. Monat, mit Komplikationen
- 6 - 13. Monat und später, ohne Komplikationen
- 7 - 13. Monat und später, mit Komplikationen

Anmerkung:

Komplikationen: Cerebrale Beteiligung, gleichzeitiges Auftreten mit anderen Infektionserkrankungen, Fieber über 39°C mehr als 4 Tage anhaltend, stationäre Behandlung wegen Schwere des Krankheitsbildes

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	126	86.3	124	84.9	250	85.6
2	8	5.5	4	2.7	12	4.1
3	6	4.1	7	4.8	13	4.5
4	3	2.1	6	4.1	9	3.1
5	3	2.1	4	2.7	7	2.4
6			1	.7	1	.3
missing			2		2	

**INFEKT2: Seltene, schwere Infektionskrankheiten**

- 1 - keine
- 2 - 1. bis 3. Monat, ohne Komplikationen
- 3 - 1. bis 3. Monat, mit Komplikationen
- 4 - 4. bis 12. Monat, ohne Komplikationen
- 5 - 4. bis 12. Monat, mit Komplikationen
- 6 - 13. Monat und später, ohne Komplikationen
- 7 - 13. Monat und später, mit Komplikationen

Anmerkung:

Komplikationen: Cerebrale Beteiligung, gleichzeitiges Auftreten mit anderen Infektionserkrankungen, Fieber über 39°C mehr als 4 Tage anhaltend, stationäre Behandlung wegen Schwere des Krankheitsbildes

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	145	99.3	147	99.3	292	99.3
6	1	.7	1	.7	2	.7

**OHR: Erkrankungen des Ohres und/oder des Warzenfortsatzes**

- 1 - keine
- 2 - 1. bis 3. Monat, ohne Komplikationen
- 3 - 1. bis 3. Monat, mit Komplikationen
- 4 - 4. bis 12. Monat, ohne Komplikationen
- 5 - 4. bis 12. Monat, mit Komplikationen
- 6 - 13. Monat und später, ohne Komplikationen
- 7 - 13. Monat und später, mit Komplikationen
- 8 - rezidivierend, leichter Verlauf
- 9 - rezidivierend, mindestens einmal schwerer Verlauf

Anmerkung:

Komplikationen: Cerebrale Beteiligung, gleichzeitiges Auftreten mit anderen Infektionserkrankungen, Fieber über 39°C mehr als 4 Tage anhaltend, stationäre Behandlung wegen Schwere des Krankheitsbildes

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	83	56.8	85	58.2	168	57.5
4	4	2.7	4	2.7	8	2.7
5	1	.7			1	.3
6	18	12.3	22	15.1	40	13.7
8	36	24.7	26	17.8	62	21.2
9	4	2.7	9	6.2	13	4.5
missing			2		2	

**ATMUNG: Erkrankungen des Atmungssystems**

- 1 - keine
- 2 - 1. bis 3. Monat, ohne Komplikationen
- 3 - 1. bis 3. Monat, mit Komplikationen
- 4 - 4. bis 12. Monat, ohne Komplikationen
- 5 - 4. bis 12. Monat, mit Komplikationen
- 6 - 13. Monat und später, ohne Komplikationen
- 7 - 13. Monat und später, mit Komplikationen
- 8 - rezidivierend, leichter Verlauf
- 9 - rezidivierend, mindestens einmal schwerer Verlauf

Anmerkung:

Komplikationen: Cerebrale Beteiligung, gleichzeitiges Auftreten mit anderen Infektionserkrankungen, Fieber über 39°C mehr als 4 Tage anhaltend, stationäre Behandlung wegen Schwere des Krankheitsbildes

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	32	22.1	48	32.4	80	27.3
2			1	.7	1	.3
3	1	.7	2	1.4	3	1.0
4	5	3.4	7	4.7	12	4.1
5	4	2.8	2	1.4	6	2.0
6	5	3.4	7	4.7	12	4.1
7	3	2.1	1	.7	4	1.4
8	80	55.2	64	43.2	144	49.1
9	15	10.3	16	10.8	31	10.6
missing	1				1	



**ALLERG: Allergien**

- 1 - keine
- 2 - 1. bis 3. Monat, ohne Komplikationen
- 3 - 1. bis 3. Monat, mit Komplikationen
- 4 - 4. bis 12. Monat, ohne Komplikationen
- 5 - 4. bis 12. Monat, mit Komplikationen
- 6 - 13. Monat und später, ohne Komplikationen
- 7 - 13. Monat und später, mit Komplikationen
- 8 - seit Geburt mit Komplikationen

Anmerkung:

Komplikationen: Gleichzeitiges Auftreten mit anderen Infektionserkrankungen,  
Fieber über 39°C mehr als 4 Tage anhaltend,  
stationäre Behandlung wegen Schwere des Krankheitsbildes

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	129	90.2	127	87.6	256	88.9
2	6	4.2	4	2.8	10	3.5
4	3	2.1	6	4.1	9	3.1
6	4	2.8	6	4.1	10	3.5
8	1	.7	2	1.4	3	1.0
missing	3		3		6	

**PYODERM: Schwere Pyodermie**

- 1 - keine
- 2 - 1. bis 3. Monat
- 3 - 4. bis 6. Monat
- 4 - 7. bis 12. Monat
- 5 - 13. Monat und später

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	140	96.6	144	97.3	284	96.9
2	3	2.1			3	1.0
3	1	.7	2	1.4	3	1.0
4			1	.7	1	.3
5	1	.7	1	.7	2	.7
missing	1				1	

**STOFF: Seltene Stoffwechselerkrankungen  
(Coeliakie, Phenylketonurie u.a.)**

- 1 - keine  
 2 - 1. bis 3. Monat festgestellt  
 3 - 4. bis 6. Monat festgestellt  
 4 - 7. bis 12. Monat festgestellt  
 5 - 13. Monat und später festgestellt

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	146	100.0	148	100.0	294	100.0

**OPERAT: Operationen in Vollnarkose**

- 1 - keine  
 2 - 1. bis 3. Monat  
 3 - 4. bis 6. Monat  
 4 - 7. bis 12. Monat  
 5 - 13. Monat und später  
 6 - mehrere Operationen (mindestens eine im 1. Halbjahr)  
 7 - mehrere Operationen nach dem 1. Halbjahr

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	142	97.3	140	94.6	282	95.9
2			1	.7	1	.3
3	1	.7			1	.3
4	1	.7	3	2.0	4	1.4
5	2	1.4	4	2.7	6	2.0

**ZNS2: Entzündliche Erkrankungen des ZNS**

- 1 - keine  
 2 - 1. bis 3. Monat Meningoencephalitis  
 3 - 4. bis 12. Monat Meningoencephalitis  
 4 - 13. Monat und später Meningoencephalitis  
 5 - nicht diagnostizierte fieberhafte Erkrankung, die auf Meningoencephalitis schließen läßt

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	145	99.3	148	100.0	293	99.7
4	1	.7			1	.3



**SCHHTR2: Schädel-Hirn-Traumen**

- 1 - kein Schädel-Hirn-Trauma
- 2 - 1. bis 3. Monat, ohne Komplikationen
- 3 - 1. bis 3. Monat, mit Komplikationen
- 4 - 4. bis 12. Monat, ohne Komplikationen
- 5 - 4. bis 12. Monat, mit Komplikationen
- 6 - 13. Monat und später, ohne Komplikationen
- 7 - 13. Monat und später, mit Komplikationen

Anmerkung:

Komplikationen: Traumen mit Bewußtlosigkeit, offene oder geschlossene Schädelfraktur, stationäre Behandlung nur wegen Schädel-Hirntrauma länger als 8 Tage

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	134	91.8	143	97.3	277	94.5
4	1	.7			1	.3
5	1	.7			1	.3
6	8	5.5	3	2.0	11	3.8
7	2	1.4	1	.7	3	1.0
missing			1		1	

**ERKRAN2: Sammelspalte Erkrankungen des Kindes**

- 1 - keine
- 2 - Erkrankungen, die nicht unter 3 erfaßt sind
- 3 - Postnatale Risikogruppe (Ernährungsstörungen im 1. Halbjahr, Infektionserkrankungen mit Komplikationen, entzündliche Erkrankungen des ZNS, Krämpfe, Schädel-Hirntraumen mit Komplikationen im 1. Halbjahr)
- 4 - Postnatale Risikogruppe (wie 3; nach dem ersten Halbjahr)

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	14	9.6	11	7.4	25	8.5
2	102	69.9	106	71.6	208	70.7
3	9	6.2	10	6.8	19	6.5
4	21	14.4	21	14.2	42	14.3

**VERBREN2: Verbrühungen, Verbrennungen**

- 1 - keine
- 2 - 1. bis 3. Monat, ohne Komplikationen
- 3 - 1. bis 3. Monat, mit Komplikationen
- 4 - 4. bis 12. Monat, ohne Komplikationen
- 5 - 4. bis 12. Monat, mit Komplikationen
- 6 - 13. Monat und später, ohne Komplikationen
- 7 - 13. Monat und später, mit Komplikationen

Anmerkung:

Komplikationen: Wegen Schwere der Verbrühung bzw. Verbrennung stationäre Behandlung länger als 3 Wochen

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	139	95.2	143	96.6	282	95.9
4	1	.7	3	2.0	4	1.4
6	5	3.4	2	1.3	7	2.4
7	1	.7			1	.3

**IMPF2: Impfungen**

- 1 - alle Impfungen zum Termin erhalten, ohne Komplikationen
- 2 - alle Impfungen zum Termin erhalten, bei mindestens einer Komplikation (außer Pocken)
- 3 - Pockenimpfung mit Komplikationen
- 4 - von Pockenimpfung zurückgestellt, sonst alle Impfungen ohne Komplikationen zum Termin
- 5 - von einer Impfung zurückgestellt (außer Pocken)
- 6 - von allen bisherigen Impfungen zurückgestellt

Anmerkung:

Komplikationen: Cerebrale Mitbeteiligung (Encephalitis), Fieber über 39,5°C länger als 4 Tage  
anhaltend, wegen Schwere der Impfkomplicationen stationäre Behandlung

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	122	84.7	130	89.7	252	87.2
4	22	15.3	14	9.7	36	12.5
6			1	.7	1	.3
missing	2		3		5	

**GELEGKR2: Gelegenheitskrämpfe (Fieberkrämpfe, "Zahnkrämpfe")**  
**(Zeitpunkt des ersten Auftretens)**

- 1 - keine
- 2 - einmalig, 1. bis 3. Monat
- 3 - mehrfach, 1. bis 3. Monat
- 4 - einmalig, 4. bis 12. Monat
- 5 - mehrfach, 4. bis 12. Monat
- 6 - einmalig, 13. Monat und später
- 7 - mehrfach, 13. Monat und später

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	143	97.9	147	99.3	290	98.6
2			1	.7	1	.3
4	1	.7			1	.3
6	1	.7			1	.3
7	1	.7			1	.3

**KRAMPF2: Krampfanfälle**  
**Grand mal (Zeitpunkt des ersten Auftretens)**

- 1 - keine
- 2 - Grand mal perinatal
- 3 - 1. bis 3. Monat
- 4 - 4. bis 12. Monat
- 5 - 13. Monat und später
- 6 - Krämpfe, die sich nicht zuordnen lassen

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	146	100.0	148	100.0	294	100.0

**BNS: BNS\*-Krämpfe (Zeitpunkt des ersten Auftretens)**

- 1 - keine
- 2 - 1. bis 3. Monat
- 3 - 4. bis 12. Monat
- 4 - 13. Monat und später

\* Blick - Nick und Salaamkrämpfe

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	146	100.0	148	100.0	294	100.0

**AFFEKTKR: Respiratorische Affektkrämpfe**  
**(Zeitpunkt des ersten Auftretens)**

- 1 - keine
- 2 - 1. bis 3. Monat
- 3 - 4. bis 12. Monat
- 4 - 13. Monat und später

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	144	98.6	137	93.2	281	95.9
3			5	3.4	5	1.7
4	2	1.4	5	3.4	7	2.4
missing			1		1	

**ANFH2: Anfallshäufigkeit**

- 1 - keine Anfälle
- 2 - bisher ein einziger Anfall
- 3 - Anfälle in mehrmonatigen Abständen
- 4 - 1 Anfall im Monat
- 5 - 2 und mehr Anfälle im Monat
- 6 - 1 Anfall in der Woche
- 7 - 2 und mehr Anfälle in der Woche
- 8 - fast täglich ein Anfall
- 9 - mehrere Anfälle täglich

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	143	97.9	148	100.0	291	99.0
2	2	1.4			2	.7
3	1	.7			1	.3



Die Auskünfte stammen i.d.R von der Mutter (vgl. ANAMANG).

**SCHWAN2: Schwangerschaftsverlauf**

- 1 - normaler Schwangerschaftsverlauf
- 2 - Blutungen in der ersten Schwangerschaftshälfte
- 3 - fieberhafte Erkrankungen in der ersten Schwangerschaftshälfte
- 4 - 2 + 3
- 5 - Gestose
- 6 - 2 + 5
- 7 - 3 + 5
- 8 - 2 + 3 + 5
- 9 - andere Komplikationen und Kombinationen

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	102	70.8	105	72.4	207	71.6
2	10	6.9	5	3.4	15	5.2
3	4	2.8	2	1.4	6	2.1
4	1	.7			1	.3
5	11	7.6	13	9.0	24	8.3
6			2	1.4	2	.7
7			1	.7	1	.3
9	16	11.1	17	11.7	33	11.4
missing	2		3		5	

**MEDIK: Medikamente während der Schwangerschaft**

- 1 - keine
- 2 - Antiepileptika
- 3 - Psychopharmaka
- 4 - 2 + 3
- 5 - gehäufte, (fast tägliche) Einnahme von Schlaf- und / oder Kopfschmerzmitteln
- 6 - 2 + 5
- 7 - 3 + 5
- 8 - 2 + 3 + 5
- 9 - andere, regelmäßige Medikamenteneinnahme

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	121	84.6	118	83.7	239	84.2
3	6	4.2	1	.7	7	2.5
5			2	1.4	2	.7
9	16	11.2	20	14.2	36	12.7
missing	3		7		10	



**GEBURT2: Geburtsverlauf**

- 1 - normal
- 2 - Frühgeburt
- 3 - blaue oder weiße Asphyxie
- 4 - 2 + 3
- 5 - Übertragung
- 6 - 3 + 5
- 7 - lange bzw. schwierige Geburt, Kind lebensfrisch

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	84	60.0	95	67.4	179	63.7
2	9	6.4	9	6.4	18	6.4
3	9	6.4	7	5.0	16	5.7
4			1	.7	1	.4
5	6	4.3	3	2.1	9	3.2
7	32	22.9	26	18.4	58	20.6
missing	6		7		13	

**GEBHIL2: Geburtshilfliche Eingriffe**

- 1 - keine
- 2 - Vakuumextraktion / Zange
- 3 - Sectio
- 4 - Lageanomalie, die Eingriff erforderlich machte
- 5 - 2 + 4
- 6 - 3 + 4
- 7 - weitere Eingriffe
- 8 - Austauschtransfusion

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	92	63.4	99	67.8	191	65.6
2	36	24.8	22	15.1	58	19.9
3	8	5.5	11	7.5	19	6.5
4	4	2.8	12	8.2	16	5.5
7	4	2.8	2	1.4	6	2.1
8	1	.7			1	.3
missing	1		2		3	

**2 JAHRE****FRÜHKINDLICHE ENTWICKLUNG**

Die Angaben der Mütter zur frühkindlichen Entwicklung, die auch von den Krippenerzieherinnen vorliegen, sind am Ende des Variablencodes mit einem "M" gekennzeichnet.

Alle hier gemachten Angaben gehen i.d.R. auf die Mütter zurück (vgl. ANAMANG).

**STILLDAU: Stilldauer**

- 1 - nicht gestillt
- 2 - bis zu 2 Wochen
- 3 - bis zu 4 Wochen
- 4 - bis zum 3. Monat
- 5 - bis zum 6. Monat
- 6 - bis zum 12. Monat und länger

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	36	24.8	35	24.3	71	24.6
2	33	22.8	26	18.1	59	20.4
3	39	26.9	45	31.3	84	29.1
4	31	21.4	34	23.6	65	22.5
5	6	4.1	4	2.8	10	3.5
missing	1		4		5	

**ZÄHNE: Erste Zähne**

- 1 - bis zum 6. Monat
- 2 - bis zum 9. Monat
- 3 - bis zum 12. Monat
- 4 - bis zum 15. Monat
- 5 - bis zum 18. Monat
- 6 - bis zum 21. Monat und später
- 7 - hat noch keine Zähne

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	68	50.0	76	53.9	144	52.0
2	54	39.7	55	39.0	109	39.4
3	12	8.8	9	6.4	21	7.6
4			1	.7	1	.4
6	2	1.5			2	.7
missing	10		7		17	

**SAUBER2M: Hosensauber (näßt am Tage nicht mehr ein)**

- 1 - bis zum 11. Monat  
 2 - bis zum 13. Monat  
 3 - bis zum 15. Monat  
 4 - bis zum 17. Monat  
 5 - bis zum 19. Monat  
 6 - bis zum 21. Monat  
 7 - bis zum 24. Monat und später  
 8 - zur Zeit noch nicht sauber (hat in den letzten 8 Wochen noch mehrfach eingenäßt)

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	1	.7			1	.3
2	5	3.5	13	8.8	18	6.2
3	6	4.2	30	20.3	36	12.3
4	11	7.6	19	12.8	30	10.3
5	40	27.8	40	27.0	80	27.4
6	45	31.3	35	23.6	80	27.4
7	5	3.5	2	1.4	7	2.4
8	31	21.5	9	6.1	40	13.7
missing	2				2	

**SAUBEK2M: Hosensauber (kotet am Tage nicht mehr ein)**

- 1 - bis zum 11. Monat  
 2 - bis zum 13. Monat  
 3 - bis zum 15. Monat  
 4 - bis zum 17. Monat  
 5 - bis zum 19. Monat  
 6 - bis zum 21. Monat  
 7 - bis zum 24. Monat und darüber  
 8 - zur Zeit noch nicht sauber (hat in den letzten 8 Wochen am Tage noch mehrfach eingekotet)

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	3	2.1	3	2.0	6	2.1
2	11	7.6	17	11.6	28	9.6
3	10	6.9	33	22.4	43	14.8
4	20	13.9	19	12.9	39	13.4
5	44	30.6	42	28.6	86	29.6
6	34	23.6	21	14.3	55	18.9
7	2	1.4			2	.7

8	20	13.9	12	8.2	32	11.0
missing	2		1		3	

**BETT2: Bettrein (näßt nachts nicht mehr ein)**

- 1 - bis zum 11. Monat  
 2 - bis zum 13. Monat  
 3 - bis zum 15. Monat  
 4 - bis zum 17. Monat  
 5 - bis zum 19. Monat  
 6 - bis zum 21. Monat  
 7 - bis zum 24. Monat und darüber  
 8 - zur Zeit noch nicht sauber (hat in den letzten 8 Wochen noch mehrfach eingenäßt)

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	1	.7			1	.3
2	2	1.4	1	.7	3	1.0
3	1	.7	7	4.7	8	2.7
4	1	.7	4	2.7	5	1.7
5	12	8.2	19	12.8	31	10.5
6	24	16.4	31	20.9	55	18.7
7	12	8.2	6	4.1	18	6.1
8	93	63.7	80	54.1	173	58.8

**BETTK2: Bettrein (kotet nachts nicht mehr ein)**

- 1 - bis zum 11. Monat  
 2 - bis zum 13. Monat  
 3 - bis zum 15. Monat  
 4 - bis zum 17. Monat  
 5 - bis zum 19. Monat  
 6 - bis zum 21. Monat  
 7 - bis zum 24. Monat und darüber  
 8 - zur Zeit noch nicht sauber (hat in den letzten 8 Wochen noch mehrfach eingekotet)

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	2	1.4	3	2.0	5	1.7
2	8	5.5	14	9.5	22	7.5
3	11	7.5	27	18.4	38	13.0
4	20	13.7	15	10.2	35	11.9
5	33	22.6	37	25.2	70	23.9
6	34	23.3	32	21.8	66	22.5
7	11	7.5	4	2.7	15	5.1
8	27	18.5	15	10.2	42	14.3
missing			1		1	





**SCHRIT2: Erste freie Schritte**

- 1 - bis zum 11. Monat
- 2 - bis zum 13. Monat
- 3 - bis zum 15. Monat
- 4 - bis zum 17. Monat
- 5 - bis zum 19. Monat
- 6 - bis zum 21. Monat
- 7 - bis zum 24. Monat und später
- 8 - läuft zur Zeit noch nicht

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	26	17.9	27	18.5	53	18.2
2	57	39.3	62	42.5	119	40.9
3	43	29.7	42	28.8	85	29.2
4	10	6.9	9	6.2	19	6.5
5	8	5.5	5	3.4	13	4.5
6	1	.7			1	.3
7			1	.7	1	.3
missing	1		2		3	

**WORTE2: Erste Worte (verständlich und sinnbezogen)**

- 1 - bis zum 11. Monat
- 2 - bis zum 13. Monat
- 3 - bis zum 15. Monat
- 4 - bis zum 17. Monat
- 5 - bis zum 19. Monat
- 6 - bis zum 21. Monat
- 7 - bis zum 24. Monat und darüber
- 8 - spricht zur Zeit noch kein Wort

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	4	2.8	14	9.7	18	6.2
2	23	15.9	28	19.4	51	17.6
3	24	16.6	37	25.7	61	21.1
4	20	13.8	13	9.0	33	11.4
5	47	32.4	36	25.0	83	28.7
6	25	17.2	15	10.4	40	13.8
7	1	.7	1	.7	2	.7
8	1	.7			1	.3
missing	1		4		5	



**NAHRUG2M: Nahrungsaufnahme**

- 1 - unauffällig  
 2 - feste Nahrung, aber schlechter Esser; ißt weniger als Kinder normalerweise in diesem Alter und/oder nur durch die List der Pflegeperson (Ablenkung durch Spielzeug usw.) ausreichend viel  
 3 - feste Nahrung, ißt abnorm viel  
 4 - nimmt noch keine feste Nahrung zu sich, nur Flasche und Brei

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	126	86.9	104	70.3	230	78.5
2	16	11.0	44	29.7	60	20.5
3	2	1.4			2	.7
4	1	.7			1	.3
missing	1				1	

**NAHRUT2M: Nahrungsaufnahme (Tempo)**

- 1 - unauffällig  
 2 - ißt langsamer als Kinder normalerweise in diesem Alter  
 3 - ißt hastig (schneller als Kinder normalerweise in diesem Alter)

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	121	82.9	110	74.3	231	78.6
2	15	10.3	36	24.3	51	17.3
3	10	6.8	2	1.4	12	4.1

**ERBRECHM: Früheres Erbrechen "Spucken"**  
**(ohne Magen-Darm-Erkrankungen)**

- 1 - nie  
 2 - im 1. Halbjahr  
 3 - im 2. Halbjahr  
 4 - im gesamten 1. Lebensjahr  
 5 - im 2. Lebensjahr  
 6 - 2 + 5  
 7 - 3 + 5  
 8 - 2 + 3 + 5

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	120	82.2	126	86.3	246	84.2
2	19	13.0	8	5.5	27	9.2
3	2	1.4	1	.7	3	1.0
4	4	2.7	7	4.8	11	3.8
5			2	1.4	2	.7
8	1	.7	2	1.4	3	1.0
missing			2		2	

**ERBREHM: Häufigkeit des Erbrechens in den letzten 3 Monaten**

- 1 - nie  
 2 - Brechneigung, sofern bestimmte Maßnahmen nicht eingehalten werden  
 3 - dreimal und weniger im Monat  
 4 - 4- bis 6mal im Monat  
 5 - 7- bis 9mal im Monat  
 6 - 10- bis 12mal im Monat  
 7 - 13- bis 15mal im Monat  
 8 - fast täglich

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	144	98.6	141	95.3	285	96.9
2			3	2.0	3	1.0
3	1	.7	3	2.0	4	1.4
4	1	.7	1	.7	2	.7

**SPIEL: Spielverhalten**

- 1 - unauffällig, beschäftigt sich gut alleine
- 2 - kann sich schlecht alleine beschäftigen, spielt überwiegend stereotyp
- 3 - kann sich schlecht alleine beschäftigen, verfügt aber über altersentsprechenden Spielideenreichtum
- 4 - kann sich gut alleine beschäftigen, spielt aber überwiegend stereotyp

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	111	76.0	112	76.7	223	76.4
2	24	16.4	16	11.0	40	13.7
3	9	6.2	15	10.3	24	8.2
4	2	1.4	3	2.1	5	1.7
missing			2		2	

**AUSDAU: Ausdauer beim Spielen**

- 1 - unauffällig
- 2 - beim Spiel wenig ausdauernd
- 3 - schwer auf ein Spiel zu fixieren

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	95	65.1	102	69.9	197	67.5
2	51	34.9	43	29.5	94	32.2
3			1	.7	1	.3
missing			2		2	

**FOLGSM: Wie gehorcht Ihr Kind?**

- 1 - unauffällig, gehorcht sofort und nachhaltig
- 2 - auffällig, gehorcht zwar sofort, aber nicht nachhaltig, verfällt schnell wieder in den alten Fehler
- 3 - auffällig, gehorcht nicht sofort, paßt sich dann aber an
- 4 - auffällig, gehorcht nicht sofort, paßt sich auch später nicht genügend an

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	83	58.0	96	66.2	179	62.2
2	7	4.9	2	1.4	9	3.1
3	44	30.8	41	28.3	85	29.5
4	9	6.3	6	4.1	15	5.2

missing	3		3		6	
---------	---	--	---	--	---	--

**REAKTM: Wie reagiert das Kind bei Verboten, unangenehmen Aufträgen und Anforderungen?**

- 1 - unauffällig  
 2 - nicht leicht erregbar (nicht leicht aus der Ruhe zu bringen, nicht leicht kränkbar, reagiert nicht leicht mit Weinen, Aggressivität oder Trotz )  
 3 - weint leicht  
 4 - reagiert leicht aggressiv  
 5 - trotzt leicht  
 6 - 3 + 4  
 7 - 3 + 5  
 8 - 4 + 5  
 9 - 3 + 4 + 5

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	68	47.2	82	58.2	150	52.6
2	1	.7	1	.7	2	.7
3	13	9.0	17	12.1	30	10.5
4	16	11.1	6	4.3	22	7.7
5	42	29.2	32	22.7	74	26.0
7	2	1.4	1	.7	3	1.1
8			1	.7	1	.4
9	2	1.4	1	.7	3	1.1
missing	2		7		9	

**BERUHIGM: Wie läßt sich das Kind beruhigen?**

- 1 - bei Erregung nicht rasch wieder zu beruhigen  
 2 - unauffällig  
 3 - bei Erregung auffallend rasch zu beruhigen

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	23	15.9	16	11.0	39	13.4
2	121	83.4	128	88.3	249	85.9
3	1	.7	1	.7	2	.7
missing	1		3		4	

**WEINENM: Weinen (Anlaß)**

- 1 - weint nicht leicht
- 2 - weint auffallend leicht bei Willensverweigerung
- 3 - weint auffallend leicht bei Furchtsituation
- 4 - 2 + 3
- 5 - weint auffallend leicht bei geringfügigen Schmerzen
- 6 - 2 + 5
- 7 - 3 + 5
- 8 - 2 + 3 + 5

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	107	75.4	99	67.3	206	71.3
2	30	21.1	32	21.8	62	21.5
3			1	.7	1	.3
4			1	.7	1	.3
5	2	1.4			2	.7
7			2	1.4	2	.7
8	3	2.1	12	8.2	15	5.2
missing	4		1		5	

**LAUNEM: Grundstimmung**

- 1 - mürrisch
- 2 - bedrückt
- 3 - unauffällig heiter
- 4 - albern, inadäquat heiter
- 5 - mürrisch, starke Stimmungsschwankungen
- 6 - bedrückt, starke Stimmungsschwankungen
- 7 - fröhlich, starke Stimmungsschwankungen
- 8 - albern, starke Stimmungsschwankungen

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	5	3.4	4	2.7	9	3.1
2	2	1.4	1	.7	3	1.0
3	138	95.2	142	96.6	280	95.9
missing	1		1		2	



**ANGSTM: Ängstlichkeit**

- 1 - auffallend wenig Angstreaktionen  
 2 - normale, den Altersgefährten entsprechende Angstreaktionen  
 3 - auffallend häufig Angstreaktionen

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	9	6.2	12	8.3	21	7.2
2	122	84.1	111	76.6	233	80.3
3	14	9.7	22	15.2	36	12.4
missing	1		3		4	

**ZAERTLIM: Zärtlichkeitsbedürfnis**

- 1 - auffallend wenig Bedürfnis nach Zärtlichkeitsaustausch  
 2 - normales, den Altersgefährten entsprechendes Zärtlichkeitsbedürfnis  
 3 - auffallend viel Bedürfnis nach Zärtlichkeit zu vertrauten Bezugspersonen  
 4 - auffallend viel Bedürfnis nach Zärtlichkeit, auch gegenüber wenig vertrauten Personen  
 ("fällt jedem um den Hals")

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	14	9.7	9	6.1	23	7.9
2	112	77.8	108	73.5	220	75.6
3	18	12.5	29	19.7	47	16.2
4			1	.7	1	.3
missing	2		1		3	

**KONTAKTM: Kontakt**

- 1 - gegenüber Fremden nicht aufschließbar  
 2 - gegenüber Fremden verzögert aufschließbar  
 3 - gegenüber Fremden altersentsprechend aufschließbar  
 4 - sehr schnell aufschließbar, distanzgemindert

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	1	.7			1	.3
2	35	24.0	36	24.8	71	24.4
3	106	72.6	106	73.1	212	72.9
4	4	2.7	3	2.1	7	2.4
missing			3		3	



**BEWEGUNM: Bewegungsbedürfnis**

- 1 - auffallend bewegungsarm
- 2 - unauffällig
- 3 - bewegungsreich, ausreichend gesteuert
- 4 - bewegungsreich, "unruhig und zapplig"

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	4	2.7			4	1.4
2	30	20.5	37	25.0	67	22.8
3	70	47.9	84	56.8	154	52.4
4	42	28.8	27	18.2	69	23.5

**GROBMOTM: Grobmotorik**

- 1 - beim Laufen und Springen auffallend ungeschickte, plumpe Bewegungen
- 2 - unauffällig
- 3 - beim Laufen und Springen auffallend geschickt
- 4 - läuft noch nicht
- 5 - läuft und steht noch nicht

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	26	18.1	22	15.0	48	16.5
2	114	79.2	121	82.3	235	80.8
3	4	2.8	4	2.7	8	2.7
missing	2		1		3	

**SPREWOM: Wie spricht das Kind? (Wortschatz)**

- 1 - spricht noch nicht altersgerecht
- 2 - spricht normal
- 3 - spricht sehr gut (dem Alter voraus)
- 4 - spricht noch gar nicht

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	55	37.7	41	27.7	96	32.7
2	80	54.8	85	57.4	165	56.1
3	10	6.8	22	14.9	32	10.9
4	1	.7			1	.3

**SPREAKM: Sprechen,(Sprechaktivität)**

- 1 - keine Sprechaktivität
- 2 - geringe Sprechaktivität
- 3 - Sprechaktivität dem Alter entsprechend
- 4 - Sprechaktivität gesteigert

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	2	1.4			2	.7
2	16	11.1	7	4.7	23	7.9
3	126	87.5	138	93.2	264	90.4
4			3	2.0	3	1.0
missing	2				2	

**PSYAUFM:Sammelspalte Psychische Auffälligkeiten**

Die Erhebungen zu "psychischen Auffälligkeiten" dienen orientierend zur Ermittlung der individuellen Häufigkeit von Symptomen (Symptomindex, vgl. Meyer-Probst & Teichmann, 1984, S.129-137). Die Dichotomisierung "auffällig/unauffällig" erfolgte aufgrund der empirischen Verteilung, indem jeweils 15-25% der stärksten Symptomausprägung als "auffällig" eingestuft wurden. Damit erklärt sich die hohe (unrealistische) Auffälligkeitsrate in der Sammelspalte.

- 1 - keine
- 2 - vorhanden

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	34	23.6	41	27.7	75	25.7
2	110	76.4	107	72.3	217	74.3
missing	2				2	

**SRAUM2: Schlafraum des Kindes**

- 1 - eigenes Kinderzimmer
- 2 - Kinderzimmer mit Geschwistern, eigenes Bett
- 3 - Kinderzimmer mit Geschwistern, kein eigenes Bett
- 4 - Elternschlafzimmer, eigenes Bett
- 5 - Elternschlafzimmer, kein eigenes Bett
- 6 - Wohnzimmer, eigene Schlafstelle
- 7 - Wohnzimmer, keine eigene Schlafstelle
- 8 - andere Möglichkeiten, mit eigener Schlafstelle
- 9 - andere Möglichkeiten, ohne eigene Schlafstelle

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	19	13.0	15	10.1	34	11.6
2	52	35.6	38	25.7	90	30.6
4	51	34.9	66	44.6	117	39.8
5			2	1.4	2	.7
6	9	6.2	12	8.1	21	7.1
8	15	10.3	15	10.1	30	10.2

**SSTOER2: Äußere Störfaktoren für den Schlaf des Kindes**

- 1 - keine
- 2 - wird umgebettet
- 3 - Durchgangszimmer
- 4 - 2 +3
- 5 - Kind schläft in dem Zimmer, in dem sich abends Erwachsene aufhalten
- 6 - weitere Störfaktoren und Kombinationen

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	120	82.2	120	81.6	240	81.9
2			1	.7	1	.3
3	1	.7	3	2.0	4	1.4
4	1	.7			1	.3
5	17	11.6	22	15.0	39	13.3
6	7	4.8	1	.7	8	2.7
missing			1		1	

**SDAU2: Durchschnittliche Nachtschlafdauer an Werktagen**

- 1 - 7 Stunden und weniger
- 2 - 7 - 8 Stunden
- 3 - 8 - 9 Stunden
- 4 - 9 - 10 Stunden
- 5 - 10 - 11 Stunden
- 6 - 11 - 12 Stunden
- 7 - über 12 Stunden

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
2			1	.7	1	.3
3	1	.7	1	.7	2	.7
4	7	4.8	10	6.8	17	5.8
5	61	41.8	59	39.9	120	40.8
6	73	50.0	71	48.0	144	49.0
7	4	2.7	6	4.1	10	3.4

**ESDAU2: Durchschnittliche Einschlafdauer an Werktagen**

- 1 - bis 15 Minuten
- 2 - 16 bis 30 Minuten
- 3 - 31 bis 45 Minuten
- 4 - 46 bis 60 Minuten
- 5 - 61 bis 75 Minuten
- 6 - 76 bis 90 Minuten
- 8 - 106 Minuten und mehr

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	58	39.7	63	42.6	121	41.2
2	48	32.9	43	29.1	91	31.0
3	18	12.3	16	10.8	34	11.6
4	11	7.5	13	8.8	24	8.2
5	2	1.4	4	2.7	6	2.0
6	8	5.5	4	2.7	12	4.1
8	1	.7	5	3.4	6	2.0

**HSSTOE2: Durchschnittliche Häufigkeit von Durchschlafstörungen**

- 1 - keine  
 2 - früher vorhanden, in den letzten 3 Monaten nicht  
 3 - früher vorhanden, neigt noch dazu, sofern bestimmte Maßnahmen nicht eingehalten werden  
 4 - in den letzten 3 Monaten 1-3mal im Monat  
 5 - in den letzten 3 Monaten 4-9mal im Monat  
 6 - in den letzten 3 Monaten 10-15mal im Monat  
 7 - fast täglich Durchschlafstörungen in den letzten 3 Monaten

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	134	91.8	121	81.8	255	86.7
2	1	.7	2	1.4	3	1.0
3	2	1.4	1	.7	3	1.0
4	1	.7	7	4.7	8	2.7
5	1	.7	8	5.4	9	3.1
6	5	3.4	1	.7	6	2.0
7	2	1.4	8	5.4	10	3.4

**SCHLAF2: Sammelspalte Schlafstörungen**

- 1 - nein  
 2 - ja

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	128	87.7	115	77.7	243	82.7
2	18	12.3	33	22.3	51	17.3

**2 JAHRE****KINDERFEHLER**

Anmerkung: Unter "Kinderfehler" (vgl. Göllnitz 1975) sind meist vorübergehende Verhaltens- und Anpassungsstörungen mit Beginn in der frühen Kindheit gefaßt, die nach ICD 10 vorwiegend unter F.98 geführt werden.

Die Angaben der Mütter zu Kinderfehlern, die auch von den Krippenerzieherinnen vorliegen, sind am Ende des Variablencodes mit einem "M" gekennzeichnet.

**JAKTAT2M: Jactatio capitis et corporis (Monat des ersten Auftretens)**

- 1 - keine
- 2 - bis zum 9. Monat
- 3 - 10. bis 12. Monat
- 4 - 13. bis 15. Monat
- 5 - 16. bis 18. Monat
- 6 - 19. bis 21. Monat
- 7 - 22. Monat und darüber

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	134	93.7	140	96.6	274	95.1
3	3	2.1	4	2.8	7	2.4
4	3	2.1			3	1.0
5	1	.7			1	.3
6	2	1.4			2	.7
7			1	.7	1	.3
missing	3		3		6	

**NAEGEL2M:Nägelknabbern (Zeitpunkt des ersten Auftretens)**

- 1 - nie
- 2 - bis zum 9. Monat
- 3 - 10. bis 12. Monat
- 4 - 13. bis 15. Monat
- 5 - 16. bis 18. Monat
- 6 - 19. bis 21. Monat
- 7 - 22. Monat und darüber

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	144	99.3	146	98.6	290	99.0
7	1	.7	2	1.4	3	1.0
missing	1				1	



**PAVORN2: Pavor nocturnus (Monat des ersten Auftretens, auch wenn er durch die Behandlung unterdrückt ist)**

- 1 - keinen
- 2 - bis zum 9. Monat
- 3 - 10. bis 12. Monat
- 4 - 13. bis 15. Monat
- 5 - 16. bis 18. Monat
- 6 - 19. bis 21. Monat
- 7 - 22. Monat und darüber

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	123	91.8	108	83.7	231	87.8
3			1	.8	1	.4
4	1	.7	2	1.6	3	1.1
5	2	1.5	3	2.3	5	1.9
6	2	1.5	7	5.4	9	3.4
7	6	4.5	8	6.2	14	5.3
missing	12		19		31	

**MANGEN2M: Gehäufte Manipulationen am Genitale  
(Zeitpunkt des erstens Auftretens)**

- 1 - nie
- 2 - bis zum 9. Monat
- 3 - 10. bis 12. Monat
- 4 - 13. bis 15. Monat
- 5 - 16. bis 18. Monat
- 6 - 19. bis 21. Monat
- 7 - 22. Monat und darüber

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	142	97.9	148	100.0	290	99.0
3	1	.7			1	.3
4	1	.7			1	.3
6	1	.7			1	.3
missing	1				1	

**MANHAARM: Gehäufte Manipulationen am Kopfhaar**

**(Ausreißen des eigenen Haares, des fremder Kinder bzw. bei Spielzeug - Zeitpunkt des ersten Auftretens)**

- 1 - keine
- 2 - bis zum 9. Monat
- 3 - 10. bis 12. Monat
- 4 - 13. bis 15. Monat
- 5 - 16. bis 18. Monat
- 6 - 19. bis 21. Monat
- 7 - 22. Monat und darüber

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	140	96.6	145	99.3	285	97.9
2			1	.7	1	.3
6	2	1.4			2	.7
7	3	2.1			3	1.0
missing	1		2		3	

**TICS2M: Tics im Gesichts- und/oder Körperbereich**

**(Zeitpunkt des ersten Auftretens)**

- 1 - keine
- 2 - bis zum 9. Monat
- 3 - 10. bis 12. Monat
- 4 - 13. bis 15. Monat
- 5 - 16. bis 18. Monat
- 6 - 19. bis 21. Monat
- 7 - 22. Monat und darüber

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	144	99.3	146	98.6	290	99.0
7	1	.7	2	1.4	3	1.0
missing	1				1	

**DAUMLU2M: Daumen - Fingerlutschen (Zeitpunkt des Aufhörens)**

1 - hat nie Finger oder Daumen gelutscht

2 - bis zum 9. Monat eingestellt

3 - zwischen 10. und 12. Monat eingestellt

4 - zwischen 13. und 15. Monat eingestellt

5 - zwischen 16. und 18. Monat eingestellt

6 - zwischen 19. und 21. Monat eingestellt

7 - zwischen 22. Monat und darüber

8 - lutscht nur noch selten, z.B. bei Übermüdung, Unbehagen und beim Einschlafen

9 - lutscht auch noch während des Spielens

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	81	55.5	75	51.0	156	53.2
2	1	.7	2	1.4	3	1.0
3			2	1.4	2	.7
4	2	1.4			2	.7
5			1	.7	1	.3
6	1	.7	1	.7	2	.7
7			1	.7	1	.3
8	48	32.9	43	29.3	91	31.1
9	13	8.9	22	15.0	35	11.9
missing			1		1	

**KINFEH2M: Sammelspalte Kinderfehler**

Die Sammelspalte stellt ein Expertenurteil des Untersuchers anhand der Angaben der Mutter über psychische Störungen des Kindes dar.

1 - nein

2 - ja

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	109	75.7	103	69.6	212	72.6
2	35	24.3	45	30.4	80	27.4
missing	2				2	

**KINDMU2: Gesamtzahl aller lebenden Kinder der Mutter**

1 - 8 - Codierung entspricht der jeweiligen Anzahl der Kinder

9 - 9 Kinder und mehr

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	61	41.8	65	43.9	126	42.9
2	57	39.0	60	40.5	117	39.8
3	18	12.3	16	10.8	34	11.6
4	7	4.8	7	4.7	14	4.8
5	2	1.4			2	.7
7	1	.7			1	.3

**KINDMUJ2: Zahl aller männlichen Kinder der Mutter**

1 - 7 - Codierung entspricht der jeweiligen Anzahl der Jungen

8 - 8 Jungen und mehr

9 - keine Jungen

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	95	65.1	42	28.6	137	46.8
2	41	28.1	6	4.1	47	16.0
3	7	4.8	2	1.4	9	3.1
4	3	2.1			3	1.0
9			97	66.0	97	33.1
missing			1		1	

**KINDMUM2: Zahl aller weiblichen Kinder der Mutter**

1 - 7 - Codierung entspricht der jeweiligen Anzahl der Mädchen

8 - 8 Mädchen und mehr

9 - keine Mädchen

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	45	30.8	102	69.4	147	50.2
2	4	2.7	38	25.9	42	14.3
3	4	2.7	7	4.8	11	3.8
9	93	63.7			93	31.7
missing			1		1	

**NACHGE2: Wieviele Kinder wurden nach der Geburt dieses untersuchten Kindes geboren? Bestanden nachfolgende Schwangerschaften?**

- 1 - keine Geburt, keine Schwangerschaft
- 2 - Schwangerschaft/-en, keine Lebendgeburt
- 3 - zur Zeit Schwangerschaft
- 4 - eine Lebendgeburt
- 5 - 2 Lebendgeburten
- 6 - 3 und mehr Lebendgeburten

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	127	87.0	125	85.6	252	86.3
2	7	4.8	9	6.2	16	5.5
3	2	1.4	4	2.7	6	2.1
4	10	6.8	8	5.5	18	6.2
missing			2		2	

**ZAHLHA2: Zahl aller im Haushalt lebenden Kinder**

- 1 - 6 - Codierung entspricht der jeweiligen Anzahl der Kinder
- 7 - 7 Kinder und mehr
- 8 - keine Kinder
- 9 - Heimkind

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	61	41.8	63	42.6	124	42.2
2	56	38.4	60	40.5	116	39.5
3	19	13.0	17	11.5	36	12.2
4	7	4.8	6	4.1	13	4.4
5	2	1.4			2	.7
7	1	.7			1	.3
9			2	1.4	2	.7

**STELLG2: Stellung des untersuchten Kindes in der Geschwisterreihe**

- 1 - Einzelkind
- 2 - ältestes Kind
- 3 - Mittelstellung
- 4 - jüngstes Kind
- 5 - 1. Zwillingkind, beide Zwillinge leben
- 6 - 1. Zwillingkind, 2. Zwilling tot
- 7 - 2. Zwillingkind, beide Zwillinge leben
- 8 - 2. Zwillingkind, 1. Zwilling tot

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	60	41.1	64	43.5	124	42.3
2	8	5.5	6	4.1	14	4.8
3	2	1.4	1	.7	3	1.0
4	69	47.3	71	48.3	140	47.8
5	3	2.1	4	2.7	7	2.4
7	4	2.7	1	.7	5	1.7
missing			1		1	

**SOZGE2: Sozialverhalten der Geschwister (Disziplinschwierigkeiten, Aggressivität, Einordnungs- und Anpassungsschwierigkeiten)**

- 1 - keine Geschwister vorhanden
- 2 - Geschwister unauffällig
- 3 - ein oder mehrere Geschwister wurden wegen auffälligen Sozialverhaltens dem Arzt vorgestellt
- 4 - über ein oder mehrere Geschwister klagen Krippe, Kindergarten oder Schule
- 5 - über ein oder mehrere Geschwister klagt das Elternhaus
- 6 - über ein oder mehrere Geschwister klagen Elternhaus, Krippe, Kindergarten oder Schule
- 7 - 3 + 4 + 5

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	66	45.5	68	46.3	134	45.9
2	75	51.7	72	49.0	147	50.3
3	2	1.4	4	2.7	6	2.1
4	2	1.4	3	2.0	5	1.7
missing	1		1		2	

**FAMILM2: Familienstruktur auf die Mutter bezogen**

- 1 - Kind lebt nicht bei der Mutter
- 2 - Mutter ledig
- 3 - Mutter verheiratet, zusammenlebend
- 4 - Mutter verheiratet, Vater durch berufliche Tätigkeit mehrwöchig von der Familie getrennt
- 5 - Mutter verheiratet, lebt wegen Disharmonie vom Vater getrennt
- 6 - Mutter geschieden, lebt mit dem Vater in einer Wohnung
- 7 - Mutter geschieden, verwitwet, wieder verheiratet
- 8 - Mutter verwitwet, allein lebend
- 9 - Mutter geschieden, allein lebend

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	3	2.1	1	.7	4	1.4
2	12	8.2	11	7.5	23	7.8
3	116	79.5	119	81.0	235	80.2
4	5	3.4	9	6.1	14	4.8
6	1	.7	1	.7	2	.7
7	1	.7	1	.7	2	.7
8	1	.7			1	.3
9	7	4.8	5	3.4	12	4.1
missing			1		1	

**WAISE: Verwaisung des Kindes**

- 1 - Vollelterig
- 2 - Vaterwaise
- 3 - Mutterwaise
- 4 - Vollwaise
- 5 - unehelich

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	122	84.7	132	89.8	254	87.3
2	7	4.9	1	.7	8	2.7
3	1	.7			1	.3
5	14	9.7	14	9.5	28	9.6
missing	2		1		3	

**FAMKIN2: Familienverband des Kindes**

- 1 - Eltern
- 2 - Großeltern oder andere Verwandte
- 3 - Mutter allein
- 4 - Eltern und Großeltern oder andere Verwandte
- 5 - Mutter und Großeltern oder andere Verwandte
- 6 - Stiefmutterfamilie
- 7 - Stiefvaterfamilie
- 8 - Adoptiv- oder Pflegeeltern
- 9 - Heimkind

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	113	77.9	118	79.7	231	78.8
2	1	.7			1	.3
3	14	9.7	10	6.8	24	8.2
4	9	6.2	12	8.1	21	7.2
5	7	4.8	6	4.1	13	4.4
8	1	.7			1	.3
9			2	1.4	2	.7
missing	1				1	

**LEBEN2: Wenn Sie Ihre eigenen Lebensverhältnisse mit denen anderer  
vergleichen, wie würden Sie Ihre Lebensverhältnisse  
einschätzen?**

- 1 - sehr gut
- 2 - gut
- 3 - ausreichend
- 4 - schlecht

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	4	2.8	9	6.3	13	4.6
2	103	73.0	107	74.8	210	73.9
3	31	22.0	25	17.5	56	19.7
4	3	2.1	2	1.4	5	1.8
missing	5		5		10	



**NETTO2: Monatliches Nettoeinkommen pro Kopf der Familie**

- 1 - weniger als 100 Mark im Monat
- 2 - 101 bis 150 Mark im Monat
- 3 - 151 bis 200 Mark im Monat
- 4 - 201 bis 250 Mark im Monat
- 5 - 251 bis 300 Mark im Monat
- 6 - 301 bis 350 Mark im Monat
- 7 - 351 bis 400 Mark im Monat
- 8 - 401 bis 450 Mark im Monat
- 9 - 451 Mark und mehr im Monat

Anmerkung:

Nettoeinkommen = Lohn, Gehalt, Kindergeld, Renten u.ä. / Anzahl der im Haushalt lebenden Personen

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
2	2	1.4	1	.7	3	1.1
3	9	6.4	4	2.8	13	4.6
4	25	17.9	21	14.8	46	16.3
5	19	13.6	27	19.0	46	16.3
6	39	27.9	37	26.1	76	27.0
7	20	14.3	24	16.9	44	15.6
8	18	12.9	16	11.3	34	12.1
9	8	5.7	12	8.5	20	7.1
missing	6		6		12	

**WOHNUN2: Haben Sie eine abgeschlossene Wohnung?**

- 1 - Teilwohnung mit Fremden, ohne eigene Küche
- 2 - Teilwohnung mit Fremden, mit eigener Küche
- 3 - Teilwohnung mit Verwandten, ohne eigene Küche
- 4 - Teilwohnung mit Verwandten, mit eigener Küche
- 5 - abgeschlossene eigene Wohnung

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	4	2.7	13	8.9	17	5.8
2	4	2.7			4	1.4
3	20	13.7	20	13.7	40	13.7
4			1	.7	1	.3
5	118	80.8	112	76.7	230	78.8
missing			2		2	



**ZIMMER2: Zimmeranteil des Kindes**

- 1 - 0,3 und kleiner
- 2 - 0,4 bis 0,5
- 3 - 0,6 bis 0,7
- 4 - 0,8 bis 0,9
- 5 - 1,0 und größer

Anmerkung:

Zimmeranteil = Anzahl der Zimmer / Anzahl der darin lebenden Personen

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	21	14.4	29	19.9	50	17.1
2	60	41.1	53	36.3	113	38.7
3	51	34.9	50	34.2	101	34.6
4	7	4.8	12	8.2	19	6.5
5	7	4.8	2	1.4	9	3.1
missing			2		2	

**KOMFORT2: Komfortmerkmale der Wohnung**

- 1 - Wohnung mit Bad
- 2 - Wohnung ohne Bad, mit Innen-WC
- 3 - Wohnung ohne Innen-WC, aber fließendes Wasser
- 4 - Wohnung ohne Innen-WC, ohne fließendes Wasser
- 5 - unter 1 - 4 nicht genannte Kombinationen der Merkmale Bad, IWC, fließendes Wasser

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	92	63.0	101	69.2	193	66.1
2	26	17.8	25	17.1	51	17.5
3	26	17.8	18	12.3	44	15.1
4	2	1.4	2	1.4	4	1.4
missing			2		2	

**HILFHAU2: Hilfe im Haushalt**

- 1 - keinerlei nennenswerte Hilfe
- 2 - "Oma" versorgt den Haushalt
- 3 - Mutter wird gelegentlich unterstützt durch größere Kinder, Großmutter, Ehemann und/oder andere
- 4 - regelmäßige Hilfe durch größere Kinder, Ehemann usw.
- 5 - Hausangestellte, stundenweise
- 6 - Hausangestellte, vollbeschäftigt

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	82	56.2	77	53.1	159	54.6
2	4	2.7	5	3.4	9	3.1
3	3	2.1			3	1.0
4	56	38.4	63	43.4	119	40.9
5	1	.7			1	.3
missing			3		3	

**EHE2: Wie schätzen Sie Ihre Ehe ein?**

- 1 - Kind lebt nicht bei den Eltern
- 2 - harmonisch
- 3 - gut, aber gelegentlich doch ernsthafte Auseinandersetzungen
- 4 - in der Ehe gib es sehr oft Streitigkeiten
- 5 - die Frau würde sich, "wenn es ginge" scheiden lassen
- 6 - es besteht eine ernsthafte Scheidungsabsicht und / oder es besteht ein Scheidungsantrag
- 99 - entfällt, da keine Ehe

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1			1	.7	1	.4
2	111	78.2	116	82.9	227	80.5
3	7	4.9	5	3.6	12	4.3
4	2	1.4			2	.7
99	22	15.5	18	12.9	40	14.2
missing	4		8		12	

**FAMPSYCH: Familiäre Belastung mit psychiatrischen Erkrankungen  
(Großeltern, Eltern, Geschwister der Eltern, Geschwister  
des untersuchten Kindes)**

- 1 - keine
- 2 - Psychosen
- 3 - cerebrale Krampfanfälle
- 4 - 2 + 3
- 5 - Schwachsinn (Hilfsschüler, Bildungsunfähige)
- 6 - 2 + 5
- 7 - 3 + 5
- 8 - 2 + 3 + 5

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	136	93.8	131	91.6	267	92.7
2	3	2.1	3	2.1	6	2.1
3			4	2.8	4	1.4
5	5	3.4	4	2.8	9	3.1
6			1	.7	1	.3
7	1	.7			1	.3
missing	1		5		6	

**PSYCHFAM: Lebt ein psychiatrisch-psychisch Kranker in der Familie des  
Kindes?**

- 1 - keine
- 2 - 1 Auffälliger
- 3 - 2 Auffällige
- 4 - 3 und mehr Auffällige

Anmerkung:

Hierzu gehören: Psychosen, Suizide bzw. Suizidversuche, cerebrales Anfallsleiden, Alkoholismus, ausgeprägtes Psychosyndrom, Bildungsunfähigkeit bzw. andere psychische Störungen, die zu einer nervenärztlichen Behandlung führten

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	141	97.9	143	97.9	284	97.9
2	3	2.1	3	2.1	6	2.1
missing	2		2		4	

**FAMERKRA: Familiäre Belastungen mit anderen Erkrankungen**

- 1 - keine
- 2 - Muskelerkrankungen
- 3 - Mißbildungen
- 4 - 2 + 3
- 5 - degenerative Erkrankungen
- 6 - 2 + 5
- 7 - 3 + 5
- 8 - 2 + 3 + 5

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	144	99.3	143	98.6	287	99.0
2			1	.7	1	.3
3	1	.7	1	.7	2	.7
missing	1		3		4	

**SCHUGN2: Schulleistungen der Geschwister**

- 1 - keine Geschwister in der Schule
- 2 - das einzige Geschwisterkind ist Hilfsschüler
- 3 - mehrere Geschwister sind Hilfsschüler
- 4 - unter den Geschwistern ist nur ein Kind, das die POS nicht / nicht voll schafft
- 5 - das einzige Geschwisterkind ist ein schwacher Normalschüler (Durchschnittsnote in Deutsch und Mathematik schlechter als "3")
- 6 - mehrere Geschwister sind schwache Normalschüler (Durchschnittsnote in Deutsch und Mathe schlechter als "3")
- 7 - alle Geschwister sind durchschnittliche Normalschüler
- 8 - das einzige Geschwisterkind ist ein guter Normalschüler (Durchschnittsnote in Deutsch und Mathematik "2" und besser)
- 9 - mehrere Geschwister sind gute Normalschüler (Durchschnittsnote in Deutsch und Mathematik "2" und besser)

Anmerkung:

zu 4: Hilfsschüler, Repetenten, Durchschnittsnote Deutsch und Mathematik "3" und schlechter

zu 9: sofern ein Geschwisterkind bei 2 Geschwistern ein guter Schüler, der andere ein durchschnittlicher Schüler ist, ebenfalls unter 9 eintragen

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	105	71.9	106	72.6	211	72.3
3	1	.7			1	.3
4	3	2.1	1	.7	4	1.4
5	2	1.4	1	.7	3	1.0
7	7	4.8	8	5.5	15	5.1
8	16	11.0	23	15.8	39	13.4
9	12	8.2	7	4.8	19	6.5
missing			2		2	

**ASCHUN2: Schulpflichtige, zur Zeit aber nicht schulfähige Geschwister**

- 1 - keine Geschwister, keine schulpflichtigen Geschwister
- 2 - 1 Geschwisterkind einmal zurückgestellt
- 3 - mehrere Geschwisterkinder zwei- oder mehrmals zurückgestellt
- 4 - 1 Geschwisterkind zwei- oder mehrmals zurückgestellt
- 5 - mehrere Geschwisterkinder einmal zurückgestellt
- 6 - 1 bzw. mehrere Geschwister sind nicht schulbildungsfähig (imbezill)

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	143	97.9	144	98.0	287	98.0
2	3	2.1	3	2.0	6	2.0
missing			1		1	



**SCHMU2: Schulabschluß der Mutter**

Da das Alter der Mütter breit streut (17 - 43 Jahre), gibt es einige, die den 8-Klassen-Abschluß als Regelabschluß machten. Insofern wird die Aussagefähigkeit der Schulabschluß-Variable durch historische Besonderheiten der DDR-Anfangszeit eingeschränkt.

- 1 - Normalschule, noch nicht abgeschlossen
- 2 - Hilfsschule, noch nicht abgeschlossen
- 3 - ehemalige Hilfsschülerin
- 4 - ehemalige Normalschülerin, ohne Abschluß der 8. Klasse
- 5 - Abschluß der 8. oder 9. Klasse
- 6 - Abschluß der 10. oder 11. Klasse
- 7 - Abschluß der 12. Klasse mit Abitur

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
3	1	.7			1	.3
4	4	2.7	5	3.4	9	3.1
5	60	41.1	60	41.1	120	41.1
6	49	33.6	55	37.7	104	35.6
7	32	21.9	26	17.8	58	19.9
missing			2		2	

**BMU2: Erlerner Beruf der Mutter**

- 1 - Schülerin
- 2 - Studentin (auch Fachschule)
- 3 - Lehrling
- 4 - ohne erlernten Beruf
- 5 - Teilfacharbeiterbrief
- 6 - Facharbeiterbrief
- 7 - Fachschulabschluß
- 8 - Hochschulabschluß

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
2	2	1.4			2	.7
4	15	10.3	14	9.6	29	9.9
5	4	2.7	7	4.8	11	3.8
6	78	53.4	76	52.1	154	52.7
7	27	18.5	32	21.9	59	20.2
8	20	13.7	17	11.6	37	12.7
missing			2		2	



**BERUFM2: Berufstätigkeit der Mutter**

- 1 - nicht berufstätig (mindestens seit der Geburt des Kindes)
- 2 - nach der Geburt des Kindes längere Zeit nicht berufstätig (mindestens 1 Jahr)
- 3 - zur Zeit vorübergehend nicht berufstätig bzw. vorläufig aufgehört zu arbeiten
- 4 - Heimarbeit
- 5 - teilbeschäftigt, ohne Schichtarbeit
- 6 - teilbeschäftigt, mit Schichtarbeit
- 7 - vollbeschäftigt, ohne Schichtarbeit (auch Studium)
- 8 - vollbeschäftigt, 2 Schichten
- 9 - vollbeschäftigt, 3 Schichten

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	1	.7			1	.3
5	36	24.7	28	19.2	64	21.9
6	3	2.1	7	4.8	10	3.4
7	95	65.1	93	63.7	188	64.4
8	8	5.5	10	6.8	18	6.2
9	3	2.1	8	5.5	11	3.8
missing			2		2	

**TMU2: Zur Zeit ausgeübte Tätigkeit der Mutter**

- 1 - nicht berufstätig
- 2 - Arbeiterin in ungelernter Tätigkeit oder im Anlernverhältnis
- 3 - Tätigkeit mit Facharbeiterabschluß
- 4 - nicht leitende Angestellte ohne Fach- oder Hochschulabschluß
- 5 - nicht leitende Angestellte mit Fach- oder Hochschulabschluß
- 6 - leitende Angestellte
- 7 - Freischaffende oder Gewerbetreibende
- 8 - Rentnerin und Sozialfürsorgeempfängerin
- 9 - noch in Ausbildung befindliche Schülerin, Lehrling oder Studentin

Anmerkung:

- unter 4: Sachbearbeiterin, Sekretärin, andere Verwaltungsangestellte
- unter 5: Ingenieurin, Lehrerin (außer Direktorin), Ärztin bis Oberärztin, nicht leitende Apothekerin etc.
- unter 6: ab Abteilungsleiterin, Offizierin, hauptamtliche Sekretärin in gesellschaftlichen Organisationen, Oberärztin, Laborleiterin etc.
- unter 7: Musikerin, Sängerin (sofern freischaffend), selbständige Handwerksmeisterin und Handwerkerin, freischaffende Künstlerin

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	1	.7			1	.3
2	18	12.3	17	11.6	35	11.9
3	67	45.9	63	42.9	130	44.4
4	14	9.6	18	12.2	32	10.9
5	43	29.5	46	31.3	89	30.4
6	1	.7	3	2.0	4	1.4
9	2	1.4			2	.7
missing			1		1	

**QUALMU2: Erwachsenenqualifizierung der Mutter**

- 1 - zur Zeit keine
- 2 - noch in normaler Berufsausbildung
- 3 - gelegentliche Fortbildungsveranstaltungen
- 4 - innerbetriebliche Erwachsenenqualifizierung (Betriebsakademien)
- 5 - regelmäßiger Besuch der Volkshochschule zum Nachholen eines Schulabschlusses
- 6 - regelmäßiger Besuch der Volkshochschule für Teilgebiete z. B. Sprachen
- 7 - Fernstudium (Fachschule)
- 8 - Fernstudium (Hochschule)
- 9 - 2 + 5

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	121	82.9	119	81.5	240	82.2
2			1	.7	1	.3
3	6	4.1	10	6.8	16	5.5
4	8	5.5	7	4.8	15	5.1
5	2	1.4			2	.7
6	2	1.4			2	.7
7	3	2.1	7	4.8	10	3.4
8	4	2.7	2	1.4	6	2.1
missing			2		2	

**GESUNM2: Gesundheitszustand der Mutter in den letzten 3 Jahren nach ihrer eigenen Einschätzung**

- 1 - unbeeinträchtigt (voll belastbar)
- 2 - eingeschränkt (nicht voll belastbar)
- 3 - eingeschränkt (Schwerbeschädigtenausweis)
- 4 - eingeschränkt (Teilrentner)
- 5 - eingeschränkt (Invalide)

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	120	82.8	120	82.8	240	82.8
2	23	15.9	24	16.6	47	16.2
3	2	1.4	1	.7	3	1.0
missing	1		3		4	

**HERZMU2: Herzerkrankungen**

- 1 - keine
- 2 - vor der Schwangerschaft festgestellt
- 3 - während der Schwangerschaft festgestellt
- 4 - nach der Schwangerschaft festgestellt

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	140	97.2	139	96.5	279	96.9
2	4	2.8	5	3.5	9	3.1
missing	2		4		6	

**SCHILMU2:Schilddrüsenerkrankungen**

- 1 - keine
- 2 - vor der Schwangerschaft festgestellt
- 3 - während der Schwangerschaft festgestellt
- 4 - nach der Schwangerschaft festgestellt

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	137	94.5	140	96.6	277	95.5
2	7	4.8	4	2.8	11	3.8
4	1	.7	1	.7	2	.7
missing	1		3		4	

**DIABEMU2: Diabetes mellitus**

- 1 - keinen
- 2 - vor der Schwangerschaft festgestellt
- 3 - während der Schwangerschaft festgestellt
- 4 - nach der Schwangerschaft festgestellt

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	145	100.0	143	98.6	288	99.3
3			2	1.4	2	.7
missing			3		4	

**NIEREMU2: Nierenerkrankungen**  
**(Steinleiden mit häufigen Koliken, gehäufte Pyelonephritis,**  
**Cystennieren oder andere Nierenmißbildungen,**  
**eingeschränkte Nierenfunktion, Zustand nach Nieren -Op)**

- 1 - keine  
 2 - vor der Schwangerschaft  
 3 - während der Schwangerschaft  
 4 - 2 + 3  
 5 - nach der Schwangerschaft  
 6 - 2 + 5  
 7 - 3 + 5  
 8 - 2 + 3 + 5

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	113	77.9	103	72.0	216	75.0
2	10	6.9	10	7.0	20	6.9
3	8	5.5	14	9.8	22	7.6
5	6	4.1	11	7.7	17	5.9
7	1	.7			1	.3
8	7	4.8	5	3.5	12	4.2
missing	1		5		6	

**ORGANMU2: Andere Organerkrankungen**

**(Asthma bronchiale, gehäufte Bronchiden, Lungen-Tb,  
Zustand nach schweren Operationen und Unfällen,  
Lebererkrankungen, Tumoren, Magen-Darm-Leiden)**

- 1 - keine
- 2 - vor der Schwangerschaft
- 3 - während der Schwangerschaft
- 4 - 2 + 3
- 5 - nach der Schwangerschaft
- 6 - 2 + 5
- 7 - 3 + 5
- 8 - 2 + 3 + 5

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	134	92.4	126	86.9	260	89.7
2	4	2.8	12	8.3	16	5.5
3	1	.7			1	.3
5	4	2.8	6	4.1	10	3.4
8	2	1.4	1	.7	3	1.0
missing	1		3		4	

**MIGRM2: Migräne, Neuralgie**

- 1 - keine
- 2 - vor der Schwangerschaft
- 3 - während der Schwangerschaft
- 4 - 2 + 3
- 5 - nach der Schwangerschaft
- 6 - 2 + 5
- 7 - 3 + 5
- 8 - 2 + 3 + 5

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	138	95.8	118	81.4	256	88.6
2	2	1.4	10	6.9	12	4.2
4			1	.7	1	.3
5	2	1.4	7	4.8	9	3.1
8	2	1.4	9	6.2	11	3.8
missing	2		3		5	



**NEUROMU2: Neurologische Erkrankungen  
(MS, Hirntumor, Muskelerkrankungen, Lähmungen u.a.,  
die die Pflegefähigkeit der Mutter für das Kind  
beeinträchtigen)**

- 1 - keine
- 2 - vor der Schwangerschaft
- 3 - während der Schwangerschaft
- 4 - 2 + 3
- 5 - nach der Schwangerschaft
- 6 - 2 + 5
- 7 - 3 + 5
- 8 - 2 + 3 + 5

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	144	99.3	144	98.6	288	99.0
2	1	.7	1	.7	2	.7
5			1	.7	1	.3
missing	1		2		3	

**KRAMPFMU: Cerebrale Krampfanfälle**

- 1 - keine
- 2 - nur im Kindesalter (bis zum 16. Lebensjahr)
- 3 - Anfälle erst nach dem 16. Lebensjahr, selten; in der Schwangerschaft keine Anfälle
- 4 - Anfälle erst nach dem 16. Lebensjahr; in der Schwangerschaft Anfälle
- 5 - Anfälle seit der Kindheit, in der Schwangerschaft keine
- 6 - Anfälle seit der Kindheit, in der Schwangerschaft auch Anfälle
- 7 - Anfallsleiden erst nach der Schwangerschaft aufgetreten

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	142	98.6	146	100.0	288	99.3
2	1	.7			1	.3
5	1	.7			1	.3
missing	2		2		4	

**PSYCHOMU: Psychosen (außer Gestationspsychosen)**

- 1 - keine
- 2 - Hebephrenie (Jugendpsychosen)
- 3 - manisch - depressive Erkrankung
- 4 - Schizophrenie
- 5 - Behandlung einer Psychose während der Schwangerschaft

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	145	100.0	146	100.0	291	100.0
missing	1		2		3	

**SUIZIDMU: Suizidversuch bzw. -versuche, Suizid**

- 1 - kein
- 2 - Suizidversuch vor der Schwangerschaft
- 3 - Suizidversuch während der Schwangerschaft
- 4 - Suizidversuch nach der Schwangerschaft
- 5 - mehrere Suizidversuche außerhalb der Schwangerschaft
- 6 - mehrere Suizidversuche, mindestens einer während der Schwangerschaft

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	145	100.0	144	99.3	289	99.7
2			1	.7	1	.3
missing	1		3		4	

**GESTPSMU: Gestationspsychosen**

- 1 - keine
- 2 - Gestationspsychose beim untersuchten Kind
- 3 - Gestationspsychose bei früheren oder nachfolgenden Kindern

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	145	100.0	146	100.0	291	100.0
missing	1		2		3	

**ANDPSYMU: Andere psychische Störungen, außer den vorgenannten,  
die zu einer nervenärztlichen Behandlung führten**

- 1 - keine
- 2 - vor der Schwangerschaft
- 3 - während der Schwangerschaft
- 4 - 2 + 3
- 5 - nach der Schwangerschaft
- 6 - 2 + 5
- 7 - 3 + 5
- 8 - 2 + 3 + 5

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	137	95.1	142	97.9	279	96.5
2	3	2.1	1	.7	4	1.4
3	1	.7	1	.7	2	.7
5	2	1.4			2	.7
6			1	.7	1	.3
8	1	.7			1	.3
missing	2		3		5	

**WUKIE2:Wieviele Kinder wünschten Sie sich zur Zeit der Eheschließung?**

- 1 - 6 - Codierung entspricht der Anzahl der gewünschten Kinder
- 7 - 7 Kinder und mehr
- 8 - unverheiratet
- 9 - keine Kinder

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	13	9.5	23	16.2	36	12.9
2	101	73.7	97	68.3	198	71.0
3	10	7.3	4	2.8	14	5.0
4			2	1.4	2	.7
8	12	8.8	12	8.5	24	8.6
9	1	.7	4	2.8	5	1.8
missing	9		6		15	

**WUKIME: Wieviele Mädchen wünschten Sie sich z.Z. der Eheschließung?**

- 1 - 5 - Codierung entspricht der Anzahl der gewünschten Mädchen  
 6 - 6 Mädchen und mehr  
 7 - unverheiratet  
 8 - Geschlecht gleichgültig  
 9 - kein Mädchen

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	96	74.4	100	72.5	196	73.4
2	4	3.1	9	6.5	13	4.9
7	12	9.3	12	8.7	24	9.0
8	9	7.0	9	6.5	18	6.7
9	8	6.2	8	5.8	16	6.0
missing	17		10		27	

**WUKIJE: Wieviele Jungen wünschten Sie sich z.Z. der Eheschließung?**

- 1 - 5 - Codierung entspricht der Anzahl der gewünschten Jungen  
 6 - 6 Jungen und mehr  
 7 - unverheiratet  
 8 - Geschlecht gleichgültig  
 9 - keine Kinder

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	95	73.6	94	67.6	189	70.5
2	5	3.9	2	1.4	7	2.6
3	1	.8			1	.4
7	12	9.3	12	8.6	24	9.0
8	9	7.0	9	6.5	18	6.7
9	7	5.4	22	15.8	29	10.8
missing	17		9		26	

**WUKIGES: Wieviele Kinder hätten Sie jetzt gern insgesamt?**

1 - 7 - Codierung entspricht der Anzahl der Kinder

8 - 8 und mehr Kinder

9 - keine Kinder

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	26	18.4	25	17.5	51	18.0
2	90	63.8	98	68.5	188	66.2
3	18	12.8	15	10.5	33	11.6
4	5	3.5	5	3.5	10	3.5
5	2	1.4			2	.7
missing	5		5		10	

**WUKIM: Wieviele Mädchen hätten Sie jetzt gern insgesamt?**

1 - 7 - Codierung entspricht der Anzahl der Mädchen

8 - 8 und mehr Mädchen

9 - kein Mädchen

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	88	63.3	103	73.0	191	68.2
2	6	4.3	32	22.7	38	13.6
3	1	.7	3	2.1	4	1.4
8	4	2.9	2	1.4	6	2.1
9	40	28.8	1	.7	41	14.6
missing	7		7		14	

**WUKIJ: Wieviele Jungen hätten Sie jetzt gern insgesamt?**

1 - 7 - Codierung entspricht der Anzahl der Jungen

8 - 8 und mehr Jungen

9 - keinen Jungen

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	96	69.6	83	58.5	179	63.9
2	29	21.0	7	4.9	36	12.9
3	5	3.6	1	.7	6	2.1
8	4	2.9	2	1.4	6	2.1
9	4	2.9	49	34.5	53	18.9

missing	8		6		14	
---------	---	--	---	--	----	--

**KIZAHARM: Welche Kinderzahl halten Sie nach Ihren bisherigen Lebenserfahrungen für Familien bei uns in der DDR für die günstigste, und zwar im Hinblick auf die Harmonie der Ehe?**

- 1 - 7 - Codierung entspricht der Anzahl der Kinder  
 8 - 8 und mehr Kinder  
 9 - kein Kind

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	2	1.4	1	.7	3	1.1
2	128	90.8	128	89.5	256	90.1
3	11	7.8	14	9.8	25	8.8
missing	5		5		10	

**KIZAENTW: Welche Kinderzahl halten Sie nach Ihren bisherigen Lebenserfahrungen für Familien bei uns in der DDR für die günstigste, und zwar im Hinblick auf die gute Entwicklung der Kinder?**

- 1 - 7 - Codierung entspricht der Anzahl der Kinder  
 8 - 8 und mehr Kinder  
 9 - kein Kind

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	3	2.1	1	.7	4	1.4
2	127	90.1	126	88.1	253	89.1
3	11	7.8	16	11.2	27	9.5
missing	5		5		10	

**KWUNSCH2: Wünschen Sie sich jetzt noch ein weiteres Kind?**

- 1 - ich wünsche mir auf jeden Fall ein weiteres Kind  
 2 - kein weiteres geplant, aber ein weiteres wäre nicht unerwünscht  
 3 - wünsche auf jeden Fall kein weiteres Kind

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	31	21.5	35	24.3	66	22.9
2	6	4.2	8	5.6	14	4.9

3	107	74.3	101	70.1	208	72.2
missing	2		4		6	



**WUKI2: Bei weiterem Kinderwunsch, Zahl der noch gewünschten Kinder**

- 1 - 7 - Codierung entspricht der Anzahl der noch gewünschten Kinder  
 8 - 8 Kinder und mehr  
 9 - kein Kind

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	35	24.3	42	29.2	77	26.7
9	109	75.7	102	70.8	211	73.3
missing	2		4		6	

**WUZAJ: Bei weiterem Kinderwunsch - wieviele Jungen?**

- 1 - 3 - Codierung entspricht der jeweiligen Anzahl der Jungen  
 4 - 4 und mehr Jungen  
 5 - bei nicht geplantem, aber nicht unerwünschtem Kind lieber einen Jungen  
 6 - bei nicht geplantem, aber nicht unerwünschtem Kind keinen Jungen  
 7 - Geschlecht ist gleichgültig  
 8 - kein weiterer Kinderwunsch  
 9 - keinen Jungen

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	1	.7	30	20.8	31	10.8
7	7	4.9	7	4.9	14	4.9
8	109	75.7	101	70.1	210	72.9
9	27	18.8	6	4.2	33	11.5
missing	2		4		6	

**WUZAM:Bei weiterem Kinderwunsch - wieviele Mädchen?**

- 1 - 3 - Codierung entspricht der jeweiligen Anzahl der Mädchen  
 4 - 4 und mehr Mädchen  
 5 - bei nicht geplantem, aber nicht unerwünschtem Kind lieber ein Mädchen  
 6 - bei nicht geplantem, aber nicht unerwünschtem Kind kein Mädchen  
 7 - Geschlecht ist gleichgültig  
 8 - kein weiterer Kinderwunsch  
 9 - kein Mädchen

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	27	18.8	5	3.5	32	11.1
7	7	4.9	7	4.9	14	4.9
8	109	75.7	101	70.1	210	72.9
9	1	.7	31	21.5	32	11.1
missing	2		4		6	

**SCHWVER2: Welche Methoden der Schwangerschaftsverhütung haben Sie während der letzten 3 Monate angewandt?**

- 1 - keine Verhütungsmethoden
- 2 - Coitus interruptus ("Aufpassen", "Rückzieher")
- 3 - Rhythmusmethode ("unfruchtbare Tage", "Kalendermethode")
- 4 - Basaltemperatur
- 5 - Spülungen
- 6 - Kondom (Gummischutz)
- 7 - Diaphragma oder Portiokappe
- 8 - IUD (Spirale, Schleife in der Gebärmutter)
- 9 - Ovulationshemmer (Pille)
- 10 - Zäpfchen, Creme, Gelee
- 11 - 2 + 4
- 12 - 3 + 4
- 13 - 4 + 6
- 14 - 6 oder 7 + 10
- 15 - 2 + 3
- 16 - weitere Kombinationen
- 17 - Sterilisation

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	23	17.8	23	17.2	46	17.5
2	6	4.7	7	5.2	13	4.9
3	7	5.4	10	7.5	17	6.5
6	3	2.3	4	3.0	7	2.7
8	9	7.0	10	7.5	19	7.2
9	73	56.6	71	53.0	144	54.8
15	5	3.9	9	6.7	14	5.3
16	2	1.6			2	.8
17	1	.8			1	.4
missing	17		14		31	

**UNTERBR: Würden Sie bei einer unerwünschten Schwangerschaft von einer gesetzlichen Möglichkeit der Unterbrechung Gebrauch machen?**

- 1 - auf jeden Fall  
2 - wahrscheinlich  
3 - auf keinen Fall

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	43	41.7	40	40.0	83	40.9
2	14	13.6	17	17.0	31	15.3
3	46	44.7	43	43.0	89	43.8
missing	43		48		91	

**UNWU: Hatten Sie sich dieses (das untersuchte) Kind gewünscht?**

- 1 - das Kind war geplant  
2 - das Kind war nicht geplant, aber erwünscht  
3 - das Kind war zunächst nicht erwünscht, aber dann freudig erwartet  
4 - unerwünscht bis zur Geburt

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	42	29.8	35	24.8	77	27.3
2	42	29.8	47	33.3	89	31.6
3	40	28.4	49	34.8	89	31.6
4	17	12.1	10	7.1	27	9.6
missing	5		7		12	

**UNJM: Sollte dieses Kind ein Junge oder ein Mädchen sein?**

- 1 - ein Junge  
2 - ein Mädchen  
3 - Geschlecht gleichgültig

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	72	50.3	34	23.6	106	36.9
2	35	24.5	64	44.4	99	34.5
3	36	25.2	46	31.9	82	28.6
missing	3		4		7	

**NZUFR2: Wieviel Kinder, einschließlich des untersuchten, entwickeln sich nicht zufriedenstellend?**

1 - 7 - Codierung entspricht der jeweiligen Anzahl der Kinder

8 - 8 und mehr Kinder

9 - kein Kind

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	6	4.2	5	3.4	11	3.8
2	1	.7			1	.3
3	1	.7			1	.3
9	136	94.4	140	96.6	276	95.5
missing	2		3		5	

**ZUFR2: Wie entwickelt sich das untersuchte Kind?**

1 - sehr gut

2 - normal

3 - nicht zufriedenstellend

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	1	.7	6	4.1	7	2.4
2	142	97.3	138	94.5	280	95.9
3	3	2.1	2	1.4	5	1.7
missing			2		2	

**AUSBER2: Wie wirkt sich Ihrer Meinung nach die Berufstätigkeit von Müttern auf die Erziehung der Kinder aus?**

- 1 - ausgesprochen günstig  
 2 - eher günstig als ungünstig  
 3 - weder günstig noch ungünstig (kein Einfluß)  
 4 - eher ungünstig als günstig  
 5 - ausgesprochen ungünstig

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	39	27.3	34	24.3	73	25.8
2	73	51.0	68	48.6	141	49.8
3	11	7.7	15	10.7	26	9.2
4	16	11.2	22	15.7	38	13.4
5	4	2.8	1	.7	5	1.8
missing	3		8		11	

**ERZIEH2: Glauben Sie auf Grund Ihrer gesamten gegenwärtigen Lebenssituation, daß Sie als Mutter Ihren Kindern so gerecht werden, wie Sie es für die Erziehung der Kinder für nötig halten?**

- 1 - werde meinen Kindern vollauf gerecht  
 2 - werde meinen Kindern im großen und ganzen gerecht  
 3 - werde meinen Kindern kaum ausreichend gerecht  
 4 - werde meinen Kindern nicht gerecht

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	87	62.1	83	59.3	170	60.7
2	52	37.1	55	39.3	107	38.2
3	1	.7	2	1.4	3	1.1
missing	6		8		14	

**AUSKIWU: Wie wirkt sich Ihrer Meinung nach die Berufstätigkeit während der Ehe auf den Kinderwunsch aus, den man zum Zeitpunkt der Eheschließung hatte?**

- 1 - kein Einfluß  
 2 - Kinderzahl wird kleiner gehalten, als zum Zeitpunkt der Heirat erwünscht  
 3 - Kinderzahl wird größer gehalten, als zum Zeitpunkt der Heirat erwünscht

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	96	71.1	94	71.8	190	71.4
2	39	28.9	37	28.2	76	28.6
missing	11		17		28	

**BERANERK: Die Anerkennung durch den Ehepartner ist bei der berufstätigen Mutter:**

- 1 - besser als bei der Hausfrau  
 2 - gleich  
 3 - schlechter als bei der Hausfrau

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	96	72.2	103	79.2	199	75.7
2	35	26.3	25	19.2	60	22.8
3	2	1.5	2	1.5	4	1.5
missing	13		18		31	

**BERERZKI: Die Erziehung der Kinder im Hinblick auf die geistige Leistungsfähigkeit in Kindergarten, Schule und Beruf ist im Falle der Berufstätigkeit der Mutter:**

- 1 - besser als bei Nichtberufstätigkeit der Mutter  
 2 - gleich  
 3 - schlechter als bei Nichtberufstätigkeit der Mutter

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	87	67.4	90	67.2	177	67.3
2	28	21.7	35	26.1	63	24.0
3	14	10.9	9	6.7	23	8.7
missing	17		14		31	





**KIWU1GR: Grund für den jetzigen weiteren Kinderwunsch (zuerst genannt):**

- 1 - ich möchte kein Einzelkind (Erziehung und Entwicklung ist günstiger, wenn Geschwister vorhanden sind)
- 2 - um ein günstigeres Verhältnis von Jungen und Mädchen zu haben
- 3 - weil ein Kind vorhanden ist, das sich nicht normal entwickelt
- 4 - um die Harmonie in der Ehe zu festigen oder zu vertiefen
- 5 - weil ein Kind vorhanden ist, das Erziehungsschwierigkeiten bereitet
- 6 - um im Alter nicht so einsam zu sein
- 7 - ich füge mich dem Wunsch des Ehepartners
- 8 - sonstige Gründe
- 9 - kein weiterer Kinderwunsch

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	31	21.5	39	26.7	70	24.1
2	1	.7	1	.7	2	.7
4	1	.7	1	.7	2	.7
8	1	.7	2	1.4	3	1.0
9	110	76.4	103	70.5	213	73.4
missing	2		2		4	

**KIWU2GR: Grund für den jetzigen weiteren Kinderwunsch (als zweites genannt):**

- 1 - ich möchte kein Einzelkind (Erziehung und Entwicklung ist günstiger, wenn Geschwister vorhanden sind)
- 2 - um ein günstigeres Verhältnis von Jungen und Mädchen zu haben
- 3 - weil ein Kind vorhanden ist, das sich nicht normal entwickelt
- 4 - um die Harmonie in der Ehe zu festigen oder zu vertiefen
- 5 - weil ein Kind vorhanden ist, das Erziehungsschwierigkeiten bereitet
- 6 - um im Alter nicht so einsam zu sein
- 7 - ich füge mich dem Wunsch des Ehepartners
- 8 - sonstige Gründe

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	2	18.2	1	6.3	3	11.1
2	3	27.3	3	18.8	6	22.2
4	3	27.3	7	43.8	10	37.0
6	1	9.1	2	12.5	3	11.1
7			1	6.3	1	3.7
8	2	18.2	2	12.5	4	14.8

missing	135		132		267	
---------	-----	--	-----	--	-----	--

**KEIWU1GR: Aus welchem Grund wünschen Sie sich keine weiteren Kinder? (zuerst genannt)**

- 1 - weil ich ein erziehungsschwieriges Kind habe
- 2 - weil ein Kind vorhanden ist, das sich nicht normal entwickelt
- 3 - weil meine Ehe schwierig ist
- 4 - ich möchte meine bisherigen Lebensgewohnheiten nicht verändern
- 5 - aus Altersgründen der Ehepartner
- 6 - Furcht vor der Geburt eines nicht normalen Kindes
- 7 - wegen meines gesundheitlichen Zustandes
- 8 - Angst vor schwieriger Entbindung
- 9 - ich füge mich dem Wunsch meines Mannes
- 10 - die Kinder wären altersmäßig zu weit auseinander
- 11 - die vorhandene Kinderzahl reicht
- 12 - sonstige Gründe
- 13 - Kinder gewünscht

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	3	2.1			3	1.0
4			1	.7	1	.3
5	3	2.1	6	4.1	9	3.1
7	12	8.5	6	4.1	18	6.3
8			2	1.4	2	.7
9	3	2.1	2	1.4	5	1.7
10	1	.7			1	.3
11	66	46.8	76	52.4	142	49.7
12	19	13.5	9	6.2	28	9.8
13	34	24.1	43	29.7	77	26.9
missing	5		3		8	

**KEIWU2GR: Aus welchem Grund wünschen Sie sich keine weiteren Kinder? (als zweites genannt)**

- 1 - weil ich ein erziehungsschwieriges Kind habe
- 2 - weil ein Kind vorhanden ist, das sich nicht normal entwickelt
- 3 - weil meine Ehe schwierig ist
- 4 - ich möchte meine bisherigen Lebensgewohnheiten nicht verändern
- 5 - aus Altersgründen der Ehepartner
- 6 - Furcht vor der Geburt eines nicht normalen Kindes
- 7 - wegen meines gesundheitlichen Zustandes
- 8 - Angst vor schwieriger Entbindung
- 9 - ich füge mich dem Wunsch meines Mannes
- 10 - die Kinder wären altersmäßig zu weit auseinander
- 11 - die vorhandene Kinderzahl reicht
- 12 - sonstige Gründe

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
2	1	4.5			1	2.1
4	1	4.5	2	8.0	3	6.4
5	3	13.6	1	4.0	4	8.5
7	3	13.6	2	8.0	5	10.6
8	1	4.5	1	4.0	2	4.3
9			3	12.0	3	6.4
10			1	4.0	1	2.1
11	5	22.7	1	4.0	6	12.8
12	8	36.4	14	56.0	22	46.8
missing	124		123		247	

**KIWUE1GR: Grund für den Kinderwunsch zum Zeitpunkt der Heirat  
(zuerst genannt):**

- 1 - das Eheglück ist mit Kindern größer
- 2 - ich möchte im Alter nicht einsam sein
- 3 - Kind als gesellschaftliche Aufgabe (Einsicht in bevölkerungspolitische Notwendigkeit)
- 4 - Kinder sind mir als Frau unbedingtes Bedürfnis
- 5 - sonstige Gründe
- 6 - unverheiratet
- 7 - kein Kind gewünscht

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	105	78.4	112	81.2	217	79.8
2	3	2.2	3	2.2	6	2.2
4	14	10.4	8	5.8	22	8.1
5	1	.7	1	.7	2	.7
6	10	7.5	12	8.7	22	8.1
7	1	.7	2	1.4	3	1.1
missing	12		10		22	

**KIWUE2GR: Grund für den Kinderwunsch zum Zeitpunkt der Heirat  
(als zweites genannt):**

- 1 - das Eheglück ist mit Kindern größer
- 2 - ich möchte im Alter nicht einsam sein
- 3 - Kind als gesellschaftliche Aufgabe (Einsicht in bevölkerungspolitische Notwendigkeit)
- 4 - Kinder sind mir als Frau unbedingtes Bedürfnis
- 5 - sonstige Gründe
- 6 - unverheiratet
- 7 - kein Kind gewünscht

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	4	10.0	2	4.4	6	7.1
2	10	25.0	7	15.6	17	20.0
3	1	2.5	3	6.7	4	4.7
4	23	57.5	31	68.9	54	63.5
5	2	5.0	2	4.4	4	4.7
missing	106		103		209	

Die Angaben stammen i.d.R von der Mutter (vgl. ANAMANG).

### SCHVA2: Schulabschluß des Vaters

Da das Alter der Väter breit streut (19 - 60 Jahre); gibt es einige, die den 8-Klassen-Abschluß als Regelabschluß machten. Insofern wird die Aussagefähigkeit der Schulabschluß-Variable durch historische Besonderheiten der DDR-Anfangszeit eingeschränkt.

- 1 - Normalschule noch nicht abgeschlossen
- 2 - Hilfsschule noch nicht abgeschlossen
- 3 - ehemaliger Hilfsschüler
- 4 - ehemaliger Normalschüler ohne Abschluß der 8. Klasse
- 5 - Abschluß der 8. oder 9. Klasse
- 6 - Abschluß der 10. oder 11. Klasse
- 7 - Abschluß der 12. Klasse mit Abitur

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
4	5	3.7	2	1.4	7	2.6
5	60	44.1	62	44.9	122	44.5
6	37	27.2	46	33.3	83	30.3
7	34	25.0	28	20.3	62	22.6
missing	10		10		20	

### BVA2: Erlerner Beruf des Vaters

- 1 - Schüler
- 2 - Student (auch Fachschule)
- 3 - Lehrling
- 4 - ohne erlernten Beruf
- 5 - Teilfacharbeiterbrief
- 6 - Facharbeiterbrief
- 7 - Fachschulabschluß
- 8 - Hochschulabschluß
- 9 - Armeedienst nach Abitur

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
2	3	2.1	6	4.4	9	3.2
4	5	3.6			5	1.8
5	3	2.1	4	2.9	7	2.5
6	85	60.7	80	58.4	165	59.6
7	22	15.7	29	21.2	51	18.4
8	22	15.7	18	13.1	40	14.4

missing	6		11		17	
---------	---	--	----	--	----	--

**BERUFVA2: Berufstätigkeit des Vaters**

- 1 - zur Zeit nicht berufstätig (wegen längerer Krankheit, Rentner)  
 2 - teilbeschäftigt, ohne Schichtarbeit  
 3 - teilbeschäftigt, mit Schichtarbeit  
 4 - vollbeschäftigt, ohne Schichtarbeit (auch Studium)  
 5 - vollbeschäftigt, 2 Schichten  
 6 - vollbeschäftigt, 3 Schichten  
 7 - zur Zeit Armeedienst  
 8 - zur Zeit Inhaftierung bzw. Unterbringung  
 99 - kein Vater in der Familie, (Stiefvater wird eingetragen)

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	1	.7	1	.7	2	.7
4	91	62.3	98	66.7	189	64.5
5	8	5.5	13	8.8	21	7.2
6	15	10.3	14	9.5	29	9.9
7	7	4.8	6	4.1	13	4.4
99	24	16.4	15	10.2	39	13.3
missing			1		1	

**TVA2: Zur Zeit ausgeübte Tätigkeit des Vaters**

- 1 - Arbeiter in ungelernter Tätigkeit, im Anlern- oder Teillehrverhältnis  
 2 - Tätigkeit mit Facharbeiterabschluß  
 3 - nicht leitender Angestellter ohne Fach- bzw. Hochschulabschluß  
 4 - nicht leitender Angestellter mit Fach- bzw. Hochschulabschluß  
 5 - leitender Angestellter  
 6 - Freischaffender und Gewerbetreibender  
 7 - Renten- und Sozialfürsorgeempfänger  
 8 - noch in Ausbildung befindlich; Schüler, Lehrling, Student bzw. bei der NVA  
 99 - kein Vater in der Familie (Stiefvater wird eingetragen)

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	6	4.1	8	5.4	14	4.8
2	63	43.4	62	42.2	125	42.8
3	2	1.4	7	4.8	9	3.1
4	34	23.4	36	24.5	70	24.0
5	7	4.8	8	5.4	15	5.1
7			1	.7	1	.3
8	10	6.9	10	6.8	20	6.8
99	23	15.9	15	10.2	38	13.0



missing	1		1		2	
---------	---	--	---	--	---	--

### GESUNV2: Gesundheitszustand des Vaters in den letzten 3 Jahren nach Angaben der Mutter

- 1 - unbeeinträchtigt, voll belastbar
- 2 - eingeschränkt, nicht voll belastbar
- 3 - eingeschränkt, Schwerbeschädigtenausweis
- 4 - eingeschränkt, Teilrentner
- 5 - eingeschränkt, Invalide
- 99 - Vater lebt nicht im Haushalt

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	113	79.0	121	84.0	234	81.5
2	8	5.6	5	3.5	13	4.5
3			2	1.4	2	.7
5			1	.7	1	.3
99	22	15.4	15	10.4	37	12.9
missing	3		4		7	

### PSYCHV2: Psychiatrische Erkrankungen des Vaters, unabhängig vom Zeitpunkt des Auftretens

- 1 - keine
- 2 - Psychose
- 3 - cerebrale Krampfanfälle
- 4 - 2 + 3
- 5 - Suizidversuch, Suizid (ohne Psychose)
- 6 - 3 + 5
- 7 - wegen psychischer Störungen außer o.g. in nervenärztlicher Behandlung gewesen,  
bzw. steht noch in Behandlung
- 99 - kein Vater in der Familie

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	119	81.5	128	87.7	247	84.6
2			1	.7	1	.3
3	2	1.4			2	.7
7	2	1.4	2	1.4	4	1.4
99	23	15.8	15	10.3	38	13.0
missing			2		2	

**ALKOHV2: Alkoholismus des Vaters**

- 1 - kein  
 2 - 1-2 mal pro Woche betrunken, ruhig  
 3 - 1-2 mal pro Woche betrunken, laut und aggressiv  
 4 - 3 mal und mehr pro Woche betrunken, ruhig  
 5 - 3 mal und mehr pro Woche betrunken, laut und aggressiv  
 6 - Quartalstrinker  
 99 - kein Vater in der Familie

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	120	83.3	128	87.7	248	85.5
2	1	.7	3	2.1	4	1.4
99	23	16.0	15	10.3	38	13.1
missing	2		2		4	

**PSYSYNVA: Chronisch - hirnorganisches Psychosyndrom**

- 1 - nein  
 2 - ja  
 99 - kein Vater in der Familie

Anmerkung:

Erklärung: nach Unfall, entzündlichen Erkrankungen des ZNS, Hirntumoroperationen  
 u. a. deutlich reizbar, ungesteuert, vermindert belastbar, schwunglos

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	118	81.9	127	88.8	245	85.4
2	3	2.1	1	.7	4	1.4
99	23	16.0	15	10.5	38	13.2
missing	2		5		7	

**KG2: Körperlicher Gesamteindruck**

- 1 - altersgerecht
- 2 - retardiert
- 3 - akzeleriert
- 4 - dysplastisch

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	110	75.9	93	62.8	203	69.3
2	16	11.0	42	28.4	58	19.8
3	9	6.2	5	3.4	14	4.8
4	10	6.9	8	5.4	18	6.1
missing	1				1	

**KRYPT2: Kryptorchismus**

- 1 - normal
- 2 - Kryptorchismus rechts
- 3 - Kryptorchismus links
- 4 - Kryptorchismus beidseits
- 5 - kein Junge

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	79	62.2			79	28.7
2	6	4.7			6	2.2
3	3	2.4			3	1.1
4	39	30.7			39	14.2
5			148	100.0	148	53.8
missing	19				19	

**AUGEN2: Sinnesorgane - Augen**

- 1 - Sehvermögen unauffällig
- 2 - Sehminderung (vom Facharzt bereits festgestellt)
- 3 - Blindheit

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	146	100.0	148	100.0	294	100.0

**OHREN2: Sinnesorgane - Ohren**

- 1 - Hörvermögen intakt  
 2 - Hörminderung (vom Facharzt bereits festgestellt)  
 3 - Taubheit beidseits

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	142	98.6	148	100.0	290	99.3
2	2	1.4			2	.7
missing	2				2	

**ZAHNZA: Zahl der vorhandenen Zähne (zum Zeitpunkt der Untersuchung)**

- 1 - unter 2  
 2 - 2 - 4  
 3 - 5 - 7  
 4 - 8 - 10  
 5 - 11 - 13  
 6 - 14 - 16  
 7 - 17 - 19  
 8 - 20 und mehr

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1			1	.7	1	.4
5			1	.7	1	.4
6	15	10.5	13	9.2	28	9.9
7	79	55.2	90	63.8	169	59.5
8	49	34.3	36	25.5	85	29.9
missing	3		7		10	

Die quartalsmäßigen Messungen von Körperlänge und -gewicht stammen aus den Entwicklungsbögen, die obligatorisch in den Krippen geführt wurden.

**GR1Q: Körpergröße in cm - 1. Quartal**

	Mittelwert	St.abweichng	Minimum	Maximum	Anzahl
männlich	62.11	3.23	58	68	27
weiblich	60.35	2.13	57	64	34
gesamt	61.13	2.79	57	68	61



**GR2Q: Körpergröße in cm - 2. Quartal**

	Mittelwert	St.abweichng	Minimum	Maximum	Anzahl
männlich	67.96	2.90	60	74	68
weiblich	66.60	3.13	60	74	78
gesamt	67.23	3.09	60	74	146

**GR3Q: Körpergröße in cm - 3. Quartal**

	Mittelwert	St.abweichng	Minimum	Maximum	Anzahl
männlich	71.62	3.12	63	79	80
weiblich	70.70	2.79	65	79	87
gesamt	71.14	2.98	63	79	167

**GR4Q: Körpergröße in cm - 4. Quartal**

	Mittelwert	St.abweichng	Minimum	Maximum	Anzahl
männlich	75.06	3.22	69	85	90
weiblich	73.33	3.24	66	84	104
gesamt	74.13	3.34	66	85	194

**GR5Q: Körpergröße in cm - 5. Quartal**

	Mittelwert	St.abweichng	Minimum	Maximum	Anzahl
männlich	77.63	3.12	70	86	104
weiblich	76.47	3.59	69	88	113
gesamt	77.02	3.41	69	88	217

**GR6Q: Körpergröße in cm - 6. Quartal**

	Mittelwert	St.abweichng	Minimum	Maximum	Anzahl
männlich	80.63	3.27	71	87	120
weiblich	79.57	3.86	71	89	121
gesamt	80.10	3.61	71	89	241

**GR7Q: Körpergröße in cm - 7. Quartal**

	Mittelwert	St.abweichng	Minimum	Maximum	Anzahl
männlich	84.03	3.49	75	95	126
weiblich	82.12	3.56	74	90	130
gesamt	83.06	3.65	74	95	256

**GR2: Körpergröße in cm**

	Mittelwert	St.abweichng	Minimum	Maximum	Anzahl
männlich	86.75	3.34	79	95	122
weiblich	85.08	3.93	76	96	126
gesamt	85.90	3.74	76	96	248

**GEW1Q: Körpergewicht in kg - 1. Quartal**

	Mittelwert	St.abweichng	Minimum	Maximum	Anzahl
männlich	6.20	.62	4.8	7.5	27
weiblich	5.86	.53	4.8	6.8	34
gesamt	6.01	.59	4.8	7.5	61

**GEW2Q: Körpergewicht in kg - 2. Quartal**

	Mittelwert	St.abweichng	Minimum	Maximum	Anzahl
männlich	7.74	.81	5.9	10.7	71
weiblich	7.26	.74	5.5	9.9	78
gesamt	7.49	.81	5.5	10.7	149

**GEW3Q: Körpergewicht in kg - 3. Quartal**

	Mittelwert	St.abweichng	Minimum	Maximum	Anzahl
männlich	8.83	.99	6.9	13.0	83
weiblich	8.44	.86	6.9	10.7	88
gesamt	8.63	.94	6.9	13.0	171



**GEW4Q: Körpergewicht in kg - 4. Quartal**

	Mittelwert	St.abweichng	Minimum	Maximum	Anzahl
männlich	9.74	.94	7.6	12.0	91
weiblich	9.23	.99	7.0	11.3	104
gesamt	9.47	1.00	7.0	12.0	195

**GEW5Q: Körpergewicht in kg - 5. Quartal**

	Mittelwert	St.abweichng	Minimum	Maximum	Anzahl
männlich	10.69	1.09	8.1	14.0	102
weiblich	10.06	1.04	7.4	12.1	113
gesamt	10.36	1.10	7.4	14.0	215

**GEW6Q: Körpergewicht in kg - 6. Quartal**

	Mittelwert	St.abweichng	Minimum	Maximum	Anzahl
männlich	11.64	1.30	9.0	19.4	119
weiblich	10.90	1.18	7.7	14.5	120
gesamt	11.27	1.29	7.7	19.4	239

**GEW7Q: Körpergewicht in kg - 7. Quartal**

	Mittelwert	St.abweichng	Minimum	Maximum	Anzahl
männlich	12.33	1.20	9.5	17.6	126
weiblich	11.55	1.35	8.1	15.0	131
gesamt	11.93	1.34	8.1	17.6	257

**GEW2: Körpergewicht in kg**

	Mittelwert	St.abweichng	Minimum	Maximum	Anzahl
männlich	13.07	1.30	10.0	18.5	122
weiblich	12.33	1.51	8.8	17.9	127
gesamt	12.69	1.45	8.8	18.5	249

**SCHAED2: Kopfumfang in cm**

JUNGEN

MÄDCHEN

46,0 und weniger	- 1 -	44,1 und weniger
46,1 bis 47,2	- 2 -	44,2 bis 45,4
47,3 bis 48,4	- 3 -	45,5 bis 46,8
48,5 bis 49,6	- 4 -	46,9 bis 48,2
49,7 bis 50,8	- 5 -	48,3 bis 49,6
50,9 bis 52,0	- 6 -	49,7 bis 51,0
52,1 bis 53,2	- 7 -	51,1 bis 52,4
53,3 bis 54,4	- 8 -	52,5 bis 53,8
54,5 und mehr	- 9 -	53,9 und mehr

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	2	1.4			2	.7
2	1	.7			1	.3
3	1	.7	3	2.0	4	1.4
4	46	31.5	64	43.2	110	37.4
5	58	39.7	63	42.6	121	41.2
6	32	21.9	15	10.1	47	16.0
7	5	3.4	3	2.0	8	2.7
8	1	.7			1	.3

**MISSKO2: Mißbildungen (Kopf und Wirbelsäule)**

- 1 - keine
- 2 - Mikrocephalus
- 3 - Lippen-Kiefer-Gaumenspalte
- 4 - 2 + 3
- 5 - Makrocephalus
- 6 - 3 + 5
- 7 - Meningo bzw. Meningozystocele / Meningomyelocele
- 8 - 2 + 3 + 7
- 9 - 3 + 5 + 7 und andere nicht genannte Mißbildungen an Kopf und Wirbelsäule

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	144	99.3	144	98.0	288	98.6
3			1	.7	1	.3
9	1	.7	2	1.4	3	1.0
missing	1		1		2	

**MISS2: Andere Mißbildungen**

1 - keine

2 - Fuß- und Wirbelsäulendeformitäten, Vielfingrigkeit, Vielzelligkeit

3 - Trichterbrust

4 - 2 + 3

5 - Hüftgelenksluxation

6 - 2 + 5

7 - 3 + 5

8 - 2 + 3 + 5

9 - andere nicht genannte Mißbildungen

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	134	91.8	142	95.9	276	93.9
2			1	.7	1	.3
5	3	2.1	1	.7	4	1.4
9	9	6.2	4	2.7	13	4.4

Die neurologische Untersuchung wurde um den 2. Geburtstag in der Kinderkrippe durchgeführt (Fr. Dr. Heider). Sie umfaßte Erhebungen wie Augenfehler, Paresen, Hirnnerven (zentral), Muskeltonus, Reflexe, Pyramidenbahnzeichen, Athetosen, Sensibilität und Greifreaktion und wird an diesem Ort nur als Sammelspalte dokumentiert.

**NEUROL2: Sammelspalte Neurologische Störungen**

- 1 - keine neurologischen Ausfälle
- 2 - diskrete Abweichungen von der Norm
- 3 - eindeutig pathologischer Befund

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	130	89.7	133	91.1	263	90.4
2	15	10.3	12	8.2	27	9.3
3			1	.7	1	.3
missing	1		2		3	

**2 JAHRE****ERZIEHUNGSEINSTELLUNGSFRAGEBOGEN**

1 -Das ist auch meine Meinung/ 2 - So unbedingt möchte ich das nicht sagen/ 3 - Dieser Meinung bin ich nicht

Der Erziehungseinstellungsfragebogen EEFB (Littmann, Kasielke, 1970) umfaßt 53 Items, die Erziehungseinstellungen auf 9 intuitiv erstellten Teilskalen und 2 faktorenanalytisch begründeten Globalskalen abbilden.

Polung: hohe C-Werte = negative Merkmalsausprägung

Der Fragebogen wurde den Müttern in den Krippen ausgehändigt und vor Ort in Anwesenheit der Untersucherin (Dr.Heider) ausgefüllt.

Die Mütter haben den EEFB im Alter der Kinder von 2, 6 und 10 Jahren beantwortet.

**EEFB201: Die Eltern müßten öfter über die Ungezogenheiten ihrer Kinder hinwegsehen können!**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	27	18.6	24	16.7	51	17.6
2	35	24.1	45	31.3	80	27.7
3	83	57.2	75	52.1	158	54.7
missing	1		4		5	

**EEFB202: Eltern sollten ihrem Kind gegenüber öfter nachgeben können!**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	28	19.2	23	16.4	51	17.8
2	48	32.9	53	37.9	101	35.3
3	70	47.9	64	45.7	134	46.9
missing			8		8	

**EEFB203: Viele Eltern können sich einfach aus Zeitmangel nicht genügend um ihre Kinder kümmern!**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	49	34.0	39	27.3	88	30.7
2	16	11.1	31	21.7	47	16.4
3	79	54.9	73	51.0	152	53.0
missing	2		5		7	

**2 JAHRE****ERZIEHUNGSEINSTELLUNGSFRAGEBOGEN**

1 -Das ist auch meine Meinung/ 2 - So unbedingt möchte ich das nicht sagen/ 3 - Dieser Meinung bin ich nicht

**EEFB204: Auch ein älteres Kind darf nichts ohne das Wissen seiner Eltern tun.**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	94	64.8	84	57.5	178	61.2
2	32	22.1	33	22.6	65	22.3
3	19	13.1	29	19.9	48	16.5
missing	1		2		3	

**EEFB205: Alle Kinder können mitunter zu einer großen Belastung für ihre Eltern werden!**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	20	13.7	18	12.3	38	13.0
2	26	17.8	31	21.2	57	19.5
3	100	68.5	97	66.4	197	67.5
missing			2		2	

**EEFB206: Es kann nicht schaden, wenn man eine Bestrafung des Kindes gelegentlich rückgängig macht.**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	46	31.7	50	34.5	96	33.1
2	28	19.3	24	16.6	52	17.9
3	71	49.0	71	49.0	142	49.0
missing	1		3		4	

**EEFB207: Kinder, die dauernd etwas zu fragen haben, können ihren Eltern manchmal ganz schön auf die Nerven gehen!**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	21	14.5	23	15.9	44	15.2
2	34	23.4	33	22.8	67	23.1
3	90	62.1	89	61.4	179	61.7
missing	1		3		4	

**2 JAHRE****ERZIEHUNGSEINSTELLUNGSFRAGEBOGEN**

1 -Das ist auch meine Meinung/ 2 - So unbedingt möchte ich das nicht sagen/ 3 - Dieser Meinung bin ich nicht

**EEFB208: Eltern müssen bei Kindern schon geringste körperliche Beschwerden sehr ernst nehmen, da oft gefährliche Krankheiten dahinterstecken!**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	96	65.8	80	54.8	176	60.3
2	25	17.1	38	26.0	63	21.6
3	25	17.1	28	19.2	53	18.2
missing			2		2	

**EEFB209: Eine Mutter kommt aus Angst, daß ihrem Kind etwas zustoßen könnte, nie richtig zur Ruhe!**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	27	18.5	35	24.1	62	21.3
2	33	22.6	25	17.2	58	19.9
3	86	58.9	85	58.6	171	58.8
missing			3		3	

**EEFB210: Eltern sollten sich mit ihrem Kind nicht allzuviel abgeben, sonst wird das Kind nie selbständig.**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	15	10.3	19	13.2	34	11.7
2	35	24.0	33	22.9	68	23.4
3	96	65.8	92	63.9	188	64.8
missing			4		4	

**EEFB211: Eltern müssen rigoros ihre Forderungen gegenüber dem Kind durchsetzen, wenn sie nicht wollen, daß es ihnen auf dem Kopf herumtanzt.**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	58	40.0	52	35.9	110	37.9
2	38	26.2	49	33.8	87	30.0

3	49	33.8	44	30.3	93	32.1
missing	1		3		4	



**2 JAHRE****ERZIEHUNGSEINSTELLUNGSFRAGEBOGEN**

1 -Das ist auch meine Meinung/ 2 - So unbedingt möchte ich das nicht sagen/ 3 - Dieser Meinung bin ich nicht

**EEFB212: Gelegentliche Schläge für das Kind sind bei der Erziehung nicht zu vermeiden.**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	76	52.1	78	53.8	154	52.9
2	45	30.8	43	29.7	88	30.2
3	25	17.1	24	16.6	49	16.8
missing			3		3	

**EEFB213: Mit ihrem Kind kann eine Mutter gar nicht oft genug zum Arzt gehen!**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	19	13.1	34	23.3	53	18.2
2	37	25.5	34	23.3	71	24.4
3	89	61.4	78	53.4	167	57.4
missing	1		2		3	

**EEFB214: Mit Kindern müssen Eltern immer nachsichtig verfahren!**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	22	15.3	22	15.5	44	15.4
2	39	27.1	39	27.5	78	27.3
3	83	57.6	81	57.0	164	57.3
missing	2		6		8	

**EEFB215: Kinder sollten sich dem Willen der Eltern in jedem Falle widerspruchslos fügen!**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	28	19.2	37	25.5	65	22.3
2	58	39.7	51	35.2	109	37.5
3	60	41.1	57	39.3	117	40.2
missing			3		3	

**2 JAHRE****ERZIEHUNGSEINSTELLUNGSFRAGEBOGEN**

1 -Das ist auch meine Meinung/ 2 - So unbedingt möchte ich das nicht sagen/ 3 - Dieser Meinung bin ich nicht

**EEFB216: Ein Kind sollte davor bewahrt bleiben, über geschlechtliche Dinge reden zu hören!**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	15	10.4	12	8.2	27	9.3
2	29	20.1	38	26.0	67	23.1
3	100	69.4	96	65.8	196	67.6
missing	2		2		4	

**EEFB217: Alle Unarten der Kinder müssen von den Eltern hart und rigoros bestraft werden, damit sie nicht zur Gewohnheit werden!**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	15	10.3	23	15.9	38	13.1
2	35	24.0	37	25.5	72	24.7
3	96	65.8	85	58.6	181	62.2
missing			3		3	

**EEFB218: Eltern haben die Verpflichtung, ihrem Kind möglichst alle Wünsche zu erfüllen!**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	8	5.5	8	5.5	16	5.5
2	28	19.2	22	15.1	50	17.1
3	110	75.3	116	79.5	226	77.4
missing			2		2	

**EEFB219: Kinder zu haben ist nicht immer nur eine Freude!**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	36	25.4	25	17.6	61	21.5
2	39	27.5	35	24.6	74	26.1
3	67	47.2	82	57.7	149	52.5
missing	4		6		10	

**2 JAHRE****ERZIEHUNGSEINSTELLUNGSFRAGEBOGEN**

1 -Das ist auch meine Meinung/ 2 - So unbedingt möchte ich das nicht sagen/ 3 - Dieser Meinung bin ich nicht

**EEFB220: Kinder sollten mit ihren geringfügigen Sorgen und Nöten nicht immer die Eltern belasten, sondern lernen, selbst damit fertig zu werden.**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	31	21.4	33	22.9	64	22.1
2	33	22.8	32	22.2	65	22.5
3	81	55.9	79	54.9	160	55.4
missing	1		4		5	

**EEFB221: Auch ältere Kinder dürfen von ihren Eltern nicht aus den Augen gelassen werden!**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	52	36.1	49	33.6	101	34.8
2	37	25.7	37	25.3	74	25.5
3	55	38.2	60	41.1	115	39.7
missing	2		2		4	

**EEFB222: Wenn man in schlechter Stimmung ist, ist man manchmal etwas unbeherrscht gegenüber seinem Kind.**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	90	62.1	81	55.9	171	59.0
2	24	16.6	26	17.9	50	17.2
3	31	21.4	38	26.2	69	23.8
missing	1		3		4	

**EEFB223: Gelegentlich wachsen einem als Mutter die Sorgen und Probleme mit dem Kind einfach über den Kopf!**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	29	20.3	31	21.4	60	20.8
2	40	28.0	33	22.8	73	25.3
3	74	51.7	81	55.9	155	53.8
missing	3		3		6	



**2 JAHRE****ERZIEHUNGSEINSTELLUNGSFRAGEBOGEN**

1 -Das ist auch meine Meinung/ 2 - So unbedingt möchte ich das nicht sagen/ 3 - Dieser Meinung bin ich nicht

**EEFB224: Man müsste als Mutter viel öfter den Mut haben, sein Kind härter anzupacken!**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	38	26.4	42	29.0	80	27.7
2	42	29.2	30	20.7	72	24.9
3	64	44.4	73	50.3	137	47.4
missing	2		3		5	

**EEFB225: Eine leichte Ohrfeige oder ein Klaps ist immer noch das beste Mittel, um ein ungehorsames Kind zur Vernunft zu bringen!**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	32	22.1	27	18.6	59	20.3
2	40	27.6	44	30.3	84	29.0
3	73	50.3	74	51.0	147	50.7
missing	1		3		4	

**EEFB226: Mit einem ungezogenen Kind sollte eine Mutter nicht lange fackeln!**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	26	18.2	27	18.8	53	18.5
2	37	25.9	33	22.9	70	24.4
3	80	55.9	84	58.3	164	57.1
missing	3		4		7	

**EEFB227: Oft gelingt es einem als Mutter nicht, eine Bestrafung des Kindes konsequent für längere Zeit durchzuhalten.**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	64	45.4	61	41.8	125	43.6
2	26	18.4	33	22.6	59	20.6
3	51	36.2	52	35.6	103	35.9
missing	5		2		7	



**2 JAHRE****ERZIEHUNGSEINSTELLUNGSFRAGEBOGEN**

1 -Das ist auch meine Meinung/ 2 - So unbedingt möchte ich das nicht sagen/ 3 - Dieser Meinung bin ich nicht

**EEFB228: Die Erziehung jüngerer sollte mehr vom Kindergarten übernommen werden, da sich dort die Kinder die längste Zeit des Tages befinden.**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	10	6.9	12	8.3	22	7.6
2	28	19.3	32	22.2	60	20.8
3	107	73.8	100	69.4	207	71.6
missing	1		4		5	

**EEFB229: Man darf einem Kind nicht allzuviel Freiheit lassen, sonst wächst es einem über den Kopf!**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	33	22.6	33	22.6	66	22.6
2	55	37.7	46	31.5	101	34.6
3	58	39.7	67	45.9	125	42.8
missing			2		2	

**EEFB230: Eltern sollten sich bemühen, ihre Kinder vor den vielen kleinen Schwierigkeiten des Lebens zu bewahren!**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	22	15.2	24	16.4	46	15.8
2	32	22.1	23	15.8	55	18.9
3	91	62.8	99	67.8	190	65.3
missing	1		2		3	

**EEFB231: Jedes Kind wird später für eine harte und strenge Erziehung dankbar sein!**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	26	18.1	37	25.3	63	21.7
2	50	34.7	30	20.5	80	27.6
3	68	47.2	79	54.1	147	50.7
missing	2		2		4	





**2 JAHRE****ERZIEHUNGSEINSTELLUNGSFRAGEBOGEN**

1 -Das ist auch meine Meinung/ 2 - So unbedingt möchte ich das nicht sagen/ 3 - Dieser Meinung bin ich nicht

**EEFB232: Alle Kinder gehen ihren Eltern auf die Nerven, wenn sie sie den ganzen Tag um sich haben müssen.**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	9	6.3	9	6.2	18	6.2
2	32	22.2	27	18.6	59	20.4
3	103	71.5	109	75.2	212	73.4
missing	2		3		5	

**EEFB233: Eltern sollten immer alles wissen, was ihre Kinder denken und was in ihnen vorgeht.**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	72	49.3	76	52.1	148	50.7
2	35	24.0	40	27.4	75	25.7
3	39	26.7	30	20.5	69	23.6
missing			2		2	

**EEFB234: Eltern dürfen ihre Kinder nie vor Enttäuschungen bewahren, damit sie sich früh an die Härte des Lebens gewöhnen!**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	33	22.8	43	30.1	76	26.4
2	62	42.8	40	28.0	102	35.4
3	50	34.5	60	42.0	110	38.2
missing	1		5		6	

**EEFB235: Ein richtiges Kind benötigt ab und zu eine Tracht Prügel!**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	23	16.0	26	17.8	49	16.9
2	33	22.9	22	15.1	55	19.0
3	88	61.1	98	67.1	186	64.1
missing	2		2		4	

**2 JAHRE****ERZIEHUNGSEINSTELLUNGSFRAGEBOGEN**

1 -Das ist auch meine Meinung/ 2 - So unbedingt möchte ich das nicht sagen/ 3 - Dieser Meinung bin ich nicht

**EEFB236: Von einer Mutter sollte man nicht immer erwarten, daß sie ihr eigenes Lebensglück für das Glück ihrer Kinder opfert!**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	25	19.7	30	22.1	55	20.9
2	50	39.4	68	50.0	118	44.9
3	52	40.9	38	27.9	90	34.2
missing	19		12		31	

**EEFB237: Eine milde und nachsichtige Erziehung der Kinder ist die einzig richtige!**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	23	15.8	23	15.9	46	15.8
2	44	30.1	42	29.0	86	29.6
3	79	54.1	80	55.2	159	54.6
missing			3		3	

**EEFB238: Kinder haben immer das Bedürfnis, verzärtelt und verwöhnt zu werden!**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	61	41.8	69	47.3	130	44.5
2	42	28.8	33	22.6	75	25.7
3	43	29.5	44	30.1	87	29.8
missing			2		2	

**EEFB239: Kinder müssen immer für eine Unart bestraft werden, auch wenn sie sie mal bei ihren Eltern gesehen haben.**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	8	5.6	15	10.4	23	8.0
2	46	31.9	38	26.4	84	29.2
3	90	62.5	91	63.2	181	62.8

missing	2		4		6	
---------	---	--	---	--	---	--

**2 JAHRE****ERZIEHUNGSEINSTELLUNGSFRAGEBOGEN**

1 -Das ist auch meine Meinung/ 2 - So unbedingt möchte ich das nicht sagen/ 3 - Dieser Meinung bin ich nicht

**EEFB240: Die meisten Eltern sorgen und ängstigen sich viel zu wenig um ihre Kinder!**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	19	13.1	20	13.9	39	13.5
2	38	26.2	34	23.6	72	24.9
3	88	60.7	90	62.5	178	61.6
missing	1		4		5	

**EEFB241: Kinder sollen öfter ruhig etwas verwöhnt werden!**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	49	33.8	48	33.3	97	33.6
2	41	28.3	44	30.6	85	29.4
3	55	37.9	52	36.1	107	37.0
missing	1		4		5	

**EEFB242: Kinder haben ihre Meinung für sich zu behalten, wenn die Eltern sich über Familienangelegenheiten unterhalten.**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	22	15.1	32	22.2	54	18.6
2	39	26.7	33	22.9	72	24.8
3	85	58.2	79	54.9	164	56.6
missing			4		4	

**EEFB243: Die Eltern müßten die Ungezogenheiten mehr mit Humor tragen!**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	27	18.6	22	15.3	49	17.0
2	42	29.0	37	25.7	79	27.3
3	76	52.4	85	59.0	161	55.7
missing	1		4		5	

**2 JAHRE****ERZIEHUNGSEINSTELLUNGSFRAGEBOGEN**

1 -Das ist auch meine Meinung/ 2 - So unbedingt möchte ich das nicht sagen/ 3 - Dieser Meinung bin ich nicht

**EEFB244: Kinder sollen ihre Eltern nicht dauernd mit unwichtigen Dingen belästigen.**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	10	6.8	10	6.9	20	6.9
2	33	22.6	28	19.3	61	21.0
3	103	70.5	107	73.8	210	72.2
missing			3		3	

**EEFB245: Die Eltern sollten jeden Schritt ihrer Kinder sorgsam überwachen, um sie vor Schaden zu behüten!**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	47	32.6	40	27.4	87	30.0
2	41	28.5	42	28.8	83	28.6
3	56	38.9	64	43.8	120	41.4
missing	2		2		4	

**EEFB246: Es ist nicht richtig, ein Kind schon als völlig gleichberechtigtes Familienmitglied anzusehen.**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	19	13.2	25	17.4	44	15.3
2	26	18.1	24	16.7	50	17.4
3	99	68.8	95	66.0	194	67.4
missing	2		4		6	

**EEFB247: Nicht die Eltern, sondern die Kinder selbst sollten zur Verantwortung gezogen werden, wenn sie etwas angestellt haben.**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	28	19.4	34	23.6	62	21.5
2	62	43.1	50	34.7	112	38.9
3	54	37.5	60	41.7	114	39.6

missing	2		4		6	
---------	---	--	---	--	---	--

**2 JAHRE****ERZIEHUNGSEINSTELLUNGSFRAGEBOGEN**

1 -Das ist auch meine Meinung/ 2 - So unbedingt möchte ich das nicht sagen/ 3 - Dieser Meinung bin ich nicht

**EEFB248: Kinder sollten vor schlechten Erfahrungen bewahrt bleiben.**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	44	30.6	44	30.8	88	30.7
2	49	34.0	36	25.2	85	29.6
3	51	35.4	63	44.1	114	39.7
missing	2		5		7	

**EEFB249: Kinder sollten nie ein Geheimnis vor ihren Eltern haben.**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	84	57.5	100	68.5	184	63.0
2	36	24.7	24	16.4	60	20.5
3	26	17.8	22	15.1	48	16.4
missing			2		2	

**EEFB250: Man kann Kinder unmöglich nur mit Liebe und Güte erziehen.**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	57	39.6	59	41.3	116	40.4
2	36	25.0	41	28.7	77	26.8
3	51	35.4	43	30.1	94	32.8
missing	2		5		7	

**EEFB251: Auch ein älteres Kind darf noch keine selbstständigen Entscheidungen treffen, ohne vorher mit seinen Eltern gesprochen zu haben.**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	60	41.1	51	34.9	111	38.0
2	28	19.2	31	21.2	59	20.2
3	58	39.7	64	43.8	122	41.8
missing			2		2	

**2 JAHRE****ERZIEHUNGSEINSTELLUNGSFRAGEBOGEN**

1 -Das ist auch meine Meinung/ 2 - So unbedingt möchte ich das nicht sagen/ 3 - Dieser Meinung bin ich nicht

**EEFB252: Alle Eltern müssten bei der Erziehung ihrer Kinder viel öfter ein Auge zudrücken!**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	14	9.7	14	9.7	28	9.7
2	47	32.4	48	33.1	95	32.8
3	84	57.9	83	57.2	167	57.6
missing	1		3		4	

**EEFB253: Alle Eltern kennen die Augenblicke, in denen sie wünschen, keine Kinder zu haben!**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	20	14.1	17	11.8	37	12.9
2	28	19.7	22	15.3	50	17.5
3	94	66.2	105	72.9	199	69.6
missing	4		4		8	



\* L - Skala (Mittelwert = 10; Streuung = 5 - 15)

### EEAUT2: Autoritäre Erziehungseinstellung (L-Wert\*)

	Mittelwert	St.abweichng	Minimum	Maximum	Anzahl
männlich	7.36	3.77	1	18	145
weiblich	7.82	4.57	1	20	146
gesamt	7.59	4.19	1	20	291

### EEKONT2: Kontrolle des kindlichen Verhaltens (L-Wert)

	Mittelwert	St.abweichng	Minimum	Maximum	Anzahl
männlich	10.14	4.34	1	19	146
weiblich	10.21	4.80	2	19	146
gesamt	10.17	4.57	1	19	292

### EEUEBB2: Überbesorgt-ängstliche Erziehungseinstellung (L-Wert)

	Mittelwert	St.abweichng	Minimum	Maximum	Anzahl
männlich	8.03	3.61	1	20	146
weiblich	7.97	4.34	1	20	146
gesamt	8.00	3.98	1	20	292

### EENACH2: Mild-nachsichtige Erziehungseinstellung (L-Wert)

	Mittelwert	St.abweichng	Minimum	Maximum	Anzahl
männlich	8.34	4.20	1	18	146
weiblich	8.36	4.14	1	20	145
gesamt	8.35	4.16	1	20	291

### EERBKT2: Reizbarkeit / Unbeherrschtheit (L-Wert)

	Mittelwert	St.abweichng	Minimum	Maximum	Anzahl
männlich	7.97	4.75	1	23	146
weiblich	7.71	5.00	1	23	146

gesamt	7.84	4.87	1	23	292
--------	------	------	---	----	-----

**EEEMD2: Emotionale Distanziertheit (L-Wert)**

	Mittelwert	St.abweichng	Minimum	Maximum	Anzahl
männlich	6.88	4.15	1	18	146
weiblich	6.88	3.99	1	21	146
gesamt	6.88	4.06	1	21	292

**EESTR2: Einstellung zur strengen Erziehung (L-Wert)**

	Mittelwert	St.abweichng	Minimum	Maximum	Anzahl
männlich	7.91	4.11	1	20	146
weiblich	8.02	4.10	1	18	145
gesamt	7.97	4.10	1	20	291

**EEVERW2: Einstellung zur materiellen Verwöhnung (L-Wert)**

	Mittelwert	St.abweichng	Minimum	Maximum	Anzahl
männlich	7.95	4.04	1	19	146
weiblich	7.88	4.69	1	19	146
gesamt	7.91	4.37	1	19	292

**EEKOEB2: Einstellung zur körperlichen Bestrafung (L-Wert)**

	Mittelwert	St.abweichng	Minimum	Maximum	Anzahl
männlich	10.14	3.95	1	20	146
weiblich	10.23	4.19	1	20	146
gesamt	10.19	4.06	1	20	292

Die zwei Globalskalen des EEFB sind faktorielle Zusammenfassungen der hypothetischen Einzelskalen. In den Auswertungen erwiesen sie sich als wesentlich valider.

Die Einzelskalen des EEFB beruhen auf Plausibilitätsannahmen der Testautoren.

**EEFBII2: Globalskala I (L-Wert)****Autoritäre und strenge Erziehungseinstellung**

	Mittelwert	St.abweichng	Minimum	Maximum	Anzahl
männlich	6.88	3.92	1	21	145
weiblich	6.95	4.05	1	17	146
gesamt	6.91	3.98	1	21	291

**EEFBII2: Globalskala II (L-Wert)****Mild - nachsichtige Erziehungseinstellung**

	Mittelwert	St.abweichng	Minimum	Maximum	Anzahl
männlich	8.01	3.92	2	20	145
weiblich	7.89	4.13	1	21	145
gesamt	7.95	4.02	1	21	290

**ANFALL: Wurden bei dem Kind Anfälle beobachtet?**

- 1 - niemals
- 2 - Krämpfe mit Bewußtlosigkeit
- 3 - kurze Abwesenheitszustände
- 4 - kurzes Zusammensacken (astatische Anfälle)
- 5 - BNS\* - Krämpfe

\* Blick - Nick und Salaamkrämpfe

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	146	100.0	146	99.3	292	99.7
2			1	.7	1	.3
missing			1		1	

**2 JAHRE****FRÜHKINDLICHE ENTWICKLUNG  
Krippenerzieherin**

Den Krippenerzieherinnen wurden teilweise dieselben Fragen wie den Müttern gestellt. Die entsprechenden Variablencodierungen enden mit einem "K".

**SAUBER2K: Näßt das Kind am Tage noch ein?**

- 1 - sauber  
2 - näßte in den letzten 2 Monaten noch gelegentlich ein  
3 - näßt noch regelmäßig ein

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	92	63.0	117	79.1	209	71.1
2	30	20.5	20	13.5	50	17.0
3	24	16.4	11	7.4	35	11.9

**SAUBEK2K: Kotet das Kind am Tage noch ein?**

- 1 - sauber  
2 - kotete in den letzten 2 Monaten noch gelegentlich ein  
3 - kotet noch regelmäßig ein

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	118	81.4	130	87.8	248	84.6
2	12	8.3	14	9.5	26	8.9
3	15	10.3	4	2.7	19	6.5
missing	1				1	

**NAHRUG2K: Nahrungsaufnahme**

- 1 - unauffällig  
2 - feste Nahrung, aber schlechter Esser (ißt weniger als normalerweise Kinder in diesem Alter  
und / oder nur durch die List der Pflegeperson ausreichend viel)  
3 - feste Nahrung, ißt abnorm viel  
4 - nimmt noch keine feste Nahrung zu sich, nur Flasche und Brei

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	117	80.1	116	78.4	233	79.3
2	24	16.4	31	20.9	55	18.7
3	5	3.4	1	.7	6	2.0



**NAHRUT2K: Nahrungsaufnahme (Tempo)**

1 - unauffällig

2 - isst langsamer als Kinder normalerweise in diesem Alter

3 - isst hastig - schneller als Kinder normalerweise in diesem Alter

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	116	79.5	114	77.0	230	78.2
2	25	17.1	34	23.0	59	20.1
3	5	3.4			5	1.7

**ERBRECHK: Früheres Erbrechen (ohne Magen-Darm-Erkrankung)**

1 - nie

2 - im 1. Halbjahr

3 - im 2. Halbjahr

4 - im gesamten 1. Lebensjahr

5 - im 2. Lebensjahr

6 - 2 + 5

7 - 3 + 5

8 - 2 + 3 + 5

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	80	57.6	84	58.3	164	58.0
2	59	42.4	60	41.7	119	42.0
missing	7		4		11	



**ERBREHK: Häufigkeit des Erbrechens in den letzten 3 Monaten**

- 1 - nie
- 2 - Brechneigung, sofern bestimmte Maßnahmen nicht eingehalten werden
- 3 - dreimal und weniger im Monat
- 4 - 4- bis 6mal im Monat
- 5 - 7- bis 9mal im Monat
- 6 - 10- bis 12mal im Monat
- 7 - 13- bis 15mal im Monat
- 8 - täglich

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	139	95.2	143	97.3	282	96.2
2	5	3.4			5	1.7
3	1	.7	2	1.4	3	1.0
4	1	.7	1	.7	2	.7
8			1	.7	1	.3
missing			1		1	

**SPIELN: Spielverhalten (Niveau der Beschäftigung)**

- 1 - erfüllt alle Anforderungen seiner Altersgruppe
- 2 - erfüllt die Anforderungen seiner Altersgruppe in der Mehrzahl
- 3 - erfüllt die Anforderungen seiner Altersgruppe in der Mehrzahl nicht
- 4 - beteiligt sich gar nicht an alterstypischem Spiel, erfüllt die Anforderungen seiner Altersgruppe nicht

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	23	15.8	29	19.6	52	17.7
2	88	60.3	91	61.5	179	60.9
3	26	17.8	27	18.2	53	18.0
4	9	6.2	1	.7	10	3.4

**SPIELT: Spielverhalten (Tempo der Beschäftigung)**

- 1 - im Vergleich zur Altersgruppe unauffällig  
 2 - im Vergleich zu Kindern seiner Altersgruppe auffallend langsam, aber sorgfältig  
 3 - im Vergleich zu Kindern seiner Altersgruppe auffallend langsam, wenig sorgfältig  
 4 - im Vergleich zu Kindern seiner Altersgruppe auffallend flink und schnell, aber oberflächlich  
 5 - im Vergleich zur Altersgruppe flink und schnell, dabei sorgfältig

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	113	77.4	124	84.4	237	80.9
2	24	16.4	13	8.8	37	12.6
3	9	6.2	8	5.4	17	5.8
5			2	1.4	2	.7
missing			1		1	

**SPIELAB: Spielverhalten (Aufnahmebereitschaft)**

- 1 - unauffällig  
 2 - wenig wißbegierig, wenig Interesse gegenüber Neuem, wenig aufgeweckt  
 3 - sehr wißbegierig, sehr interessiert gegenüber Neuem, aufgeweckter als normalerweise Kinder in diesem Alter

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	114	78.1	125	85.0	239	81.6
2	24	16.4	13	8.8	37	12.6
3	8	5.5	9	6.1	17	5.8
missing			1		1	

**FOLGSK: Folgsamkeit**

- 1 - unauffällig, gehorcht normal und nachhaltig  
 2 - auffällig, gehorcht zwar sofort, aber nicht nachhaltig, verfällt schnell wieder in den alten Fehler  
 3 - auffällig, gehorcht nicht sofort, paßt sich dann aber an  
 4 - auffällig, gehorcht nicht sofort, paßt sich auch später nicht genügend an

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	109	75.2	126	85.1	235	80.2
2	4	2.8	4	2.7	8	2.7
3	7	4.8	7	4.7	14	4.8
4	25	17.2	11	7.4	36	12.3
missing	1				1	

**KONZ: Konzentration und Beschäftigung**

- 1 - Konzentration während der gesamten Beschäftigungsdauer schwach (leicht ablenkbar)  
 2 - Konzentration zu Beginn der Beschäftigung unauffällig, jedoch rascher nachlassend als normalerweise bei Kindern dieser Altersgruppe  
 3 - unauffällig  
 4 - auffallend gute und langandauernde Konzentration

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	31	21.2	26	17.7	57	19.5
2	27	18.5	18	12.2	45	15.4
3	86	58.9	98	66.7	184	62.8
4	2	1.4	5	3.4	7	2.4
missing			1		1	

**REAKTK: Wie reagiert das Kind bei Verboten, unangenehmen Aufträgen und Anforderungen?**

- 1 - unauffällig  
 2 - nicht leicht erregbar (nicht leicht aus der Ruhe zu bringen, nicht leicht kränkbar, reagiert nicht leicht mit Weinen, Aggressivität oder Trotz)  
 3 - weint leicht  
 4 - reagiert leicht aggressiv  
 5 - trotzt leicht  
 6 - 3 + 4  
 7 - 3 + 5  
 8 - 4 + 5  
 9 - 3 + 4 + 5

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	86	58.9	107	72.3	193	65.6
2	3	2.1	1	.7	4	1.4
3	16	11.0	20	13.5	36	12.2
4	10	6.8	5	3.4	15	5.1
5	11	7.5	4	2.7	15	5.1
6	3	2.1	2	1.4	5	1.7
7	7	4.8	4	2.7	11	3.7
8	5	3.4	2	1.4	7	2.4
9	5	3.4	3	2.0	8	2.7

**BERUHIGK: Wie läßt sich das Kind beruhigen?**

- 1 - bei Erregung nicht rasch wieder zu beruhigen  
 2 - unauffällig  
 3 - bei Erregung auffallend rasch zu beruhigen

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	32	22.1	28	19.2	60	20.6
2	108	74.5	116	79.5	224	77.0
3	5	3.4	2	1.4	7	2.4
missing	1		2		3	

**WEINENK: Weinen (Anlaß)**

- 1 - weint nicht leicht  
 2 - weint auffallend leicht bei Willensverweigerung  
 3 - weint auffallend leicht in Furchtsituationen  
 4 - 2 + 3  
 5 - weint auffallend leicht bei geringfügigen Schmerzen  
 6 - 2 + 5  
 7 - 3 + 5  
 8 - 2 + 3 + 5

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	114	78.1	117	80.7	231	79.4
2	18	12.3	17	11.7	35	12.0
3			1	.7	1	.3
4	2	1.4	1	.7	3	1.0
5	1	.7	4	2.8	5	1.7
6	2	1.4	2	1.4	4	1.4
7	3	2.1			3	1.0
8	6	4.1	3	2.1	9	3.1
missing			3		3	

**LAUNEK: Wie ist das Kind gewöhnlich gelaunt?**

- 1 - mürrisch  
 2 - bedrückt  
 3 - unauffällig, heiter  
 4 - albern, inadäquat heiter  
 5 - mürrisch, starke Stimmungsschwankungen  
 6 - bedrückt, starke Stimmungsschwankungen  
 7 - fröhlich, starke Stimmungsschwankungen  
 8 - albern, starke Stimmungsschwankungen

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	5	3.4			5	1.7
2	18	12.4	22	14.9	40	13.7
3	115	79.3	119	80.4	234	79.9
4	2	1.4	2	1.4	4	1.4
5	1	.7			1	.3
6	1	.7	2	1.4	3	1.0
7	3	2.1	3	2.0	6	2.0

missing	1				1	
---------	---	--	--	--	---	--

**ANGSTK: Reagiert das Kind leicht ängstlich oder nicht?**

- 1 - auffallend wenig Angstreaktionen  
 2 - normale, den Altersgefährten entsprechende Angstreaktionen  
 3 - auffallend häufig Angstreaktionen

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	16	11.0	11	7.4	27	9.2
2	110	75.3	117	79.1	227	77.2
3	20	13.7	20	13.5	40	13.6

**ZAERTLIK: Hat das Kind viel oder wenig Bedürfnis nach Zärtlichkeit?**

- 1 - auffallend wenig Bedürfnis nach Zärtlichkeitsaustausch  
 2 - normales, den Altersgefährten entsprechendes Zärtlichkeitsbedürfnis  
 3 - auffallend viel Bedürfnis nach Zärtlichkeit zu vertrauten Bezugspersonen  
 4 - auffallend viel Bedürfnis nach Zärtlichkeit, auch gegenüber wenig vertrauten Personen  
 ("fällt jedem um den Hals")

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	14	9.6	13	8.8	27	9.2
2	111	76.0	116	78.4	227	77.2
3	18	12.3	17	11.5	35	11.9
4	3	2.1	2	1.4	5	1.7

**KONTAKTK: Findet das Kind rasch oder schwer Kontakt zu Fremden?**

- 1 - gegenüber Fremden nicht aufschließbar  
 2 - gegenüber Fremden verzögert aufschließbar  
 3 - gegenüber Fremden altersentsprechend aufschließbar  
 4 - sehr schnell aufschließbar, distanzgemindert

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	4	2.8	4	2.7	8	2.7
2	35	24.1	31	20.9	66	22.5
3	105	72.4	112	75.7	217	74.1
4	1	.7	1	.7	2	.7
missing	1				1	

**BEWEGUNK: Ist das Kind auffallend lebhaft oder nicht?  
(Bewegungsbedürfnis)**

- 1 - auffallend bewegungsarm  
 2 - unauffällig  
 3 - bewegungsreich, ausreichend gesteuert  
 4 - bewegungsreich, "unruhig und zapplig"

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	17	11.6	19	12.8	36	12.2
2	71	48.6	95	64.2	166	56.5
3	35	24.0	18	12.2	53	18.0
4	23	15.8	16	10.8	39	13.3

**GROBMOTK: Ist das Kind beim Laufen und Springen geschickt oder ungeschickt?**

- 1 - beim Laufen und Springen auffallend ungeschickte, plumpe Bewegungen  
 2 - unauffällig  
 3 - beim Laufen und Springen auffallend geschickt  
 4 - läuft noch nicht

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	38	26.0	30	20.3	68	23.1
2	98	67.1	107	72.3	205	69.7
3	10	6.8	11	7.4	21	7.1

**HAEND2: Händigkeit**

- 1 - Rechtshänder  
 2 - Ambidexter  
 3 - Linkshänder

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	138	94.5	144	97.3	282	95.9
2	1	.7	2	1.4	3	1.0
3	7	4.8	2	1.4	9	3.1



**GESCHI: Ist das Kind beim Hantieren geschickt oder ungeschickt?**

- 1 - beim Hantieren auffallend ungeschickte Bewegungen
- 2 - unauffällig
- 3 - beim Hantieren auffallend geschickt
- 4 - einseitig auffallend, ungeschickt rechts
- 5 - einseitig auffallend, ungeschickt links

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	17	11.6	13	8.8	30	10.2
2	121	82.9	128	86.5	249	84.7
3	8	5.5	7	4.7	15	5.1

**SPREWOK: Wie spricht das Kind (Wortschatz)?**

- 1 - spricht noch kein Wort
- 2 - spricht nur "Mama" und/oder "Papa"
- 3 - benennt einige Gegenstände seiner Umwelt richtig
- 4 - spricht überwiegend in Zweiwortsätzen
- 5 - spricht mehr als Zweiwortsätze, aber agrammatisch
- 6 - spricht mehr als Zweiwortsätze, unter Verwendung einfacher Grammatik
- 7 - im Vergleich zur Altersgruppe ungewöhnlich hoher Wortschatz und gewandte grammatische Knüpfungen

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	4	2.8	4	2.7	8	2.7
2	4	2.8	2	1.4	6	2.1
3	44	30.6	25	16.9	69	23.6
4	36	25.0	43	29.1	79	27.1
5	8	5.6	15	10.1	23	7.9
6	41	28.5	51	34.5	92	31.5
7	7	4.9	8	5.4	15	5.1
missing	2				2	

**SPREAKK: Sprechen (Sprechaktivität)**

- 1 - keine Sprechaktivität
- 2 - geringe Sprechaktivität
- 3 - Sprechaktivität dem Alter entsprechend
- 4 - Sprechaktivität gesteigert

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	5	3.4	3	2.0	8	2.7
2	53	36.3	39	26.4	92	31.3
3	81	55.5	96	64.9	177	60.2
4	7	4.8	10	6.8	17	5.8

**ARTIKUL: Artikulation**

- 1 - spricht noch kein Wort
- 2 - artikuliert im Vergleich zu seiner Altersgruppe auffallend schlecht
- 3 - artikuliert im Vergleich zur Altersgruppe normal
- 4 - artikuliert im Vergleich zur Altersgruppe auffallend gut

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	4	2.8	3	2.0	7	2.4
2	26	17.9	22	15.0	48	16.4
3	107	73.8	110	74.8	217	74.3
4	8	5.5	12	8.2	20	6.8
missing	1		1		2	

**PSYAUFK: Sammelspalte Psychische Auffälligkeiten**

Die Erhebungen zu "psychischen Auffälligkeiten" dienten orientierend zur Ermittlung der individuellen Häufigkeit von Symptomen (Symptomindex, vgl. Meyer-Probst & Teichmann, 1984, S.129-137). Die Dichotomisierung "auffällig/unauffällig" erfolgte aufgrund der empirischen Verteilung, indem jeweils 15-25% der stärksten Symptomausprägung als "auffällig" eingestuft wurden. Damit erklärt sich die hohe (unrealistische) Auffälligkeitsrate in der Sammelspalte.

1 - nein

2 - ja

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	26	18.7	32	22.1	58	20.4
2	113	81.3	113	77.9	226	79.6
missing	7		3		10	

**MSCHLAF: Durchschnittliche Mittagsschlafdauer in der Krippe**

- 1 - schläft gewöhnlich nicht
- 2 - 31 bis 60 Minuten
- 3 - 61 bis 90 Minuten
- 4 - 91 bis 120 Minuten
- 5 - 121 bis 150 Minuten
- 6 - 151 bis 180 Minuten
- 7 - 181 Minuten und mehr

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	2	1.4	2	1.4	4	1.4
2	14	9.7	21	14.2	35	11.9
3	12	8.3	25	16.9	37	12.6
4	88	60.7	84	56.8	172	58.7
5	29	20.0	16	10.8	45	15.4
missing	1				1	

**UNRSCH: Unruhiger und/oder flacher Schlaf (leichte Erweckbarkeit)**

- 1 - nein
- 2 - schläft in der Regel unruhig und/oder flach
- 3 - schläft unruhig und/oder flach nur nach Erregung, bei Infekten u.a. akuten Anlässen

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	131	90.3	133	89.9	264	90.1
2	14	9.7	15	10.1	29	9.9
missing	1				1	

Den Krippenerzieherinnen wurden teilweise dieselben Fragen wie den Müttern gestellt. Die entsprechenden Variablencodierungen enden mit einem "K".

### JAKTAT2K: Ist Ihnen bei dem Kind aufgefallen, daß es zuweilen mit dem Kopf und Oberkörper rhythmisch hin- und herschaukelt?

- 1 - nie
- 2 - früher vorhanden, in den letzten 3 Monaten nicht mehr
- 3 - jetzt vorhanden, gering ausgeprägt
- 4 - jetzt vorhanden, stark ausgeprägt (schlägt mit dem Kopf gegen Wand und Gegenstände)

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	137	93.8	141	95.3	278	94.6
2	1	.7	2	1.4	3	1.0
3	5	3.4			5	1.7
4	3	2.1	5	3.4	8	2.7

### NAEGEL2K: Knabbert das Kind an den Nägeln?

- 1 - nie
- 2 - früher vorhanden, jetzt nicht mehr
- 3 - jetzt vorhanden

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	146	100.0	147	100.0	293	100.0
missing			1		1	

### MANGEN2K: Spielt das Kind ungewöhnlich häufig am Genitale?

- 1 - früher vorhanden, in den letzten 3 Monaten nicht mehr
- 2 - nie
- 3 - jetzt vorhanden

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	7	4.8	11	7.4	18	6.1
2	134	91.8	135	91.2	269	91.5
3	5	3.4	2	1.4	7	2.4

**MANHAARK: Ist Ihnen bei dem Kind aufgefallen, daß es sich selbst,  
anderen Kindern oder Spielzeug Haare ausreißt?**

- 1 - nie  
 2 - früher vorhanden, in den letzten 3 Monaten nicht mehr  
 3 - jetzt vorhanden

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	143	99.3	144	98.0	287	98.6
3	1	.7	3	2.0	4	1.4
missing	2		1		3	

**TICS2K: Sind bei dem Kind unwillkürliche Zuckungen im Gesichts- oder  
Schulterbereich aufgefallen?**

- 1 - nie  
 2 - früher vorhanden, jetzt nicht mehr  
 3 - jetzt vorhanden

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	143	97.9	146	98.6	289	98.3
2	1	.7			1	.3
3	2	1.4	2	1.4	4	1.4

**DAUMLU2K: Lutscht das Kind am Daumen oder an Fingern?**

- 1 - hat nie gelutscht  
 2 - früher gelutscht, in den letzten 3 Monaten nicht mehr  
 3 - lutscht jetzt noch am Daumen bzw. Finger  
 4 - lutscht nur bei Ermüdung

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	74	50.7	85	57.4	159	54.1
2	11	7.5	10	6.8	21	7.1
3	37	25.3	37	25.0	74	25.2
4	24	16.4	16	10.8	40	13.6

**KINFEH2K: Sammelspalte Kinderfehler**

Die Sammelspalte stellt ein Expertenurteil des Untersuchers anhand der Angaben der Krippenerzieherin über psychische Störungen des Kindes dar.

1 - keine

2 - vorhanden

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	94	67.6	98	67.6	192	67.6
2	45	32.4	47	32.4	92	32.4
missing	7		3		10	

**2 JAHRE****FAMILIE  
Krippenerzieherin****FAMIL: Wie schätzen Sie die Familienverhältnisse im Hinblick auf die Erziehung des Kindes ein?**

- 1 - gut
- 2 - ausreichend
- 3 - unzureichend - verwöhnend
- 4 - unzureichend - vernachlässigend

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	102	72.3	122	83.6	224	78.0
2	26	18.4	15	10.3	41	14.3
3	8	5.7	2	1.4	10	3.5
4	5	3.5	7	4.8	12	4.2
missing	5		2		7	

**DISSMU: Dissozialität der Mutter**

- 1 - keine
- 2 - Kriminalität
- 3 - Alkoholismus
- 4 - 2 + 3
- 5 - Dissozialität
- 6 - 2 + 5
- 7 - 3 + 5
- 8 - 2 + 3 + 5

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	135	93.8	140	95.9	275	94.8
3	2	1.4			2	.7
5	7	4.9	4	2.7	11	3.8
6			1	.7	1	.3
7			1	.7	1	.3
missing	2		2		4	



**DISSVA:Dissozialität des Vaters**

- 1 - keine
- 2 - Kriminalität
- 3 - Alkoholismus
- 4 - 2 + 3
- 5 - Dissozialität
- 6 - 2 + 5
- 7 - 3 + 5
- 8 - 2 + 3 + 5
- 99 - kein Vater in der Familie

Anmerkung:

Dissozialität: Arbeitsbummelei, Herumtreiberei, "schlechter Ruf", steht in dem Ruf, die Kinder zu vernachlässigen

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	121	85.2	124	84.9	245	85.1
3	1	.7	2	1.4	3	1.0
4	1	.7			1	.3
5	1	.7	2	1.4	3	1.0
7	1	.7			1	.3
8			1	.7	1	.3
99	17	12.0	17	11.6	34	11.8
missing	4		2		6	

**EINWEIS: Quartal der Krippeneinweisung**

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	33	25.8	36	27.1	69	26.4
2	44	34.4	43	32.3	87	33.3
3	11	8.6	16	12.0	27	10.3
4	14	10.9	16	12.0	30	11.5
5	13	10.2	8	6.0	21	8.0
6	11	8.6	10	7.5	21	8.0
7	1	.8	2	1.5	3	1.1
8	1	.8	1	.8	2	.8
9			1	.8	1	.4
missing	18		15		33	

**FEHL1Q: Krippenaufenthalt: Krankheitsbedingte Fehltage in %  
1. Quartal**

- 1 - 0 - 9,5% Fehltage = 0 - 5,9 Tage  
 2 - 9,6 - 19,1% Fehltage = 6,0 - 11,8 Tage  
 3 - 19,2 - 27,7% Fehltage = 11,9 - 17,2 Tage  
 4 - 27,9 - 37,3% Fehltage = 17,3 - 23,0 Tage  
 5 - 37,4 - 46,9% Fehltage = 23,4 - 29,0 Tage  
 6 - 47,0 - 56,5% Fehltage = 29,1 - 35,0 Tage  
 7 - 56,6 - 66,1% Fehltage = 35,1 - 41,0 Tage  
 8 - über 66,2% Fehltage = über 41,0 Tage

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	25	92.6	31	91.2	56	91.8
2	1	3.7	2	5.9	3	4.9
4	1	3.7			1	1.6
8			1	2.9	1	1.6
missing	119		114		233	

**FEHL2Q: Krippenaufenthalt: Krankheitsbedingte Fehltage in %****2. Quartal**

- 1 - 0 - 9,5% Fehltage = 0 - 5,9 Tage  
 2 - 9,6 - 19,1% Fehltage = 6,0 - 11,8 Tage  
 3 - 19,2 - 27,7% Fehltage = 11,9 - 17,2 Tage  
 4 - 27,9 - 37,3% Fehltage = 17,3 - 23,0 Tage  
 5 - 37,4 - 46,9% Fehltage = 23,4 - 29,0 Tage  
 6 - 47,0 - 56,5% Fehltage = 29,1 - 35,0 Tage  
 7 - 56,6 - 66,1% Fehltage = 35,1 - 41,0 Tage  
 8 - über 66,2% Fehltage = über 41,0 Tage

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	47	67.1	50	71.4	97	69.3
2	10	14.3	14	20.0	24	17.1
3	5	7.1	4	5.7	9	6.4
4	6	8.6	1	1.4	7	5.0
5	2	2.9			2	1.4
8			1	1.4	1	.7
missing	76		78		154	

**FEHL3Q: Krippenaufenthalt: Krankheitsbedingte Fehltage in %****3. Quartal**

- 1 - 0 - 9,5% Fehltage = 0 - 5,9 Tage  
 2 - 9,6 - 19,1% Fehltage = 6,0 - 11,8 Tage  
 3 - 19,2 - 27,7% Fehltage = 11,9 - 17,2 Tage  
 4 - 27,9 - 37,3% Fehltage = 17,3 - 23,0 Tage  
 5 - 37,4 - 46,9% Fehltage = 23,4 - 29,0 Tage  
 6 - 47,0 - 56,5% Fehltage = 29,1 - 35,0 Tage  
 7 - 56,6 - 66,1% Fehltage = 35,1 - 41,0 Tage  
 8 - über 66,2% Fehltage = über 41,0 Tage

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	48	63.2	58	68.2	106	65.8
2	13	17.1	11	12.9	24	14.9
3	8	10.5	9	10.6	17	10.6
4	6	7.9	3	3.5	9	5.6
5	1	1.3	2	2.4	3	1.9
6			1	1.2	1	.6
8			1	1.2	1	.6
missing	70		63		133	



### FEHL4Q: Krippenaufenthalt: Krankheitsbedingte Fehltage in % 4. Quartal

- 1 - 0 - 9,5% Fehltage = 0 - 5,9 Tage  
 2 - 9,6 - 19,1% Fehltage = 6,0 - 11,8 Tage  
 3 - 19,2 - 27,7% Fehltage = 11,9 - 17,2 Tage  
 4 - 27,9 - 37,3% Fehltage = 17,3 - 23,0 Tage  
 5 - 37,4 - 46,9% Fehltage = 23,4 - 29,0 Tage  
 6 - 47,0 - 56,5% Fehltage = 29,1 - 35,0 Tage  
 7 - 56,6 - 66,1% Fehltage = 35,1 - 41,0 Tage  
 8 - über 66,2% Fehltage = über 41,0 Tage

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	50	53.2	72	71.3	122	62.6
2	18	19.1	20	19.8	38	19.5
3	14	14.9	4	4.0	18	9.2
4	5	5.3	2	2.0	7	3.6
5	3	3.2	2	2.0	5	2.6
6	3	3.2	1	1.0	4	2.1
8	1	1.1			1	.5
missing	52		47		99	

### FEHL5Q: Krippenaufenthalt: Krankheitsbedingte Fehltage in % 5. Quartal

- 1 - 0 - 9,5% Fehltage = 0 - 5,9 Tage  
 2 - 9,6 - 19,1% Fehltage = 6,0 - 11,8 Tage  
 3 - 19,2 - 27,7% Fehltage = 11,9 - 17,2 Tage  
 4 - 27,9 - 37,3% Fehltage = 17,3 - 23,0 Tage  
 5 - 37,4 - 46,9% Fehltage = 23,4 - 29,0 Tage  
 6 - 47,0 - 56,5% Fehltage = 29,1 - 35,0 Tage  
 7 - 56,6 - 66,1% Fehltage = 35,1 - 41,0 Tage  
 8 - über 66,2% Fehltage = über 41,0 Tage

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	65	60.7	72	63.7	137	62.3
2	21	19.6	24	21.2	45	20.5
3	6	5.6	7	6.2	13	5.9
4	4	3.7	2	1.8	6	2.7
5	6	5.6	4	3.5	10	4.5
6	2	1.9	3	2.7	5	2.3
7	1	.9	1	.9	2	.9

8	2	1.9			2	.9
missing	39		35		74	

### FEHL6Q: Krippenaufenthalt: Krankheitsbedingte Fehltage in % 6. Quartal

- 1 - 0 - 9,5% Fehltage = 0 - 5,9 Tage  
 2 - 9,6 - 19,1% Fehltage = 6,0 - 11,8 Tage  
 3 - 19,2 - 27,7% Fehltage = 11,9 - 17,2 Tage  
 4 - 27,9 - 37,3% Fehltage = 17,3 - 23,0 Tage  
 5 - 37,4 - 46,9% Fehltage = 23,4 - 29,0 Tage  
 6 - 47,0 - 56,5% Fehltage = 29,1 - 35,0 Tage  
 7 - 56,6 - 66,1% Fehltage = 35,1 - 41,0 Tage  
 8 - über 66,2% Fehltage = über 41,0 Tage

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	69	60.0	84	67.7	153	64.0
2	25	21.7	20	16.1	45	18.8
3	9	7.8	14	11.3	23	9.6
4	4	3.5	3	2.4	7	2.9
5			1	.8	1	.4
6	2	1.7			2	.8
7	4	3.5			4	1.7
8	2	1.7	2	1.6	4	1.7
missing	31		24		55	

### FEHL7Q: Krippenaufenthalt: Krankheitsbedingte Fehltage in % 7. Quartal

- 1 - 0 - 9,5% Fehltage = 0 - 5,9 Tage  
 2 - 9,6 - 19,1% Fehltage = 6,0 - 11,8 Tage  
 3 - 19,2 - 27,7% Fehltage = 11,9 - 17,2 Tage  
 4 - 27,9 - 37,3% Fehltage = 17,3 - 23,0 Tage  
 5 - 37,4 - 46,9% Fehltage = 23,4 - 29,0 Tage  
 6 - 47,0 - 56,5% Fehltage = 29,1 - 35,0 Tage  
 7 - 56,6 - 66,1% Fehltage = 35,1 - 41,0 Tage  
 8 - über 66,2% Fehltage = über 41,0 Tage

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	74	61.2	94	74.0	168	67.7
2	23	19.0	18	14.2	41	16.5
3	11	9.1	5	3.9	16	6.5
4	3	2.5	5	3.9	8	3.2
5	6	5.0	3	2.4	9	3.6
6	4	3.3	1	.8	5	2.0

8			1	.8	1	.4
missing	25		21		46	



**FEHL8Q: Krippenaufenthalt: Krankheitsbedingte Fehltage in %  
8. Quartal**

- 1 - 0 - 9,5% Fehltage = 0 - 5,9 Tage  
 2 - 9,6 - 19,1% Fehltage = 6,0 - 11,8 Tage  
 3 - 19,2 - 27,7% Fehltage = 11,9 - 17,2 Tage  
 4 - 27,9 - 37,3% Fehltage = 17,3 - 23,0 Tage  
 5 - 37,4 - 46,9% Fehltage = 23,4 - 29,0 Tage  
 6 - 47,0 - 56,5% Fehltage = 29,1 - 35,0 Tage  
 7 - 56,6 - 66,1% Fehltage = 35,1 - 41,0 Tage  
 8 - über 66,2% Fehltage = über 41,0 Tage

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	82	67.8	100	79.4	182	73.7
2	24	19.8	22	17.5	46	18.6
3	8	6.6	1	.8	9	3.6
4	3	2.5			3	1.2
5	2	1.7	2	1.6	4	1.6
7	1	.8	1	.8	2	.8
8	1	.8			1	.4
missing	25		22		47	

**FEHL1L: Krippenaufenthalt: Krankheitsbedingte Fehltage in %**  
**1. Lebensjahr**

- 1 - 0 - 4,0% Fehltage = 1,0 - 10,0 Tage  
 2 - 4,1 - 8,0% Fehltage = 10,1 - 20,1 Tage  
 3 - 8,1 - 12,0% Fehltage = 20,2 - 30,1 Tage  
 4 - 12,1 - 16,0% Fehltage = 30,2 - 40,6 Tage  
 5 - 16,1 - 20,0% Fehltage = 40,7 - 50,2 Tage  
 6 - 20,1 - 24,0% Fehltage = 50,3 - 60,2 Tage  
 7 - 24,1 - 28,0% Fehltage = 60,3 - 70,3 Tage  
 8 - 28,1 - 32,0% Fehltage = 70,4 - 80,3 Tage  
 9 - 32,1% und mehr Fehltage = 80,4 Tage und mehr

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	19	21.3	44	44.9	63	33.7
2	20	22.5	17	17.3	37	19.8
3	12	13.5	15	15.3	27	14.4
4	12	13.5	7	7.1	19	10.2
5	14	15.7	6	6.1	20	10.7
6	4	4.5	3	3.1	7	3.7
7	3	3.4	2	2.0	5	2.7
8	3	3.4	1	1.0	4	2.1
9	2	2.2	3	3.1	5	2.7
missing	57		50		107	

**FEHL2L: Krippenaufenthalt: Krankheitsbedingte Fehltage in %**  
**2. Lebensjahr**

- 1 - 0 - 4,0% Fehltage = 1,0 - 10,0 Tage  
 2 - 4,1 - 8,0% Fehltage = 10,1 - 20,1 Tage  
 3 - 8,1 - 12,0% Fehltage = 20,2 - 30,1 Tage  
 4 - 12,1 - 16,0% Fehltage = 30,2 - 40,6 Tage  
 5 - 16,1 - 20,0% Fehltage = 40,7 - 50,2 Tage  
 6 - 20,1 - 24,0% Fehltage = 50,3 - 60,2 Tage  
 7 - 24,1 - 28,0% Fehltage = 60,3 - 70,3 Tage  
 8 - 28,1 - 32,0% Fehltage = 70,4 - 80,3 Tage  
 9 - 32,1% und mehr Fehltage = 80,4 Tage und mehr

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	26	21.1	55	42.0	81	31.9
2	33	26.8	29	22.1	62	24.4
3	26	21.1	19	14.5	45	17.7
4	14	11.4	12	9.2	26	10.2
5	9	7.3	6	4.6	15	5.9
6	8	6.5	7	5.3	15	5.9
7	2	1.6	1	.8	3	1.2
8	2	1.6			2	.8
9	3	2.4	2	1.5	5	2.0
missing	23		17		40	

### FEHLGES: Krippenaufenthalt: Krankheitsbedingte Fehltage in % Insgesamt

- 1 - 0 - 4,0% Fehltage = 1,0 - 10,0 Tage  
 2 - 4,1 - 8,0% Fehltage = 10,1 - 20,1 Tage  
 3 - 8,1 - 12,0% Fehltage = 20,2 - 30,1 Tage  
 4 - 12,1 - 16,0% Fehltage = 30,2 - 40,6 Tage  
 5 - 16,1 - 20,0% Fehltage = 40,7 - 50,2 Tage  
 6 - 20,1 - 24,0% Fehltage = 50,3 - 60,2 Tage  
 7 - 24,1 - 28,0% Fehltage = 60,3 - 70,3 Tage  
 8 - 28,1 - 32,0% Fehltage = 70,4 - 80,3 Tage  
 9 - 32,1% und mehr Fehltage = 80,4 Tage und mehr

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	22	17.6	48	36.4	70	27.2
2	32	25.6	33	25.0	65	25.3
3	27	21.6	26	19.7	53	20.6
4	21	16.8	8	6.1	29	11.3
5	13	10.4	10	7.6	23	8.9
6	3	2.4	3	2.3	6	2.3
7	3	2.4	2	1.5	5	1.9
8	3	2.4	1	.8	4	1.6
9	1	.8	1	.8	2	.8
missing	21		16		37	

### BEURLINF: Wurde wenigstens einmal wegen Infektanfälligkeit beurlaubt

- 1 - nein  
 2 - ja  
 3 - Krämpfe  
 4 - Ernährungsstörungen

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	121	96.8	116	93.5	237	95.2
2	3	2.4	7	5.6	10	4.0
3	1	.8	1	.8	2	.8
missing	21		24		45	

**ED1ATMU: Erkrankungsdauer im 1. Lebensjahr in % - Krankheiten des Atmungssystems**

- 1 - 0,0 - 3,0% Fehltage = 1,0 - 7,5 Tage  
 2 - 3,1 - 6,0% Fehltage = 7,6 - 15,1 Tage  
 3 - 6,1 - 9,0% Fehltage = 15,2 - 22,6 Tage  
 4 - 9,1 - 12,0% Fehltage = 22,7 - 30,1 Tage  
 5 - 12,1 - 15,0% Fehltage = 30,2 - 37,6 Tage  
 6 - 15,1 - 18,0% Fehltage = 37,7 - 45,2 Tage  
 7 - 18,1 - 21,0% Fehltage = 45,3 - 52,7 Tage  
 8 - 21,1 - 24,0% Fehltage = 52,8 - 60,2 Tage  
 9 - 24,1% und mehr Fehltage = 60,3 Tage und mehr

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	42	48.8	56	60.2	98	54.7
2	16	18.6	15	16.1	31	17.3
3	8	9.3	11	11.8	19	10.6
4	6	7.0	5	5.4	11	6.1
5	5	5.8	1	1.1	6	3.4
6	2	2.3			2	1.1
7	6	7.0	2	2.2	8	4.5
8			2	2.2	2	1.1
9	1	1.2	1	1.1	2	1.1
missing	60		55		115	

**ED1PNEU: Erkrankungsdauer im 1. Lebensjahr in % - Pneumonie**

- 1 - 0,0 - 3,0% Fehltage = 1,0 - 7,5 Tage  
 2 - 3,1 - 6,0% Fehltage = 7,6 - 15,1 Tage  
 3 - 6,1 - 9,0% Fehltage = 15,2 - 22,6 Tage  
 4 - 9,1 - 12,0% Fehltage = 22,7 - 30,1 Tage  
 5 - 12,1 - 15,0% Fehltage = 30,2 - 37,6 Tage  
 6 - 15,1 - 18,0% Fehltage = 37,7 - 45,2 Tage  
 7 - 18,1 - 21,0% Fehltage = 45,3 - 52,7 Tage  
 8 - 21,1 - 24,0% Fehltage = 52,8 - 60,2 Tage  
 9 - 24,1% und mehr Fehltage = 60,3 Tage und mehr

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	77	93.9	88	97.8	165	95.9
2	1	1.2			1	.6
3	1	1.2			1	.6
4	1	1.2	2	2.2	3	1.7
5	1	1.2			1	.6
7	1	1.2			1	.6
missing	64		58		122	

**ED1BRON: Erkrankungsdauer im 1. Lebensjahr in % - Bronchitis**

- 1 - 0,0 - 3,0% Fehltage = 1,0 - 7,5 Tage  
 2 - 3,1 - 6,0% Fehltage = 7,6 - 15,1 Tage  
 3 - 6,1 - 9,0% Fehltage = 15,2 - 22,6 Tage  
 4 - 9,1 - 12,0% Fehltage = 22,7 - 30,1 Tage  
 5 - 12,1 - 15,0% Fehltage = 30,2 - 37,6 Tage  
 6 - 15,1 - 18,0% Fehltage = 37,7 - 45,2 Tage  
 7 - 18,1 - 21,0% Fehltage = 45,3 - 52,7 Tage  
 8 - 21,1 - 24,0% Fehltage = 52,8 - 60,2 Tage  
 9 - 24,1% und mehr Fehltage = 60,3 Tage und mehr

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	67	80.7	79	87.8	146	84.4
2	11	13.3	8	8.9	19	11.0
3			2	2.2	2	1.2
4	3	3.6			3	1.7
5	1	1.2	1	1.1	2	1.2
7	1	1.2			1	.6
missing	63		58		121	

**ED1ASO: Erkrankungsdauer im 1. Lebensjahr in % - Sonstige  
Krankheiten des Atmungssystems**

- 1 - 0,0 - 3,0% Fehltag = 1,0 - 7,5 Tage  
 2 - 3,1 - 6,0% Fehltag = 7,6 - 15,1 Tage  
 3 - 6,1 - 9,0% Fehltag = 15,2 - 22,6 Tage  
 4 - 9,1 - 12,0% Fehltag = 22,7 - 30,1 Tage  
 5 - 12,1 - 15,0% Fehltag = 30,2 - 37,6 Tage  
 6 - 15,1 - 18,0% Fehltag = 37,7 - 45,2 Tage  
 7 - 18,1 - 21,0% Fehltag = 45,3 - 52,7 Tage  
 8 - 21,1 - 24,0% Fehltag = 52,8 - 60,2 Tage  
 9 - 24,1% und mehr Fehltag = 60,3 Tage und mehr

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	59	69.4	67	72.0	126	70.8
2	9	10.6	13	14.0	22	12.4
3	9	10.6	6	6.5	15	8.4
4	4	4.7	3	3.2	7	3.9
5			1	1.1	1	.6
6	1	1.2			1	.6
7	3	3.5	1	1.1	4	2.2
8			1	1.1	1	.6
9			1	1.1	1	.6
missing	61		55		116	

### ED1OHR: Erkrankungsdauer im 1. Lebensjahr in % - Krankheiten des Ohres und des Wurmfortsatzes

- 1 - 0,0 - 3,0% Fehltag = 1,0 - 7,5 Tage  
 2 - 3,1 - 6,0% Fehltag = 7,6 - 15,1 Tage  
 3 - 6,1 - 9,0% Fehltag = 15,2 - 22,6 Tage  
 4 - 9,1 - 12,0% Fehltag = 22,7 - 30,1 Tage  
 5 - 12,1 - 15,0% Fehltag = 30,2 - 37,6 Tage  
 6 - 15,1 - 18,0% Fehltag = 37,7 - 45,2 Tage  
 7 - 18,1 - 21,0% Fehltag = 45,3 - 52,7 Tage  
 8 - 21,1 - 24,0% Fehltag = 52,8 - 60,2 Tage  
 9 - 24,1% und mehr Fehltag = 60,3 Tage und mehr

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	68	81.0	82	91.1	150	86.2
2	9	10.7	4	4.4	13	7.5
3	4	4.8	3	3.3	7	4.0
4	1	1.2	1	1.1	2	1.1
6	1	1.2			1	.6
7	1	1.2			1	.6
missing	62		58		120	

### ED1AUGE: Erkrankungsdauer im 1. Lebensjahr in % - Entzündliche Krankheiten des Auges

- 1 - 0,0 - 3,0% Fehltag = 1,0 - 7,5 Tage  
 2 - 3,1 - 6,0% Fehltag = 7,6 - 15,1 Tage  
 3 - 6,1 - 9,0% Fehltag = 15,2 - 22,6 Tage  
 4 - 9,1 - 12,0% Fehltag = 22,7 - 30,1 Tage  
 5 - 12,1 - 15,0% Fehltag = 30,2 - 37,6 Tage  
 6 - 15,1 - 18,0% Fehltag = 37,7 - 45,2 Tage  
 7 - 18,1 - 21,0% Fehltag = 45,3 - 52,7 Tage  
 8 - 21,1 - 24,0% Fehltag = 52,8 - 60,2 Tage  
 9 - 24,1% und mehr Fehltag = 60,3 Tage und mehr

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	81	98.8	87	97.8	168	98.2
2	1	1.2	2	2.2	3	1.8
missing	64		59		123	



### ED1DARM: Erkrankungsdauer im 1. Lebensjahr in % - Infektiöse Darmerkrankungen

- 1 - 0,0 - 3,0% Fehltag = 1,0 - 7,5 Tage  
 2 - 3,1 - 6,0% Fehltag = 7,6 - 15,1 Tage  
 3 - 6,1 - 9,0% Fehltag = 15,2 - 22,6 Tage  
 4 - 9,1 - 12,0% Fehltag = 22,7 - 30,1 Tage  
 5 - 12,1 - 15,0% Fehltag = 30,2 - 37,6 Tage  
 6 - 15,1 - 18,0% Fehltag = 37,7 - 45,2 Tage  
 7 - 18,1 - 21,0% Fehltag = 45,3 - 52,7 Tage  
 8 - 21,1 - 24,0% Fehltag = 52,8 - 60,2 Tage  
 9 - 24,1% und mehr Fehltag = 60,3 Tage und mehr

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	75	91.5	83	93.3	158	92.4
2	2	2.4	2	2.2	4	2.3
3	3	3.7	2	2.2	5	2.9
4	2	2.4	1	1.1	3	1.8
9			1	1.1	1	.6
missing	64		59		123	

### ED1STOM: Erkrankungsdauer im 1. Lebensjahr in % - Stomatitis aphthosa

- 1 - 0,0 - 3,0% Fehltag = 1,0 - 7,5 Tage  
 2 - 3,1 - 6,0% Fehltag = 7,6 - 15,1 Tage  
 3 - 6,1 - 9,0% Fehltag = 15,2 - 22,6 Tage  
 4 - 9,1 - 12,0% Fehltag = 22,7 - 30,1 Tage  
 5 - 12,1 - 15,0% Fehltag = 30,2 - 37,6 Tage  
 6 - 15,1 - 18,0% Fehltag = 37,7 - 45,2 Tage  
 7 - 18,1 - 21,0% Fehltag = 45,3 - 52,7 Tage  
 8 - 21,1 - 24,0% Fehltag = 52,8 - 60,2 Tage  
 9 - 24,1% und mehr Fehltag = 60,3 Tage und mehr

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	82	100.0	89	100.0	171	100.0
missing	64		59		123	

### ED1GAST: Erkrankungsdauer im 1. Lebensjahr in % - Gastroenteritis und Kolitis

- 1 - 0,0 - 3,0% Fehltage = 1,0 - 7,5 Tage  
 2 - 3,1 - 6,0% Fehltage = 7,6 - 15,1 Tage  
 3 - 6,1 - 9,0% Fehltage = 15,2 - 22,6 Tage  
 4 - 9,1 - 12,0% Fehltage = 22,7 - 30,1 Tage  
 5 - 12,1 - 15,0% Fehltage = 30,2 - 37,6 Tage  
 6 - 15,1 - 18,0% Fehltage = 37,7 - 45,2 Tage  
 7 - 18,1 - 21,0% Fehltage = 45,3 - 52,7 Tage  
 8 - 21,1 - 24,0% Fehltage = 52,8 - 60,2 Tage  
 9 - 24,1% und mehr Fehltage = 60,3 Tage und mehr

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	78	95.1	88	98.9	166	97.1
2	1	1.2	1	1.1	2	1.2
3	2	2.4			2	1.2
6	1	1.2			1	.6
missing	64		59		123	

### ED1INFE: Erkrankungsdauer im 1. Lebensjahr in % - Infektionskrankheiten

- 1 - 0,0 - 3,0% Fehltage = 1,0 - 7,5 Tage  
 2 - 3,1 - 6,0% Fehltage = 7,6 - 15,1 Tage  
 3 - 6,1 - 9,0% Fehltage = 15,2 - 22,6 Tage  
 4 - 9,1 - 12,0% Fehltage = 22,7 - 30,1 Tage  
 5 - 12,1 - 15,0% Fehltage = 30,2 - 37,6 Tage  
 6 - 15,1 - 18,0% Fehltage = 37,7 - 45,2 Tage  
 7 - 18,1 - 21,0% Fehltage = 45,3 - 52,7 Tage  
 8 - 21,1 - 24,0% Fehltage = 52,8 - 60,2 Tage  
 9 - 24,1% und mehr Fehltage = 60,3 Tage und mehr

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	80	97.6	86	96.6	166	97.1
2	2	2.4	1	1.1	3	1.8
3			2	2.2	2	1.2
missing	64		59		123	

### ED1FIEB: Erkrankungsdauer im 1. Lebensjahr in % - Fieber unbekannter Ursache

- 1 - 0,0 - 3,0% Fehltage = 1,0 - 7,5 Tage  
 2 - 3,1 - 6,0% Fehltage = 7,6 - 15,1 Tage  
 3 - 6,1 - 9,0% Fehltage = 15,2 - 22,6 Tage  
 4 - 9,1 - 12,0% Fehltage = 22,7 - 30,1 Tage  
 5 - 12,1 - 15,0% Fehltage = 30,2 - 37,6 Tage  
 6 - 15,1 - 18,0% Fehltage = 37,7 - 45,2 Tage  
 7 - 18,1 - 21,0% Fehltage = 45,3 - 52,7 Tage  
 8 - 21,1 - 24,0% Fehltage = 52,8 - 60,2 Tage  
 9 - 24,1% und mehr Fehltage = 60,3 Tage und mehr

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	80	97.6	89	97.8	169	97.7
2	1	1.2	2	2.2	3	1.7
4	1	1.2			1	.6
missing	64		57		121	

### ED1HAUT: Erkrankungsdauer im 1. Lebensjahr in % - Infektionen der Haut

- 1 - 0,0 - 3,0% Fehltage = 1,0 - 7,5 Tage  
 2 - 3,1 - 6,0% Fehltage = 7,6 - 15,1 Tage  
 3 - 6,1 - 9,0% Fehltage = 15,2 - 22,6 Tage  
 4 - 9,1 - 12,0% Fehltage = 22,7 - 30,1 Tage  
 5 - 12,1 - 15,0% Fehltage = 30,2 - 37,6 Tage  
 6 - 15,1 - 18,0% Fehltage = 37,7 - 45,2 Tage  
 7 - 18,1 - 21,0% Fehltage = 45,3 - 52,7 Tage  
 8 - 21,1 - 24,0% Fehltage = 52,8 - 60,2 Tage  
 9 - 24,1% und mehr Fehltage = 60,3 Tage und mehr

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	80	97.6	87	97.8	167	97.7
3	2	2.4	1	1.1	3	1.8
4			1	1.1	1	.6
missing	64		59		123	

**ED1IMPE: Erkrankungsdauer im 1. Lebensjahr in % - Impetigo contagiosa**

- 1 - 0,0 - 3,0% Fehltage = 1,0 - 7,5 Tage  
 2 - 3,1 - 6,0% Fehltage = 7,6 - 15,1 Tage  
 3 - 6,1 - 9,0% Fehltage = 15,2 - 22,6 Tage  
 4 - 9,1 - 12,0% Fehltage = 22,7 - 30,1 Tage  
 5 - 12,1 - 15,0% Fehltage = 30,2 - 37,6 Tage  
 6 - 15,1 - 18,0% Fehltage = 37,7 - 45,2 Tage  
 7 - 18,1 - 21,0% Fehltage = 45,3 - 52,7 Tage  
 8 - 21,1 - 24,0% Fehltage = 52,8 - 60,2 Tage  
 9 - 24,1% und mehr Fehltage = 60,3 Tage und mehr

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	82	100.0	89	100.0	171	100.0
missing	64		59		123	

**ED1HSO: Erkrankungsdauer im 1. Lebensjahr in % - Sonstige Hautkrankheiten**

- 1 - 0,0 - 3,0% Fehltage = 1,0 - 7,5 Tage  
 2 - 3,1 - 6,0% Fehltage = 7,6 - 15,1 Tage  
 3 - 6,1 - 9,0% Fehltage = 15,2 - 22,6 Tage  
 4 - 9,1 - 12,0% Fehltage = 22,7 - 30,1 Tage  
 5 - 12,1 - 15,0% Fehltage = 30,2 - 37,6 Tage  
 6 - 15,1 - 18,0% Fehltage = 37,7 - 45,2 Tage  
 7 - 18,1 - 21,0% Fehltage = 45,3 - 52,7 Tage  
 8 - 21,1 - 24,0% Fehltage = 52,8 - 60,2 Tage  
 9 - 24,1% und mehr Fehltage = 60,3 Tage und mehr

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	81	98.8	88	100.0	169	99.4
3	1	1.2			1	.6
missing	64		60		124	

**ED1UNFA: Erkrankungsdauer im 1. Lebensjahr in % - Unfälle**

- 1 - 0,0 - 3,0% Fehltage = 1,0 - 7,5 Tage  
 2 - 3,1 - 6,0% Fehltage = 7,6 - 15,1 Tage  
 3 - 6,1 - 9,0% Fehltage = 15,2 - 22,6 Tage  
 4 - 9,1 - 12,0% Fehltage = 22,7 - 30,1 Tage  
 5 - 12,1 - 15,0% Fehltage = 30,2 - 37,6 Tage  
 6 - 15,1 - 18,0% Fehltage = 37,7 - 45,2 Tage  
 7 - 18,1 - 21,0% Fehltage = 45,3 - 52,7 Tage  
 8 - 21,1 - 24,0% Fehltage = 52,8 - 60,2 Tage  
 9 - 24,1% und mehr Fehltage = 60,3 Tage und mehr

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	81	98.8	89	98.9	170	98.8
2	1	1.2			1	.6
4			1	1.1	1	.6
missing	64		58		122	

**ED1SON: Erkrankungsdauer im 1. Lebensjahr in % - Sonstige**

- 1 - 0,0 - 3,0% Fehltage = 1,0 - 7,5 Tage  
 2 - 3,1 - 6,0% Fehltage = 7,6 - 15,1 Tage  
 3 - 6,1 - 9,0% Fehltage = 15,2 - 22,6 Tage  
 4 - 9,1 - 12,0% Fehltage = 22,7 - 30,1 Tage  
 5 - 12,1 - 15,0% Fehltage = 30,2 - 37,6 Tage  
 6 - 15,1 - 18,0% Fehltage = 37,7 - 45,2 Tage  
 7 - 18,1 - 21,0% Fehltage = 45,3 - 52,7 Tage  
 8 - 21,1 - 24,0% Fehltage = 52,8 - 60,2 Tage  
 9 - 24,1% und mehr Fehltage = 60,3 Tage und mehr

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	75	90.4	87	97.8	162	94.2
2	4	4.8	1	1.1	5	2.9
3	4	4.8	1	1.1	5	2.9
missing	63		59		122	

**ED1KANG: Erkrankungsdauer im 1. Lebensjahr in % - Keine Angaben**

- 1 - 0,0 - 3,0% Fehltage = 1,0 - 7,5 Tage  
 2 - 3,1 - 6,0% Fehltage = 7,6 - 15,1 Tage  
 3 - 6,1 - 9,0% Fehltage = 15,2 - 22,6 Tage  
 4 - 9,1 - 12,0% Fehltage = 22,7 - 30,1 Tage  
 5 - 12,1 - 15,0% Fehltage = 30,2 - 37,6 Tage  
 6 - 15,1 - 18,0% Fehltage = 37,7 - 45,2 Tage  
 7 - 18,1 - 21,0% Fehltage = 45,3 - 52,7 Tage  
 8 - 21,1 - 24,0% Fehltage = 52,8 - 60,2 Tage  
 9 - 24,1% und mehr Fehltage = 60,3 Tage und mehr

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	74	90.2	83	93.3	157	91.8
2	5	6.1	3	3.4	8	4.7
3			2	2.2	2	1.2
4	2	2.4	1	1.1	3	1.8
5	1	1.2			1	.6
missing	64		59		123	

**ED2ATMU: Erkrankungsdauer im 2. Lebensjahr in % - Krankheiten des Atmungssystems**

- 1 - 0,0 - 3,0% Fehltage = 1,0 - 7,5 Tage  
 2 - 3,1 - 6,0% Fehltage = 7,6 - 15,1 Tage  
 3 - 6,1 - 9,0% Fehltage = 15,2 - 22,6 Tage  
 4 - 9,1 - 12,0% Fehltage = 22,7 - 30,1 Tage  
 5 - 12,1 - 15,0% Fehltage = 30,2 - 37,6 Tage  
 6 - 15,1 - 18,0% Fehltage = 37,7 - 45,2 Tage  
 7 - 18,1 - 21,0% Fehltage = 45,3 - 52,7 Tage  
 8 - 21,1 - 24,0% Fehltage = 52,8 - 60,2 Tage  
 9 - 24,1% und mehr Fehltage = 60,3 Tage und mehr

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	44	36.4	63	48.8	107	42.8
2	37	30.6	31	24.0	68	27.2
3	14	11.6	19	14.7	33	13.2
4	10	8.3	5	3.9	15	6.0
5	6	5.0	7	5.4	13	5.2
6	3	2.5	2	1.6	5	2.0
7	1	.8	2	1.6	3	1.2
8	1	.8			1	.4

9	5	4.1			5	2.0
missing	25		19		44	

**ED2PNEU: Erkrankungsdauer im 2. Lebensjahr in % - Pneumonie**

- 1 - 0,0 - 3,0% Fehltage = 1,0 - 7,5 Tage  
 2 - 3,1 - 6,0% Fehltage = 7,6 - 15,1 Tage  
 3 - 6,1 - 9,0% Fehltage = 15,2 - 22,6 Tage  
 4 - 9,1 - 12,0% Fehltage = 22,7 - 30,1 Tage  
 5 - 12,1 - 15,0% Fehltage = 30,2 - 37,6 Tage  
 6 - 15,1 - 18,0% Fehltage = 37,7 - 45,2 Tage  
 7 - 18,1 - 21,0% Fehltage = 45,3 - 52,7 Tage  
 8 - 21,1 - 24,0% Fehltage = 52,8 - 60,2 Tage  
 9 - 24,1% und mehr Fehltage = 60,3 Tage und mehr

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	114	96.6	122	99.2	236	97.9
2	1	.8			1	.4
3	1	.8			1	.4
4	1	.8	1	.8	2	.8
6	1	.8			1	.4
missing	28		25		53	

**ED2BRON: Erkrankungsdauer im 2. Lebensjahr in % - Bronchitis**

- 1 - 0,0 - 3,0% Fehltage = 1,0 - 7,5 Tage  
 2 - 3,1 - 6,0% Fehltage = 7,6 - 15,1 Tage  
 3 - 6,1 - 9,0% Fehltage = 15,2 - 22,6 Tage  
 4 - 9,1 - 12,0% Fehltage = 22,7 - 30,1 Tage  
 5 - 12,1 - 15,0% Fehltage = 30,2 - 37,6 Tage  
 6 - 15,1 - 18,0% Fehltage = 37,7 - 45,2 Tage  
 7 - 18,1 - 21,0% Fehltage = 45,3 - 52,7 Tage  
 8 - 21,1 - 24,0% Fehltage = 52,8 - 60,2 Tage  
 9 - 24,1% und mehr Fehltage = 60,3 Tage und mehr

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	101	85.6	110	88.7	211	87.2
2	8	6.8	10	8.1	18	7.4
3	4	3.4	1	.8	5	2.1
4	3	2.5	2	1.6	5	2.1
6	2	1.7	1	.8	3	1.2
missing	28		24		52	



### ED2ASO: Erkrankungsdauer im 2. Lebensjahr in % - Sonstige Krankheiten des Atmungssystems

- 1 - 0,0 - 3,0% Fehltag = 1,0 - 7,5 Tage  
 2 - 3,1 - 6,0% Fehltag = 7,6 - 15,1 Tage  
 3 - 6,1 - 9,0% Fehltag = 15,2 - 22,6 Tage  
 4 - 9,1 - 12,0% Fehltag = 22,7 - 30,1 Tage  
 5 - 12,1 - 15,0% Fehltag = 30,2 - 37,6 Tage  
 6 - 15,1 - 18,0% Fehltag = 37,7 - 45,2 Tage  
 7 - 18,1 - 21,0% Fehltag = 45,3 - 52,7 Tage  
 8 - 21,1 - 24,0% Fehltag = 52,8 - 60,2 Tage  
 9 - 24,1% und mehr Fehltag = 60,3 Tage und mehr

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	56	45.9	69	53.1	125	49.6
2	41	33.6	31	23.8	72	28.6
3	11	9.0	16	12.3	27	10.7
4	6	4.9	8	6.2	14	5.6
5	4	3.3	4	3.1	8	3.2
6	2	1.6	2	1.5	4	1.6
9	2	1.6			2	.8
missing	24		18		42	

### ED2OHR: Erkrankungsdauer im 2. Lebensjahr in % - Krankheiten des Ohres und des Wurmfortsatzes

- 1 - 0,0 - 3,0% Fehltag = 1,0 - 7,5 Tage  
 2 - 3,1 - 6,0% Fehltag = 7,6 - 15,1 Tage  
 3 - 6,1 - 9,0% Fehltag = 15,2 - 22,6 Tage  
 4 - 9,1 - 12,0% Fehltag = 22,7 - 30,1 Tage  
 5 - 12,1 - 15,0% Fehltag = 30,2 - 37,6 Tage  
 6 - 15,1 - 18,0% Fehltag = 37,7 - 45,2 Tage  
 7 - 18,1 - 21,0% Fehltag = 45,3 - 52,7 Tage  
 8 - 21,1 - 24,0% Fehltag = 52,8 - 60,2 Tage  
 9 - 24,1% und mehr Fehltag = 60,3 Tage und mehr

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	96	80.7	110	89.4	206	85.1
2	14	11.8	6	4.9	20	8.3
3	5	4.2	6	4.9	11	4.5
4	2	1.7	1	.8	3	1.2
5	2	1.7			2	.8

missing	27		25		52	
---------	----	--	----	--	----	--

### ED2AUGE: Erkrankungsdauer im 2. Lebensjahr in % - Entzündliche Krankheiten des Auges

- 1 - 0,0 - 3,0% Fehltage = 1,0 - 7,5 Tage  
 2 - 3,1 - 6,0% Fehltage = 7,6 - 15,1 Tage  
 3 - 6,1 - 9,0% Fehltage = 15,2 - 22,6 Tage  
 4 - 9,1 - 12,0% Fehltage = 22,7 - 30,1 Tage  
 5 - 12,1 - 15,0% Fehltage = 30,2 - 37,6 Tage  
 6 - 15,1 - 18,0% Fehltage = 37,7 - 45,2 Tage  
 7 - 18,1 - 21,0% Fehltage = 45,3 - 52,7 Tage  
 8 - 21,1 - 24,0% Fehltage = 52,8 - 60,2 Tage  
 9 - 24,1% und mehr Fehltage = 60,3 Tage und mehr

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	118	98.3	123	99.2	241	98.8
2	1	.8			1	.4
3	1	.8			1	.4
4			1	.8	1	.4
missing	26		24		50	

### ED2DARM: Erkrankungsdauer im 2. Lebensjahr in % - Infektiöse Darmerkrankungen

- 1 - 0,0 - 3,0% Fehltage = 1,0 - 7,5 Tage  
 2 - 3,1 - 6,0% Fehltage = 7,6 - 15,1 Tage  
 3 - 6,1 - 9,0% Fehltage = 15,2 - 22,6 Tage  
 4 - 9,1 - 12,0% Fehltage = 22,7 - 30,1 Tage  
 5 - 12,1 - 15,0% Fehltage = 30,2 - 37,6 Tage  
 6 - 15,1 - 18,0% Fehltage = 37,7 - 45,2 Tage  
 7 - 18,1 - 21,0% Fehltage = 45,3 - 52,7 Tage  
 8 - 21,1 - 24,0% Fehltage = 52,8 - 60,2 Tage  
 9 - 24,1% und mehr Fehltage = 60,3 Tage und mehr

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	116	97.5	124	98.4	240	98.0
2	3	2.5	1	.8	4	1.6
9			1	.8	1	.4
missing	27		22		49	

### ED2STOM: Erkrankungsdauer im 2. Lebensjahr in % - Stomatitis aphthosa

- 1 - 0,0 - 3,0% Fehltage = 1,0 - 7,5 Tage  
 2 - 3,1 - 6,0% Fehltage = 7,6 - 15,1 Tage  
 3 - 6,1 - 9,0% Fehltage = 15,2 - 22,6 Tage  
 4 - 9,1 - 12,0% Fehltage = 22,7 - 30,1 Tage  
 5 - 12,1 - 15,0% Fehltage = 30,2 - 37,6 Tage  
 6 - 15,1 - 18,0% Fehltage = 37,7 - 45,2 Tage  
 7 - 18,1 - 21,0% Fehltage = 45,3 - 52,7 Tage  
 8 - 21,1 - 24,0% Fehltage = 52,8 - 60,2 Tage  
 9 - 24,1% und mehr Fehltage = 60,3 Tage und mehr

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	116	97.5	120	97.6	236	97.5
2	3	2.5	1	.8	4	1.7
4			1	.8	1	.4
5			1	.8	1	.4
missing	27		25		52	

### ED2GAST: Erkrankungsdauer im 2. Lebensjahr in % - Gastroenteritis und Kolitis

- 1 - 0,0 - 3,0% Fehltage = 1,0 - 7,5 Tage  
 2 - 3,1 - 6,0% Fehltage = 7,6 - 15,1 Tage  
 3 - 6,1 - 9,0% Fehltage = 15,2 - 22,6 Tage  
 4 - 9,1 - 12,0% Fehltage = 22,7 - 30,1 Tage  
 5 - 12,1 - 15,0% Fehltage = 30,2 - 37,6 Tage  
 6 - 15,1 - 18,0% Fehltage = 37,7 - 45,2 Tage  
 7 - 18,1 - 21,0% Fehltage = 45,3 - 52,7 Tage  
 8 - 21,1 - 24,0% Fehltage = 52,8 - 60,2 Tage  
 9 - 24,1% und mehr Fehltage = 60,3 Tage und mehr

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	116	95.9	121	98.4	237	97.1
2	4	3.3	2	1.6	6	2.5
5	1	.8			1	.4
missing	25		25		50	

**ED2INFE: Erkrankungsdauer im 2. Lebensjahr in % -  
Infektionskrankheiten**

- 1 - 0,0 - 3,0% Fehltag = 1,0 - 7,5 Tage  
 2 - 3,1 - 6,0% Fehltag = 7,6 - 15,1 Tage  
 3 - 6,1 - 9,0% Fehltag = 15,2 - 22,6 Tage  
 4 - 9,1 - 12,0% Fehltag = 22,7 - 30,1 Tage  
 5 - 12,1 - 15,0% Fehltag = 30,2 - 37,6 Tage  
 6 - 15,1 - 18,0% Fehltag = 37,7 - 45,2 Tage  
 7 - 18,1 - 21,0% Fehltag = 45,3 - 52,7 Tage  
 8 - 21,1 - 24,0% Fehltag = 52,8 - 60,2 Tage  
 9 - 24,1% und mehr Fehltag = 60,3 Tage und mehr

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	111	93.3	118	95.9	229	94.6
2	5	4.2	2	1.6	7	2.9
3	2	1.7	2	1.6	4	1.7
4			1	.8	1	.4
5	1	.8			1	.4
missing	27		25		52	

**ED2FIEB: Erkrankungsdauer im 2. Lebensjahr in % - Fieber unbekannter  
Ursache**

- 1 - 0,0 - 3,0% Fehltag = 1,0 - 7,5 Tage  
 2 - 3,1 - 6,0% Fehltag = 7,6 - 15,1 Tage  
 3 - 6,1 - 9,0% Fehltag = 15,2 - 22,6 Tage  
 4 - 9,1 - 12,0% Fehltag = 22,7 - 30,1 Tage  
 5 - 12,1 - 15,0% Fehltag = 30,2 - 37,6 Tage  
 6 - 15,1 - 18,0% Fehltag = 37,7 - 45,2 Tage  
 7 - 18,1 - 21,0% Fehltag = 45,3 - 52,7 Tage  
 8 - 21,1 - 24,0% Fehltag = 52,8 - 60,2 Tage  
 9 - 24,1% und mehr Fehltag = 60,3 Tage und mehr

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	118	99.2	122	99.2	240	99.2
2	1	.8			1	.4
7			1	.8	1	.4
missing	27		25		52	

### ED2HAUT: Erkrankungsdauer im 2. Lebensjahr in % - Infektionen der Haut

- 1 - 0,0 - 3,0% Fehltage = 1,0 - 7,5 Tage  
 2 - 3,1 - 6,0% Fehltage = 7,6 - 15,1 Tage  
 3 - 6,1 - 9,0% Fehltage = 15,2 - 22,6 Tage  
 4 - 9,1 - 12,0% Fehltage = 22,7 - 30,1 Tage  
 5 - 12,1 - 15,0% Fehltage = 30,2 - 37,6 Tage  
 6 - 15,1 - 18,0% Fehltage = 37,7 - 45,2 Tage  
 7 - 18,1 - 21,0% Fehltage = 45,3 - 52,7 Tage  
 8 - 21,1 - 24,0% Fehltage = 52,8 - 60,2 Tage  
 9 - 24,1% und mehr Fehltage = 60,3 Tage und mehr

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	115	95.8	122	99.2	237	97.5
2	5	4.2	1	.8	6	2.5
missing	26		25		51	

### ED2IMPE: Erkrankungsdauer im 2. Lebensjahr in % - Impetigo contagiosa

- 1 - 0,0 - 3,0% Fehltage = 1,0 - 7,5 Tage  
 2 - 3,1 - 6,0% Fehltage = 7,6 - 15,1 Tage  
 3 - 6,1 - 9,0% Fehltage = 15,2 - 22,6 Tage  
 4 - 9,1 - 12,0% Fehltage = 22,7 - 30,1 Tage  
 5 - 12,1 - 15,0% Fehltage = 30,2 - 37,6 Tage  
 6 - 15,1 - 18,0% Fehltage = 37,7 - 45,2 Tage  
 7 - 18,1 - 21,0% Fehltage = 45,3 - 52,7 Tage  
 8 - 21,1 - 24,0% Fehltage = 52,8 - 60,2 Tage  
 9 - 24,1% und mehr Fehltage = 60,3 Tage und mehr

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	118	99.2	122	99.2	240	99.2
2	1	.8	1	.8	2	.8
missing	27		25		52	

### ED2HSO: Erkrankungsdauer im 2. Lebensjahr in % - Sonstige Hautkrankheiten

- 1 - 0,0 - 3,0% Fehltage = 1,0 - 7,5 Tage  
 2 - 3,1 - 6,0% Fehltage = 7,6 - 15,1 Tage  
 3 - 6,1 - 9,0% Fehltage = 15,2 - 22,6 Tage  
 4 - 9,1 - 12,0% Fehltage = 22,7 - 30,1 Tage  
 5 - 12,1 - 15,0% Fehltage = 30,2 - 37,6 Tage  
 6 - 15,1 - 18,0% Fehltage = 37,7 - 45,2 Tage  
 7 - 18,1 - 21,0% Fehltage = 45,3 - 52,7 Tage  
 8 - 21,1 - 24,0% Fehltage = 52,8 - 60,2 Tage  
 9 - 24,1% und mehr Fehltage = 60,3 Tage und mehr

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	118	98.3	123	100.0	241	99.2
2	2	1.7			2	.8
missing	26		25		51	

### ED2UNFA: Erkrankungsdauer im 2. Lebensjahr in % - Unfälle

- 1 - 0,0 - 3,0% Fehltage = 1,0 - 7,5 Tage  
 2 - 3,1 - 6,0% Fehltage = 7,6 - 15,1 Tage  
 3 - 6,1 - 9,0% Fehltage = 15,2 - 22,6 Tage  
 4 - 9,1 - 12,0% Fehltage = 22,7 - 30,1 Tage  
 5 - 12,1 - 15,0% Fehltage = 30,2 - 37,6 Tage  
 6 - 15,1 - 18,0% Fehltage = 37,7 - 45,2 Tage  
 7 - 18,1 - 21,0% Fehltage = 45,3 - 52,7 Tage  
 8 - 21,1 - 24,0% Fehltage = 52,8 - 60,2 Tage  
 9 - 24,1% und mehr Fehltage = 60,3 Tage und mehr

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	119	100.0	121	98.4	240	99.2
2			1	.8	1	.4
3			1	.8	1	.4
missing	27		25		52	

**ED2SON: Erkrankungsdauer im 2. Lebensjahr in % - Sonstige**

- 1 - 0,0 - 3,0% Fehltage = 1,0 - 7,5 Tage  
 2 - 3,1 - 6,0% Fehltage = 7,6 - 15,1 Tage  
 3 - 6,1 - 9,0% Fehltage = 15,2 - 22,6 Tage  
 4 - 9,1 - 12,0% Fehltage = 22,7 - 30,1 Tage  
 5 - 12,1 - 15,0% Fehltage = 30,2 - 37,6 Tage  
 6 - 15,1 - 18,0% Fehltage = 37,7 - 45,2 Tage  
 7 - 18,1 - 21,0% Fehltage = 45,3 - 52,7 Tage  
 8 - 21,1 - 24,0% Fehltage = 52,8 - 60,2 Tage  
 9 - 24,1% und mehr Fehltage = 60,3 Tage und mehr

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	113	95.0	117	95.1	230	95.0
2	3	2.5	6	4.9	9	3.7
3	2	1.7	25		2	.8
7	1	.8			1	.4
missing	27				52	

**ED2KANG: Erkrankungsdauer im 2. Lebensjahr in % - Keine Angaben**

- 1 - 0,0 - 3,0% Fehltage = 1,0 - 7,5 Tage  
 2 - 3,1 - 6,0% Fehltage = 7,6 - 15,1 Tage  
 3 - 6,1 - 9,0% Fehltage = 15,2 - 22,6 Tage  
 4 - 9,1 - 12,0% Fehltage = 22,7 - 30,1 Tage  
 5 - 12,1 - 15,0% Fehltage = 30,2 - 37,6 Tage  
 6 - 15,1 - 18,0% Fehltage = 37,7 - 45,2 Tage  
 7 - 18,1 - 21,0% Fehltage = 45,3 - 52,7 Tage  
 8 - 21,1 - 24,0% Fehltage = 52,8 - 60,2 Tage  
 9 - 24,1% und mehr Fehltage = 60,3 Tage und mehr

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	111	91.7	119	96.0	230	93.9
2	5	4.1	3	2.4	8	3.3
3	5	4.1	1	.8	6	2.4
4			1	.8	1	.4
missing	25		24		49	



**EHATMU: Erkrankungshäufigkeit / Quartal in den ersten 2 Lebensjahren  
Krankheiten des Atmungssystems**

1 - 0,00 - 0,25 = 1 - 2mal / 8 Quartale  
 2 - 0,26 - 0,50 = 3 - 4mal / 8 Quartale  
 3 - 0,51 - 0,75 = 5 - 6mal / 8 Quartale  
 4 - 0,76 - 1,00 = 7 - 8mal / 8 Quartale  
 5 - 1,01 - 1,25 = 9 - 10mal / 8 Quartale  
 6 - 1,26 - 1,50 = 11 - 12mal / 8 Quartale  
 7 - 1,51 - 1,75 = 13 - 14mal / 8 Quartale  
 8 - 1,76 - 2,00 = 15 - 16mal / 8 Quartale  
 9 - über 2,00

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	35	27.8	50	38.2	85	33.1
2	34	27.0	40	30.5	74	28.8
3	24	19.0	21	16.0	45	17.5
4	24	19.0	17	13.0	41	16.0
5	1	.8	1	.8	2	.8
6	5	4.0	2	1.5	7	2.7
7	2	1.6			2	.8
8	1	.8			1	.4
missing	20		17		37	

**EHOHR: Erkrankungshäufigkeit / Quartal in den ersten 2 Lebensjahren  
Krankheiten des Ohres**

1 - 0,00 - 0,25 = 1 - 2mal / 8 Quartale  
 2 - 0,26 - 0,50 = 3 - 4mal / 8 Quartale  
 3 - 0,51 - 0,75 = 5 - 6mal / 8 Quartale  
 4 - 0,76 - 1,00 = 7 - 8mal / 8 Quartale  
 5 - 1,01 - 1,25 = 9 - 10mal / 8 Quartale  
 6 - 1,26 - 1,50 = 11 - 12mal / 8 Quartale  
 7 - 1,51 - 1,75 = 13 - 14mal / 8 Quartale  
 8 - 1,76 - 2,00 = 15 - 16mal / 8 Quartale  
 9 - über 2,00

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	96	78.7	108	86.4	204	82.6
2	21	17.2	15	12.0	36	14.6
3	3	2.5	1	.8	4	1.6
4	2	1.6			2	.8

6			1	.8	1	.4
missing	24		23		47	

**EHAUGE: Erkrankungshäufigkeit / Quartal in den ersten 2 Lebensjahren  
Krankheiten des Auges**

1 - 0,00 - 0,25 = 1 - 2mal / 8 Quartale  
 2 - 0,26 - 0,50 = 3 - 4mal / 8 Quartale  
 3 - 0,51 - 0,75 = 5 - 6mal / 8 Quartale  
 4 - 0,76 - 1,00 = 7 - 8mal / 8 Quartale  
 5 - 1,01 - 1,25 = 9 - 10mal / 8 Quartale  
 6 - 1,26 - 1,50 = 11 - 12mal / 8 Quartale  
 7 - 1,51 - 1,75 = 13 - 14mal / 8 Quartale  
 8 - 1,76 - 2,00 = 15 - 16mal / 8 Quartale  
 9 - über 2,00

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	119	98.3	117	95.1	236	96.7
2	2	1.7	6	4.9	8	3.3
missing	25		25		50	

**EHVERD: Erkrankungshäufigkeit / Quartal in den ersten 2 Lebensjahren  
Krankheiten des Verdauungssystems**

1 - 0,00 - 0,25 = 1 - 2mal / 8 Quartale  
 2 - 0,26 - 0,50 = 3 - 4mal / 8 Quartale  
 3 - 0,51 - 0,75 = 5 - 6mal / 8 Quartale  
 4 - 0,76 - 1,00 = 7 - 8mal / 8 Quartale  
 5 - 1,01 - 1,25 = 9 - 10mal / 8 Quartale  
 6 - 1,26 - 1,50 = 11 - 12mal / 8 Quartale  
 7 - 1,51 - 1,75 = 13 - 14mal / 8 Quartale  
 8 - 1,76 - 2,00 = 15 - 16mal / 8 Quartale  
 9 - über 2,00

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	109	89.3	120	95.2	229	92.3
2	9	7.4	6	4.8	15	6.0
3	4	3.3			4	1.6
missing	24		22		46	

**EHINFE: Erkrankungshäufigkeit / Quartal in den ersten 2 Lebensjahren  
Infektionskrankheiten**

1 - 0,00 - 0,25 = 1 - 2mal / 8 Quartale  
 2 - 0,26 - 0,50 = 3 - 4mal / 8 Quartale  
 3 - 0,51 - 0,75 = 5 - 6mal / 8 Quartale  
 4 - 0,76 - 1,00 = 7 - 8mal / 8 Quartale  
 5 - 1,01 - 1,25 = 9 - 10mal / 8 Quartale  
 6 - 1,26 - 1,50 = 11 - 12mal / 8 Quartale  
 7 - 1,51 - 1,75 = 13 - 14mal / 8 Quartale  
 8 - 1,76 - 2,00 = 15 - 16mal / 8 Quartale  
 9 - über 2,00

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	115	95.8	118	95.2	233	95.5
2	5	4.2	5	4.0	10	4.1
6			1	.8	1	.4
missing	26		24		50	

**EHHAUT: Erkrankungshäufigkeit / Quartal in den ersten 2 Lebensjahren  
Infektionen der Haut**

1 - 0,00 - 0,25 = 1 - 2mal / 8 Quartale  
 2 - 0,26 - 0,50 = 3 - 4mal / 8 Quartale  
 3 - 0,51 - 0,75 = 5 - 6mal / 8 Quartale  
 4 - 0,76 - 1,00 = 7 - 8mal / 8 Quartale  
 5 - 1,01 - 1,25 = 9 - 10mal / 8 Quartale  
 6 - 1,26 - 1,50 = 11 - 12mal / 8 Quartale  
 7 - 1,51 - 1,75 = 13 - 14mal / 8 Quartale  
 8 - 1,76 - 2,00 = 15 - 16mal / 8 Quartale  
 9 - über 2,00

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	121	100.0	123	99.2	244	99.6
2			1	.8	1	.4
missing	25		24		49	

**EHSO: Erkrankungshäufigkeit / Quartal in den ersten 2 Lebensjahren**  
**Sonstige**

1 - 0,00 - 0,25 = 1 - 2mal / 8 Quartale  
 2 - 0,26 - 0,50 = 3 - 4mal / 8 Quartale  
 3 - 0,51 - 0,75 = 5 - 6mal / 8 Quartale  
 4 - 0,76 - 1,00 = 7 - 8mal / 8 Quartale  
 5 - 1,01 - 1,25 = 9 - 10mal / 8 Quartale  
 6 - 1,26 - 1,50 = 11 - 12mal / 8 Quartale  
 7 - 1,51 - 1,75 = 13 - 14mal / 8 Quartale  
 8 - 1,76 - 2,00 = 15 - 16mal / 8 Quartale  
 9 - über 2,00

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	113	93.4	120	95.2	233	94.3
2	7	5.8	4	3.2	11	4.5
3	1	.8	2	1.6	3	1.2
missing	25		22		47	

**EHKANG: Erkrankungshäufigkeit / Quartal in den ersten 2 Lebensjahren**  
**Keine Angaben**

1 - 0,00 - 0,25 = 1 - 2mal / 8 Quartale  
 2 - 0,26 - 0,50 = 3 - 4mal / 8 Quartale  
 3 - 0,51 - 0,75 = 5 - 6mal / 8 Quartale  
 4 - 0,76 - 1,00 = 7 - 8mal / 8 Quartale  
 5 - 1,01 - 1,25 = 9 - 10mal / 8 Quartale  
 6 - 1,26 - 1,50 = 11 - 12mal / 8 Quartale  
 7 - 1,51 - 1,75 = 13 - 14mal / 8 Quartale  
 8 - 1,76 - 2,00 = 15 - 16mal / 8 Quartale  
 9 - über 2,00

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	112	91.8	122	97.6	234	94.7
2	7	5.7	3	2.4	10	4.0
3	1	.8			1	.4
4	2	1.6			2	.8
missing	24		23		47	

**EHGES: Erkrankungshäufigkeit / Quartal in den ersten 2 Lebensjahren  
Insgesamt**

1 - 0,00 - 0,25 = 1 - 2mal / 8 Quartale  
 2 - 0,26 - 0,50 = 3 - 4mal / 8 Quartale  
 3 - 0,51 - 0,75 = 5 - 6mal / 8 Quartale  
 4 - 0,76 - 1,00 = 7 - 8mal / 8 Quartale  
 5 - 1,01 - 1,25 = 9 - 10mal / 8 Quartale  
 6 - 1,26 - 1,50 = 11 - 12mal / 8 Quartale  
 7 - 1,51 - 1,75 = 13 - 14mal / 8 Quartale  
 8 - 1,76 - 2,00 = 15 - 16mal / 8 Quartale  
 9 - über 2,00

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
1	9	7.2	12	9.1	21	8.2
2	22	17.6	42	31.8	64	24.9
3	26	20.8	23	17.4	49	19.1
4	35	28.0	33	25.0	68	26.5
5	12	9.6	7	5.3	19	7.4
6	14	11.2	12	9.1	26	10.1
7	1	.8	2	1.5	3	1.2
8	6	4.8	1	.8	7	2.7
missing	21		16		37	

Unter Globalmaßen werden künstliche Variablen verstanden, die aus der Zusammenfassung oder Kumulation anderer entstanden. Darin ähneln sie den bereits oben beschriebenen Sammelspalten. Auch alte Maße wurden erneut in die Datei aufgenommen.

### **Entwicklungsquotient**

Die Bestimmung des EQ 2 Jahre basiert auf dem Entwicklungstest für Krippenkinder (Zwiener, Schmidt-Kolmer & Niebsch, 1982; Zwiener & Schmidt-Kolmer, 1987). In den Krippen der DDR wurde zu jener Zeit ein Standardprogramm zur gesundheitlichen Überwachung eingeführt, das die periodische Kontrolle von Leistung und Verhalten einschloß. Das Verfahren enthält für die ersten 3 Lebensjahre insgesamt 144 Aufgaben (12 pro Quartal), die sich auf 6 Prüfbereiche beziehen: Selbstbedienung/Alltagsverrichtung (hier Selbständigkeit genannt), Motorik, Spieltätigkeit, Sprache/Denken, Musik/darstellende Tätigkeiten und soziales Verhalten. Obwohl die Autoren keine Entwicklungsquotienten berechnen, sind EQ-Angaben für den Gesamt-EQ wie für die Teil-EQs ohne weiteres möglich als Meßgröße:

Entwicklungsalter / Lebensalter x 100.

### **EQSELBST:Selbstbedienung/Alltagsverrichtung (Selbständigkeit)**

	Mittelwert	St.abweichng	Minimum	Maximum	Anzahl
männlich	101.97	14.37	59	130	146
weiblich	108.11	12.09	67	133	148
gesamt	105.06	13.60	59	133	294

### **MQ2: Motorik Quotient**

	Mittelwert	St.abweichng	Minimum	Maximum	Anzahl
männlich	98.41	11.57	63	128	146
weiblich	98.03	12.71	53	130	148
gesamt	98.22	12.14	53	130	294

### **EQSPIEL: Spieltätigkeit**

	Mittelwert	St.abweichng	Minimum	Maximum	Anzahl
männlich	97.41	15.73	53	139	146
weiblich	100.99	14.15	65	154	148

gesamt	99.21	15.04	53	154	294
--------	-------	-------	----	-----	-----



**EQSINN: Sprache/Denken**

	Mittelwert	St.abweichng	Minimum	Maximum	Anzahl
männlich	90.62	23.70	37	128	146
weiblich	97.60	19.51	35	137	148
gesamt	94.13	21.93	35	137	294

**EQMUSIK: Musik/darstellende Tätigkeiten**

	Mittelwert	St.abweichng	Minimum	Maximum	Anzahl
männlich	84.98	20.57	31	120	146
weiblich	92.41	19.89	27	144	148
gesamt	88.72	20.54	27	144	294

**EQSOZVER: Soziales Verhalten**

	Mittelwert	St.abweichng	Minimum	Maximum	Anzahl
männlich	88.77	19.21	42	133	146
weiblich	93.89	16.65	53	131	148
gesamt	91.34	18.12	42	133	294

**EQGESNK: Entwicklungsquotient - gesamt, nicht korrigiert**

	Mittelwert	St.abweichng	Minimum	Maximum	Anzahl
männlich	93.71	14.82	58	125	146
weiblich	98.48	13.25	52	134	148
gesamt	96.11	14.23	52	134	294

**EQ2: Entwicklungsquotient**

Die Korrektur bestand in einer systematischen Verschiebung um 4 EQ-Punkte "nach oben", um den Mittelwert der Standardskala (Mittelwert = 100) anzugleichen.

	Mittelwert	St.abweichng	Minimum	Maximum	Anzahl
männlich	97.71	14.82	62	129	146
weiblich	102.45	13.24	56	138	148
gesamt	100.10	14.22	56	138	294

**EQC2: Entwicklungsquotient (C-Wert)**

	Mittelwert	St.abweichng	Minimum	Maximum	Anzahl
männlich	4.66	1.90	1	9	146
weiblich	5.36	1.67	1	9	148
gesamt	5.01	1.82	1	9	294

**BRI1: Anzahl der biologischen Risiken = biologischer Risikoindex (n = 279)**

Der biologische Risikokatalog umfaßt alle alimentären, toxischen, hypoxischen, traumatischen und infektiösen Einwirkungen während der Schwangerschaft, Geburt und Neugeborenenperiode, die von den Geburtshelfern und Neonatologen in den beiden Entbindungskliniken 1970/71 erfaßt wurden. Von den ursprünglich 70 prä-, peri- und postnatalen Risikofaktoren gehen nach präziser Aufbereitung 55 Risiken in den BRI1 additiv ein (2 Jahre; n = 294; Mittelwert = 3,7; Standardabweichung = 3,2).

Nachstehend ist der **Katalog biologischer Risikofaktoren** aufgeführt.

	Variablenname (mit Risikocodierung)	n	n% von 294
<b>SCHWANGERSCHAFT</b>			
1. Frühgestose	FRUEHGES (2.-4.)	31	10.5
2. Spätgestose	SPAETGES (2.-8.)	39	13.3
3. Herzerkrankungen	HERZMU0 (2.-8.)	10	3.4

4. Anämie in grav.	ANAEMIE (2.-4.)	26	8.8
--------------------	--------------------	----	-----

5. Harnwegsinfektion in grav.	HARNWEG (2.-5.)	19	6.5
6. Chronische Nierenerkrankungen	NIEREMU0 (2.-7.)	21	7.1
7. Febrile grippale Erkrankungen in grav. *	INFEKTKR (6.+9.)	6	2.0
8. Lungentuberkulose, nicht mehr behandlungsbedürftig *	LUNGENMU (2.-4.)	6	2.0
9. Chronische Lebererkrankungen	ORGANMU0 (1.)	13	4.4
10. Vorausgegangene Operationen an Uterus und Adnexen *	GYNAEKOP (3.-4.)	10	3.4
11. Uterusblutungen, 1. Hälfte *	BLUTUN1H (2.-6.)	13	4.4
12. Uterusblutungen, 2. Hälfte *	BLUTUN2H (2.-9.)	9	3.1
13. Mutter $\geq$ 35 J. (Primipara $\geq$ 30 J.)	ALTMU0 ( $>$ 35 Jahre) bei Primipara: ALTMU0 ( $\geq$ 30J) kombiniert mit ANZGEB (1.)	26	8.8
14. Mutter rauchte in grav. *	RAUCHENM (2.-9.)	36	12.2
<b>GEBURT</b>			
15. Blasensprung $\geq$ 24 Stunden vor der Geburt *	BLASSPR (2.-3.)	13	4.4
16. Fruchtwasser grün *	FRUCHTWA (2.-5.) oder AMNIOSKO (3.-4.) oder AMNITY (3.-5.)	43	14.6
17. Medikamentöse Geburtseinleitung *	INGANGGE (2.-5.)	43	14.6
18. Wehenschwäche	WEHEN (2.-3.)	41	13.9
19. Geburtsdauer $<$ 2 Stunden	DAUERGEB ( $<$ 2)	22	7.5
20. Geburtsdauer $>$ 17 Stunden *	DAUERGEB ( $>$ 17)	6	2.0
21. Fieber sub partu *	GFIEBER (2.-3.)	23	7.8

22. Operative Entbindungen	ARTENT (2.-11.;+ 14.-17.)	92	31.3
23. Primäre Sectio	ARTENT (2. + 11.)	23	7.8
24. Forceps oder Extraktion	ARTENT (3.-6. + 10. + 14.-16)	34	11.6
25. Vakuumextraktion (VE)	ARTENT (7.-11.)	35	11.9
26. Geburtslageanomalien *	GEBLAGE (2.-8.)	46	15.6
27. Beckenendlage (BEL) *	GEBLAGE (7.)	25	8.5
28. Einstellungsanomalien des Schädels (hintere HHL, Gesichts- und Stirnlage, tiefer Querstand, sonstige)	GEBLAGE (2.-6.)	18	6.1
29. Alteration der kindlichen Herztöne sub partu	GHERZ (2.-4.)	48	16.3
30. Hämatome und petechiale Blutungen *	BLUTUG (1.-3.)	14	4.8
31. Nabelschnurkomplikation	GNABEL (2.-5.)	46	15.6
32. Anomale Insertion der Nabelschnur	GNABINS (2.- 6.)	12	4.1
33. Plazentainfarkte (mehr als 1/3 der Gesamtfläche) *	GPLAZEN (2.-4.)	16	5.4
34. Zwillingsgeburt *	ZWILLING (2.-3.)	12	4.1
35. Geburtsgewicht $\leq 2500$ g *	GEW0 ( $\leq 2500$ )	17	5.8
36. Frühgeborene (nicht hypotroph)	REIFEBEU (8+9)	13	4.4
37. Hypotrophe (nicht zu früh geboren)	REIFEBEU (6.)	10	3.4
38. Hypotrophe Frühgeborene	nicht zuordenbar	6	2.0
39. Unterhautfettgewebe reduziert oder nicht vorhanden *	UNTERHAU (1.-2.)	36	12.2
<b>POSTNATALE PERIODE</b>			
40. Apgar 1min p.n. $\leq 7$	APGAR ( $\leq 7$ )	38	12.9
41. Normalisierung einer auffälligen Apgar- Note erst nach 5 min *	NORAPGAR (3.-8.)	19	6.5
42. Zyanose, noch jenseits der ersten beiden Lebensstunden (nicht generalisiert) *	CYANOSE (2.-6.)	22	7.5

43. Atemnotsyndrom *	ABDIAGHD (77620)	9	3.1
44. Hautdurchblutung unzureichend	HAUTBL (1.-2.)	27	9.2
45. Neugeborenen-Hyperbilirubinämie jeder Genese	IKTERNG (1.)	14	4.8
46. Medikamentöse Soforttherapie notwendig *	MEDIANZ (1.-2.)	26	8.8
47. Puffertherapie notwendig	PUFFANZ (1.-3.)	31	10.5
48. Primäre Reanimation notwendig *	REANANZ (1.-3.)	41	13.9
49. Verlegung in die Kinderklinik notwendig*	ENTLASSH (4.)	20	6.8
<b>RISIKOFAKTOREN DER ERSTEN BEIDEN LEBENSJAHRE</b>			
50. Ernährungsstörungen mit Komplikationen bis Ende 1. Lebensjahr *	<b>Cb. 2 Jahre</b> ERNAEHR (3. + 5.)	20	6.8
51. Erkrankungen des Atmungssystems mit Komplikationen bis 2. Lebensjahr *	<b>Cb. 2 Jahre</b> ATMUNG (3.+ 5.+ 7.+9.)	44	15.0
52. Erkrankungen des Ohres mit Komplikationen bis 2. Lebensjahr	<b>Cb. 2 Jahre</b> OHR (3.+ 5. + 7.-9.)	77	26.2
53. Vater raucht $\geq 10$ Zigaretten täglich *	RAUCHENV (4.-6.)	106	36.1
<b>SCHWACH BESETZTE RISIKOGRUPPEN (n <math>\leq</math> 5)</b>			
54. Mutter zum Zeitpunkt der Geburt < 17;11 Jahre	ALTMU0 (< 18)	4	1.4
55. Hauterkrankungen der Mutter in grav.	ORGANMU0 (2.)	2	.7
56. Hypothyreose der Mutter in grav.	SCHILMU0 (4.-5.)	1	.3
57. Sonstige Lebererkrankungen der Mutter in grav.	IKTERUS (8.)	1	.3
58. Multiple Sklerose der Mutter in grav.	NEUROMU0 (4.)	1	.3
59. Zerebrale Krampfanfälle der Mutter in grav.	PSYKRMU0 (2.)	1	.3
60. Laparotomie der Mutter in grav.	CHIRURG (2.-7.)	1	.3
61. Medikamentöse Dauertherapie der Mutter in grav.	MEDIKTH (2.)	4	1.4

62. Querlage *	GEBLAGE (8.)	3	1.0
----------------	-----------------	---	-----

63. Überreifesyndrom (Clifford I und III) *	REIFEBEU (3.-5.)	4	1.4
64. Riesenkind (Geburtsgewicht $\geq$ 4500g) *	GEW0 ( $>$ 4500)	5	1.7
65. Akute Bronchitis neonatale	ABDIAGHD (46600)	1	.3
66. Weilsche Krankheit	ABDIAGHD (10000)	1	.3
67. Beatmung in der Kinderklinik notwendig	BEATMZA (1.)	4	1.4
68. Austauschtransfusion	TRANSFZA (1.)	2	.7
69. Schädel-Hirn-Traumen*	<b>Cb. 2 Jahre</b> SCHHTR (3. + 5. + 7.)	4	1.4
70. Gelegenheitskrämpfe (Fieber- und Zahnkrämpfe)	<b>Cb. 2 Jahre</b> GELEGKR2 (2.-7.)	4	1.4

Anmerkung:

*Die rückwirkende datentechnische Identifizierung der Variablen bzw. der Risikocodierungen, die in die Berechnung des BRI eingingen, ist teilweise nicht mehr möglich. Die Risiken, die nicht mehr zweifelsfrei zugeordnet werden konnten, sind im o.a. Katalog kursiv gefaßt.*

Bei der Berechnung des vollständigen biologischen Risikoindex wurde vom obigen Risikokatalog ausgegangen, jedoch 15 dort aufgeführte Risiken nicht mit einbezogen. Um Doppelerfassungen zu vermeiden, wurde die Spalte "operative Entbindungen", nicht aber die sie konstituierenden Risiken "primäre Sectio", "Forceps oder Extraktion" und "Vakuumentzug" mit aufgenommen. Analog ist bei "Geburtslageanomalien" verfahren worden: die diese Sammelgruppe ausmachenden Risiken "Beckenendlage", "Einstellungsanomalien des Schädels" und "Querlage" wurden nicht noch einmal mitgezählt. Nicht in die Berechnung des Risikoindex gingen hier die therapeutischen Maßnahmen "primäre Reanimation", "Puffertherapie", "Verlegung in die Kinderklinik notwendig" ein, da sie, strenggenommen, bereits Risikofolgen sind und den Risikoindex nicht künstlich in die Höhe treiben sollten. Aus gleichem Grunde wurden separat aufgeführte Risiken als ein Risiko gezählt: "Geburtsgewicht  $\leq$  2500g", "Hypotrophie", "hypotrophe Frühgeborene", "Unterhautfettgewebe reduziert oder nicht vorhanden". Da bereits vor der Berechnung des biologischen Risikoindex Ergebnisse vorlagen, die Zweifel an der biologischen Natur der Risikofaktoren "Mutter rauchte in grav." und "Vater raucht 10 Zigaretten täglich" aufkommen ließen, wurden sie ebenfalls unberücksichtigt gelassen. Es gingen letztlich 55 biologische Risiken in die Berechnung des Index ein.



**BRI1**

	Mittelwert	St.abweichng	Minimum	Maximum	Anzahl
männlich	3.88	2.40	0	11	140
weiblich	3.63	3.06	0	14	139
gesamt	3.76	2.75	0	14	279

**Bitte beachten:** Die Angaben beziehen sich auf **n = 279**, die als 6jährige erneut erfaßt wurden.

Um die Trennschärfe zu verbessern, wurde später ein reduzierter BRI (Mittelwert = 2,0; Standardabweichung = 2,6 bei n = 294) aus jenen 31 Risiken berechnet, die bei isolierter Betrachtung im Vergleich zur risikofreien Gruppe signifikante EQ-Unterschiede mit 2 Jahren ergaben (vgl. Meyer-Probst, Teichmann, 1984, S.68). Die entsprechenden Risikofaktoren sind im o.g. Katalog mit \* versehen. Bei den einschlägigen Auswertungen mit 10, 14 und 20 Jahren wurde dieser "bereinigte" BRI verwendet, während sich die Auswertung der 2- und 6jährigen (vgl. auch damalige Veröffentlichungen) auf den ursprünglichen BRI1 beziehen.

**SRI2: Sozialer Risikoindex**

Der Soziale Risikoindex SRI 2 Jahre entspricht der Anzahl der für jedes Kind zum Zeitpunkt der Erhebung zutreffenden psychosozialen Risikofaktoren (vgl. Meyer-Probst, Teichmann, 1984, S.68-72).

Im Alter von 2 Jahren kamen folgende Variablen für den SRI in Frage.

**Katalog psychosozialer Risikofaktoren**

	Variablenname (mit Risikocodierung)	n	n % (valide von 294)
<b>BILDUNGSMANGELFAKTOREN IN DER FAMILIE</b>			
1. Mutter ohne 8-Klassen-Abschluß	SCHMU2 (3.-4.)	10	3.4
2. Vater ohne 8-Klassen-Abschluß	SCHVA2 (3.-4.)	7	2.6
3. Mutter ohne Lehrberuf	BMU2 (4.-5.)	40	13.7
4. Vater ohne Lehrberuf	BVA2 (4.-5.)	12	4.3
5. Mutter übt ungelernete Tätigkeit aus	TMU2 (2.)	35	11.9
6. Vater übt ungelernete Tätigkeit aus	TVA2 (1.)	14	4.8
7. Geschwister mit schlechten Schulleistungen	SCHUGN2 (2.-6.)	8	2.7

<b>EMOTIONALE STÖR- UND MANGELFAKTOREN</b>			
8. Eigene Lebensverhältnisse werden als nur unzureichend oder schlecht empfunden	LEBEN2 (3.-4.)	61	21.5
9. Ehe disharmonisch	EHE2 (3.-6.)	14	5.0
10. Krippe schätzt Erziehungstüchtigkeit der Eltern als nur ausreichend oder unzureichend ein	FAMIL (2. + 4.)	53	18.5
11. Mutter wegen psychischer Störungen in nervenärztlicher Behandlung	ANDPSYMU (2.-8.)	10	3.4
12. Vater wegen psychischer Störungen in nervenärztlicher Behandlung	PSYCHV2 (2.-7.)	7	2.4
13. Unvollständige Familie	FAMILM2 (1.+2.+6.+8.+9.)	42	14.3
14. Mutter dissozial	DISSMU (2.-8.)	15	5.1
15. Vater dissozial	DISSVA (2.-8.)	9	3.1
16. Gestörtes Sozialverhalten der Geschwister	SOZGE2 (3.-7.)	11	3.8
17. Schwangerschaft gegen den Willen der Mutter	(Cb.Geburt bei n = 279) SCHWPLAN (3.)	75	27.7
18. Kind bis zur Geburt unerwünscht	UNWU (4.)	27	9.6
<b>BELASTUNGSFAKTOREN DER ELTERN</b>			
19. Gesundheitszustand der Mutter in den letzten 3 Jahren beeinträchtigt	GESUNM2 (2.-5.)	50	17.2
20. Gesundheitszustand des Vaters in den letzten 3 Jahren beeinträchtigt	GESUNV2 (2.-5.)	16	5.6
21. Mutter vollbeschäftigt im Schichtdienst	BERUFM2 (8.-9.)	29	9.9
22. Mutter im Qualifizierungsprozeß	QUALMU2 (4.-5.+7.-9.)	33	11.3
23. Vater mehrwöchig dienstlich von der Familie getrennt	FAMILM2 (4.)	14	4.8
<b>KINDERZAHL,EINKOMMEN, WOHNUNG</b>			
24. Kinderreich, $\geq 4$ Kinder	ZAHLHA2 (4.-7.)	16	5.4
25. Niedriges Prokopf-Nettoeinkommen	NETTO2 (1.-3.)	16	5.7

26. Wohnung ohne gesundheitstechnischen Komfort	KOMFORT (3.-4.)	48	16.5
--	--------------------	----	------

27. Beengte Wohnverhältnisse	ZIMMER2 (1.)	50	17.1
<b>NEGATIVE ERZIEHUNGS- EINSTELLUNGEN (EEFB)</b> (L-Skala - Mittelwert = 10, Streuung = 5-15; ≥ 16 = Risiko)			
28. Mutter autoritär	EEAUT2	14	4.8
29. Mutter kontrolliert kindliches Verhalten zu sehr	EKONT2	48	16.3
30. Mutter überbesorgt, ängstlich	EEUEBB2	14	4.8
31. Mutter mild-nachsichtig	EENACH2	8	2.7
32. Mutter reizbar, unbeherrscht	EERBKT2	29	9.9
33. Mutter emotional distanziert	EEEMD2	7	2.4
34. Mutter streng	EESTR2	17	5.8
35. Mutter materiell verwöhnend	EEVERW2	10	3.4
36. Mutter prügelt	EKOE2	38	12.9
37. Mutter autoritär, reizbar, distanziert prügelt	EEFBI2	10	3.4
38. Mutter nachsichtig, überbesorgt, materiell verwöhnend	EEFBII2	12	4.1
<b>SCHWACH BESETZTE RISIKOGRUPPEN (n &lt; 5)</b>			
39. Vater Alkoholiker	ALKOHV2 (2.-6.)	4	1.4
40. Vater hat ein Psychosyndrom	PSYSYNVA (2.)	4	1.4
41. Mutter glaubt, auf Grund ihrer Lebenssituation dem Kind erzieherisch "kaum ausreichend gerecht" zu werden	ERZIEH2 (3.-4.)	3	1.1
42. Kind ist von den Eltern gelöst und befindet sich im Heim	KRIP (5.)	2	.7

Um den Risikoindex nicht unstatthaft zu erhöhen, wurde das Risiko des Trinkermilieus ("Vater Alkoholiker") nicht mitgezählt, da es bereits in die Risikogruppe "Vater dissozial" vollständig eingeht. Die zwei familiengelösten Heimkinder wurden für die Berechnung des Risikoindex in die Gruppe "Familie unvollständig" eingegliedert. Die beiden Risikogruppen "Schwangerschaft gegen den Willen der Mutter" und "Kind bis zur Geburt unerwünscht" wurden zu einem Risikofaktor vereinigt. Die Risikogruppen "Mutter autoritär, reizbar, distanziert, prügelt" und "Mutter nachsichtig, überbesorgt, materiell verwöhnend" sind für die Berechnung nicht herangezogen worden, da sie sich aus den Risiken 28 bis 36 konstituieren.

Es gingen letztlich 36 Risiken in den vollständigen SRI 2 Jahre ein (n = 294; Mittelwert = 3,1; Standardabweichung = 2,6)

**SRI2**

	Mittelwert	St.abweichng	Minimum	Maximum	Anzahl
männlich	3.06	3.36	0	28	140
weiblich	2.86	2.53	0	11	139
gesamt	2.96	2.97	0	28	279

**Bitte beachten:** Die Angaben beziehen sich auf **n = 279**, die als 6jährige erneut erfaßt wurden.

**SI2: Anzahl der Symptome = Symptomindex**

Der Symptom-Index wird nur zur Vollständigkeit aufgeführt. Er gibt die individuell zutreffende Summe der somatischen und psychischen "Symptome" an, ist aber wegen der "weichen" Grenze zwischen auffällig/unauffällig ungeeignet und sollte bei Bedarf neu gebildet werden.

	Mittelwert	St.abweichng	Minimum	Maximum	Anzahl
männlich	13.28	7.31	2	41	140
weiblich	11.75	6.03	2	33	139
gesamt	12.52	6.74	2	41	279

**RISIND2: Summe biologischer und sozialer Risiken = allgemeiner Risikoindex RI I**

Dieser Index gibt die individuell zutreffende Summe der biologischen und psychosozialen Risikofaktoren an. Er hat sich als ungeeignet erwiesen, weil die Auswertung vor allem auf die Trennung beider Risikobereiche abzielte.

	Mittelwert	St.abweichng	Minimum	Maximum	Anzahl
männlich	6.94	4.48	1	35	140
weiblich	6.48	4.03	0	19	139
gesamt	6.71	4.26	0	35	279

**ANAMN2: Anzahl der anamnestischen Hinweise nach Angaben der Mutter**

Dieser Index gibt die individuell zutreffende Anzahl von Hinweisen auf Schwangerschafts- und/oder Geburtskomplikationen an, die die Mütter bei der Befragung erinnert haben, vgl. S. 14 f.

	männlich	valide Prozente	weiblich	valide Prozente	gesamt	valide Prozente
0	36	25.7	43	30.9	79	28.3
1	32	22.9	41	29.5	73	26.2
2	47	33.6	32	23.0	79	28.3
3	18	12.9	17	12.2	35	12.5
4	6	4.3	5	3.6	11	3.9
5	1	.7	1	.7	2	.7
missing	6		9		15	

**Literaturangaben zum Meßzeitpunkt 2 Jahre**

---

Göllnitz, G. & Teichmann, H. (1978), Ausgeliefert 1979. Die Relationen von biologischen und sozialen Risiken bei prä- und perinatalen hirngeschädigten Kindern, *Ideggyogyazati Szemle*, 31, 481-492.

Göllnitz, G. & Teichmann, H. (1980). Neuropsychiatrische Modelle von Kompensation und Dekompensation: Enzephalopathen. In: Göllnitz, G.; Külz, J. & Uschakow, G.K.; Zur Kompensation und Dekompensation in der kindlichen Entwicklung (S. 177-189) Jena: Fischer.

Meyer-Probst, B. (1979). Zur Objektivierung des "hirnorganisch-psychischen Achsensyndroms" - Erfahrungen mit dem Enzephalopathie - Fragebogen, In: Kleinpeter, U. & Rösler, H.-D. (Hrsg.), *Ergebnisse interdisziplinärer Forschung zum geschädigten Kind* (S. 25-33) Leipzig: Hirzel.

Teichmann, H., Heider, B. & Kleinpeter, U. (1976). Risiko- und Kontrollkinder im Längsschnittvergleich: 3. Lebensjahr, *Zeitschrift für Psychologie*, 184, 495-504.

Teichmann, H., Heider, B. & Kleinpeter, U. (1978). Die Einstellung von Müttern zur körperlichen Bestrafung als Beratungsproblem bei entwicklungsgestörten Kindern, *Zeitschrift für Psychiatrie, Neurologie und medizinische Psychologie*, 30, 173-184.

Teichmann, H., Engel, H., Heider, B. & Kleinpeter, U. (1979). Zur Faktorenstruktur psychopathologischer Symptome im Krippenalter, In: Kleinpeter, U. & Rösler, H.-D. (Hrsg.), *Ergebnisse interdisziplinärer Forschung zum geschädigten Kind* (S. 73-87) Leipzig: Hirzel.

Teichmann, H. (1981). Risiken für die Persönlichkeitsentwicklung im frühen Kindesalter - Rostocker Längsschnittstudie bei Zweijährigen, unv. Habilitation, Rostock: Philosophische Fakultät der Universität

Teichmann, H. (1984). Ergebnisse an den Zweijährigen, in: B. Meyer-Probst & H. Teichmann, *Risiken für die Persönlichkeitsentwicklung im Kindesalter* (S. 63 - 159), Leipzig: Thieme

## Inhaltsverzeichnis zum Meßzeitpunkt 2 Jahre

---

	Seite
<b>ZWISCHENANAMNESE (nach Angaben der Mutter)</b>	
Soziodemographie-----	2
Krankheiten/ZNS-----	3
Anfallsleiden -----	12
Schwangerschaft/Geburt -----	14
Frühkindliche Entwicklung -----	16
Schlaf-----	28
Kinderfehler-----	31
Familie-----	35
Schule-----	45
Mutter-----	47
Vater-----	71
<b>ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG</b>	
Körperlicher Befund -----	75
Neurologischer Befund -----	82
<b>PSYCHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG</b>	
Erziehungseinstellungsfragebogen:	
Items -----	83
Skalen-----	97





	Seite
ZWISCHENANAMNESE (nach Angaben der Krippenerzieherin)	
Anfallsleiden -----	100
Frühkindliche Entwicklung -----	101
Schlaf-----	113
Kinderfehler-----	114
Familie -----	117
Erkrankungen (Fehltage in der Krippe) -----	119
Globalmaße-----	150
Literaturangaben zum Meßzeitpunkt 2 Jahre -----	162